

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 73 din 09. 07. 2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de: **VITA DE VIE**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **LOBESIA BOTRANA (molie strugurilor) GEN. a II-a; ERIOPHYS SP. (acarieni erofizi); TETRANYCHUS SP. (paianjanul rosu comun).**

LOBESIA B. (molie strugurilor), molie vitei de vie are 2 – 3 generatii pe an. In lunile iunie – iulie femela generatiei a II – a isi depun ouale pe suprafata boabelor verzi sau in parga ale strugurilor. Semnele atacului sunt evidente prin prezenta larvelor pe ciorchine, sub scoarta butucilor, coardelor mai batrane ce se exfoliaza. Atacul generatiilor a II – a (luna iunie) si a III – a (luna august). Larvele distrug boabele strugurilor, gauresc boabele si consuma pulpa dand posibilitatea instalarii cu usurinta a putregaiului (**BOTRYTIS CINEREA**). In generatia de toamna (gen a III- a) larvele complet dezvoltate se retrag sub scoarta uscata a butucilor de vita unde se transforma in crisalide.

ERIOPHYSES SP. (acarieni erofizi), prezinta 5 -7 generatii pe an. Acarienii se localizeaza pe partea inferioara a limbului, unde se hranesc intepand tesuturile si sugand suc celular. La locul hranirii apare o pasla de peri epidermici, la adpostul careia acarienii se hranesc si se inmultesc. Cand tesuturile din zonele daunate se necrozeaza, acarienii migreaza pe alte frunze neatacate. In cazul unui atac puternic sunt atacati si ciorchinii, cand acestia se afla in faza de inflorire, producand avortarea florilor.

TETRANYCHUS SP. (paianjanul rosu comun), ataca aparatul foliar, pe partea inferioara a frunzelor. Pe frunze se recunoaste cu usurinta dupa prezenta unei pasle matasoase maronii, iat pe partea superioara a frunzelor dupa depigmentarea, albirea si uscarea dintre nervuri. Atat adultii cat si larvele se hranesc cu seva plantelor, pe care o absorb din tesuturi prin intepare.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului nr. 4, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **LA DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE de 5 % ciorchini atacati.**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. DECIS 20 WG | – 30,0 gr./ha molie vitei de vie sau |
| 2. JAKPOT 2,5 EC /DELTASAP | – 0,4-0,7 l/ha molie vitei de vie sau |
| | - 0,3 -0,6 l/ha cicade sau |
| 3. NISSORUN 10 WP | – 0,5 kg./ha acarianul rosu comun sau |
| 4. ORTUS 5 SC | - 0,5 l/ha acarianul rosu comun sau |
| 5. MOSPILAN 20 SP/GAZELLE | - 0,25 kg./ha molie vitei de vie sau |

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se poate complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **PLASMOPARA VITICOLA** (mana); **UNCINULA NECATOR** (fainare vitei de vie) ; **BOTRYTIS CINEREA** (putregaiul cenusiu).

PLASMOPARA VITICOLA (mana), boala se manifesta pe toate organele supraterane ale

plantei. Atacul pe frunze e cel mai frecvent, pe fata superioara a frunzelor, apar pete galbui. Acestea au aspectul de pete untdelemnii, petele untdelemnii conflueaza si ocupa portiuni mari pe limbul frunzei. Treptat, petele foliare se maresc, capata culoarea rosiatica, iar in dreptul tesuturilor se necrozeaza, se brunifica si se usuca. In timpul infloritului in anii ploiosi, atacul este foarte periculos pe ciorchinii tineri, deoarece acestia se usuca si cad. Boala se poate manifesta si pe boabe in toate stadiile de dezvoltare. Atacul se poate manifesta prin putregaiul cenusiu si putregai brun. Fructele infectate sunt acoperite cu puf alb – cenusiu. Putregaiul brun apare pe boabele mai mari, infectia se realizeaza prin reduncul si receptacul. Boabele atacate devin brune, se zbarcesc si cad.

BOTRYTIS CINEREA (Putregaiul cenusiu), atacul se manifesta pe frunze, lastarii tineri si fructe. Pe frunze apar pete, initial galbui, care apoi devin rosiatice. In dreptul petelor foliare, se dezvolta un mucegai cenusiu. Pe lastari, infectia incepe de la noduri, unde tesuturile afectate sunt acoperite de mucegai cenusiu. Atacul pe fructetele mature este cel mai pagubitor. Acestea au la inceput culoare galbena- cenusie sau violacee. Bacele se inmoaie, crapa si sunt acoperite de un mucegai cenusiu. Aceste fructe putrezesc si se desprind usor de pe peduncul.

1. **YUKON** - 4,0- 6,0 l/ha mana sau
2. **ZORVEC ZELAVINORONDIS** - 0,2 – 0,6 l/ha mana sau
3. **UNIVERSALIS 593 SC** - 2,0 l/ha mana, fainare sau
4. **KANTAREL** – 0,3- 0,4 l/ha fainare sau
5. **BOSKET** – 1,0-1,2 kg./ha putregaiul cenusiu sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **14 -17. 07. 2025**

Faza fenologica: compactarea ciorchinilor - parga.

Alte recomandări;

Tratamentul se va repeta la 10-14 zile in functie de remanenta produsului folosit si conditiile meteo!

Se va respecta obligatoriu perioada de pauza pana la recoltare, in functie de remanenta pesticidelor folosite!

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

In conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, precum si Ordinul nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Toti utilizatorii profesionisti au obligatia de a completa la zi tratamentele fitosanitare conform modelului mai jos atasat si sa pastreze pentru o perioada de cel putin trei ani evidenta produselor fitosanitare care sunt utilizate la nivelul fermei.

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg./l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

