

NR.833/03.07.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 29/03.07.2025

Lăcusta marocană (*Dociostaurus Maroccanus*) distruge toată masa verde a plantelor gazdă când densitatea populației dăunătorului este mare. În stadii avansate de dezvoltare se deplasează în roiuri putând acoperi zilnic suprafețe de până la 50 km și provocând daune severe vegetației. Se hrănesc 20 - 25 de zile până la maturitatea sexuală, apoi urmează împerecherea și depunerea ouălor. O femelă depune 120 -160 de ouă. Insectele atacă o gamă largă de culturi, în cazuri extreme pot distruge vegetația pe suprafețe întinse. Controlul acestui dăunător este mai ușor împotriva larvelor, deoarece acestea sunt localizate pe suprafețe mai mici, nu pot zbura și sunt mai sensibile la insecticide. Odată dezvoltată, o invazie de lăcuste este aproape imposibil de controlat.

În perioada mai - iunie 2025, în Bulgaria, s-a înregistrat o invazie masivă de lăcuste marocane, localizată la 430 km de România, unde autoritățile au declarat stare de calamitate. Insectele au fost semnalate în număr mare pe pajiști, pășuni și terenuri virane. Roiurile de lăcuste pot migra rapid pe distanțe mari, în condiții favorabile de temperatură și umiditate.

**Lăcusta marocană (*Dociostaurus Maroccanus*)****Lăcusta marocană (*Dociostaurus Maroccanus*) oua în sol**

Măsurile preventive constau în identificarea locurilor unde lăcustele își depun ouăle și distrugerea maselor de ouă din solurile infestate prin arătură, pentru a scoate cuiburile de ouă la suprafață.

Intocmit,
Ing. Filciu Minodora