

BULETIN DE AVERTIZARENr. 52 din 02 Iunie 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe □, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS), AFIDE , ANTRACNOZA FRUNZELOR (COCCOMYCES HIEMALIS)**CARE POATE CAUZA PIERDERI IMPORTANTE LA: CIREȘ ȘI VIȘIN****SCURTĂ DESCRIERE A BOLII SAU DĂUNĂTORULUI:**

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE: ZONELE AFECTATE DE PĂDUCHE SE ÎNROȘESC ȘI SE NECROZEAZĂ DIN CAUZA UNEI SUBSTANȚE TOXICE PE CARE PADUCHELE O INJECTEAZĂ ÎN TIMP CE SE HRĂNEȘTE.

AFIDELE:

FRUNZELE AFECTATE, INCLUSIV CELE DIN VÂRFUL LĂSTARILOR TINERI, SE RĂSUCESC DE LA VÂRF SPRE PEȚIOL. POMII AFECTAȚI PREZINTĂ CREȘTERI REDUSE, DIFERENȚIERE SLABĂ A MUGURILOR DE ROD PENTRU ANUL URMĂTOR, CREȘTERE SLABĂ. AFIDELE SECRETĂ PE PLANTE SUBSTANȚE LIPICIOASE BOGATE ÎN ZAHARURI, CUNOSCUTE SUB DENIMIREA DE „ROUA DE MIERE”. ACESTE EXCREMENTE ATRAG FURNICILE ȘI FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA CIUPERCILOR PRECUM FUMAGINA.

ANTRACNOZA CIREȘULUI: PE PARTEA SUPERIOARĂ A FRUNZEI APAR PETE MICI DE 1-2 MM, CIRCULARE, PURPURI. PETELE CRESC CA NUMĂR ȘI DIAMETRU PÎNĂ LA 0,6 CM. PETELE CONFLUEAZĂ ȘI DEVIN NEREGULATE, AFECTÂND ÎNTREAGA FRUNZĂ. FRUNZELE SE ÎNGĂLBENESC ȘI CAD.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

DUPĂ RECOLTARE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

POLECI / (DECA 2,5 EC)= (0,05-0,075 %) + SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC) =0,2 L/HA

Alte recomandări:

*** PENTRU AFIDE SE POATE UTILIZA PRODUSUL TEPPEKI / (AFINTO)= 0,140 KG/HA**

*** PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL NISSORUN 10 WP=0,3 KG/HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -

Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România – ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnătura/ștampila

Bocu Marcel



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului i, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.