


BULETIN DE AVERTIZARE Nr.38 din 12.08.2025

Oficiul Fitosanitar Teleorman, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de: **VITĂ DE VIE**, împotriva **PUTREGAIULUI CENUȘIU** (Sclerotinia f.)

Botrytis fuckeliana Putregaiul cenușiu este un agent patogen polifag care produce pagube însemnate în toamnele ploioase. Denumirile putregaiului cenușiu sunt: Botrytis fuckeliana (forma sexuală) și Botrytis cinerea (forma asexuală). Agentul patogen ierneză sub formă de microscleroți. Când condițiile devin favorabile, ciupercă se dezvoltă și determină apariția infecției. Miceliul ciupercii trăiește saprofit pe diferite substraturi organice, fiind format din conidiofori și conidii. Infecția este favorizată de leziunile provocate de molia strugurilor, de crăparea boabelor, de atacul de făinare, insecte (viespi, albine). Agentul patogen este puțin pretențios față de temperatură, infecțiile având loc între 1°C și 32°C, optimum fiind 22°-23°C. Atacul este favorizat de persistența apei pe struguri și umiditatea relativă ridicată (80-100%).



Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă folosirea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

1. TAE GRO

Vita de vie	Boli	mana vitei de vie, Fainarea, putregaiul cenușiu	0,37 kg/ha, pauza 3 zile
-------------	------	---	--------------------------

2. BOTREFIN/ (SHIFT - a doua denumire comerciala)

Vita de vie (struguri de masa)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	0,6-1,0 Kg/ha	7 zile pauza
Vita de vie (struguri de vin)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	0,6-1,0 Kg/ha	21 zile pauza

3. BOSKET

Vita de vie	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) – Un singur tratament/an în unul din următoarele stadii de dezvoltare a vitei de vie: sfarsitul înfloriturii, înainte de compactarea ciorchinului sau la intrarea în parga a strugurilor.	1,0 – 1,2 kg/ha
-------------	------	---	-----------------

4. PRINT

Vita de vie	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) – Se aplica de cand 60% din flori sunt scuturate pana la sfarsitul înfloriturii. Se aplica de la formarea boabelor. Se aplica de la începutul coacerii pana la culoarea specifica solului.	1,5 l/ha
-------------	------	--	----------

5. CALIZI/(SINPRO - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Fainarea, mana vitei de vie	1,0 l/ha se aplica atunci cand inflorescentele sunt complet dezvoltate. 21 zile pauza.
-------------	------	-----------------------------	--

Alte recomandari :

Verificati cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.


Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine, in conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare .

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,

LUNGU FELICIA



www.anfdf.ro