

BULETIN DE AVERTIZARE  
Nr 45 din 07.07.2025

Condițiile climatice din ultima vreme pot favoriza infecția cu **mană** (*Phytophthora infestans*) la culturile de **CARTOF** (*Solanum tuberosum*) și atacul de Gandacul din Colorado (*Leptinotarsa decemlineata*)



Mană se manifestă pe organele aeriene și pe tuberculi. Primele simptome se observă pe frunze prin luniile mai-iunie, de obicei înainte de înfloritul culturilor. Pe frunzele atacate apar pete galbui, la început mici, cu un contur difuz și mai numeroase la marginea foliolelor. Petele se maresc treptat, devin brune, apoi brun-negricioase și sunt înconjurate de o dungă galbenă, cu margini neregulate și difuze.

**A ) Efectuați tratament preventiv sau curativ** împotriva patogenului, când frunzele plantelor de pe același rând se ating între ele (înălțimea plantelor de aproximativ 20-30 cm) cu unul din următoarele produse de protecția plantelor :

- |                        |             |            |
|------------------------|-------------|------------|
| - ZORVEC ENICADE ..... | 0,15 l/ha ; | <i>sau</i> |
| - SHIRLAN 500 SC ..... | 0,4 L/HA    | <i>sau</i> |
| - ARMETIL COBRE .....  | 2,5 kg/ha   |            |

Pentru combaterea GÂNDACULUI DE COLORADO, puteți adăuga unul din produsele :

- |                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| - MAVRIK 2 F .....    | 0,20 L/ ha | <i>sau</i> |
| - MOSPILAN 20 SG..... | 0,1 Kg/ha  |            |

Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST-EXPERT de pe site-ul M.A.D.R ( [www.madr.ro](http://www.madr.ro) ) .

**B ) Măsuri ecologice de combatere :**

- cultivarea cartofului în soluri nisipoase, evitându-se solurile compacte, care rețin apă;
- se vor folosi pentru plantare doar tuberculi sănătoși ce provin din surse autorizate;
- pentru răsărirea uniformă și mai timpurie a cartofilor se recomandă punerea lor la forțăt, la temperaturi de 15-17 grade Celsius, cu 30 zile înainte de plantare;
- se recomandă plantarea adâncă a tuberculilor, la 10-15 cm, ceea ce duce la micșorarea infecțiilor tardive provocate de conidii;
- se vor recolta cartofii pe vreme frumoasă, iar tuberculii recoltați se lasă în straturi subțiri pentru zvântare;

**Reamintim producătorilor de cartof pentru consum care cultiva o suprafață mai mare de 0,5 ha despre obligativitatea de a se înregistra la O.F. Botosani.**

Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST – EXPERT de pe site-ul M.A.D.R. ([www.madr.ro](http://www.madr.ro) ). Producătorii agricoli (utilizatorii de produse de protecție a plantelor) trebuie să cunoască și să respecte întocmai condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole aşa cum sunt prevăzute în “**Ghidul de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor**”: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

**Alte recomandări:**

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme linistită sau la viteze ale vantului cuprinse între 0,5-3 m/sec. La viteze ale vantului mai mari de 3 m/sec. **NU SE VOR EFECTUA TRATAMENTE FITOSANITARE !!!**
- cititi cu atenție toate instructiunile de pe eticheta produsului;
- utilizati responsabil toate produsele fitosanitare;
- nu tratati langa cursurile de apa ,santuri și alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- folositi numai aparate de stropit în stare perfectă de funcționare , bine reglate și calibrate;
- clătit de trei ori ambalajele în care au fost p.p.p și turnați apa de clătire în cuva;
- aplicati pe parcele tratata restul de solutie din cuva , diluata cu apa de clătire;
- spalati aparatele de stropit după fiecare tratament;
- nu deversati apele reziduale langa cursurile de apa , locuinte.

**Măsuri pentru protecția familiilor de albine :**

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor conform Ordinului Comun nr. 45/1991 al M.A.A. privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15b/3404/1991 al Departamentului pentru

Administratie locala, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicațiilor cu produse de protectia plantelor. Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, detinătorii de suprafete agricole si silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole si silvice pe care le detin sunt obligati sa anunte in scris, consiliile locale cu cel putin 48 ore inaintea de efectuarea tratamentului, precum si denumirea produsului folosit. Consiliile locale, precum si administratorii terenurilor agricole si silvice trebuie sa anunte in scris sau telefonic, apicultorii care au vatra de stupina stationara/permanenta sau temporara/pastorală, cu cel putin 24 ore inaintea efectuarii de catre detinatorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substante chimice, in vederea prevenirii intoxicațiilor la albine

**ANEXA:**

**ATENȚIONARE!** Toți utilizatorii de produse de protecție a plantelor (persoane fizice și juridice) **au obligația de a detine și completa la zi „Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, cerință obligatorie conform Ordinului 352 din 10.02.2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10), cu modificările și completările ulterioare**, după modelul de mai jos:

*Nume și prenume fermier/soc. comercială.....*  
*Domiciliu fermier/sediul social al societății .....*  
*(Comuna, județul)*  
*Ferma (nume/număr, adresa).....*

**REGISTRU**

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratam.<br>(ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul (BF/parcelă ) | Timpul aplicării/fezofaza culturii | Tratamentul efectuat                          |                      |                               |                |                             | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|---|
|  |   |                                    | Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) |   |  |   |
|  |   |                                    |   |                      |                               |                |                             |   |  |   |

Se vor utiliza numai produse de protecție a plantelor omologate de C.N.O.P.P.P., pentru utilizare în România, care se regăsesc în baza de date **PEST - EXPERT**: <https://aloe.anfdf.ro/>.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa **Oficiului Fitosanitar Botoșani** la tel/fax: **0231/518227** e-mail: [ofbotosani@anfdf.ro](mailto:ofbotosani@anfdf.ro)

**Vă rugăm să afișați la loc vizibil Buletinul de Avertizare pentru informarea tuturor celor interesați.**

Coordonator,  
ing. COSTIN Constantin



Consilier superior,  
ing. NECHIFOR Radu

