

BULETIN DE AVERTIZARE 68 din 11.07.2025

Oficiul Fitosanitar Calarasi, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **VITA DE VIE** împotriva: moliei vitei de vie (*Lobesia b.*)

Lobesia botrana

Primavara, adultii (fluturii) generatiei hibernante depun ouale din care, dupa o perioada de incubatie de 6-8 zile, apar larvele. Larvele din prima generatie rod bobocii florali si florile, infasurand partile atacate cu fire de matase sub forma de cuiburi. Uneori, ele rod galerii si in interiorul lastarilor. Bobocii si florile atacate se usuca si cad. O singura omida poate distruge 60-80 de boboci. Perioada larvara dureaza 25-30 de zile, in functie de temperatura. Perioada de nimfa dureaza 10-13 zile. Adultii generatiei intai apar la inceput de iunie. Acestia depun ouale generatiei a II-a, care se dezvoltă pana la inceputul lunii august, cand apar adultii. Acestia depun ouale generatiei a III-a pe boabele de struguri. Larvele din generatiile a II-a si a III-a ataca boabele strugurilor. O singura omida poate distruge pana la 18-20 de boabe. Boabele verzi atacate se zbarcesc, se brunifica si cad, iar cele in parga sau coapte, mai ales pe timp ploios, sunt infectate cu ciuperca *Botrytis cinerea* si putrezesc.



Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă folosirea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

1. DECIS 25 WG

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	30 g/ha. 7 zile pauza struguri de masi si 35 zile pauza struguri de vin.
-------------	-----------	--------------------------------	--

2. AFFIRM

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	1,5 kg/ha
-------------	-----------	--------------------	-----------

3. CORAGEN

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	150 - 175 ml/ha. 30 zile pauza.
-------------	-----------	--------------------	---------------------------------

4. KARATE ZEON

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	0,015% (0,15 l/ha/1000 l apa/ha) se aplica la avertizare. 7 zile pauza.
-------------	-----------	--------------------------------	---

5. TRAPER

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	0,15 – 0,2 l/ha. Se aplica la primele semne de infestare. Maxim 3 tratamente la interval de 7 zile.
-------------	-----------	--------------------------------	--

Alte recomandari :

Verificati cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine în conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ,nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ,Ministerului Mediului Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare .

Responsabil Prognoza si Avertizare

Micut – Istrate Daniela