

BULETIN DE AVERTIZARE 71 din 11.07.2025

Oficiul Fitosanitar Calarasi, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de **CIRES SI VISIN** impotriva agentului de daunare :**MONILIOZA** (*Monilinia spp*).

MONILIOZA (*Monilinia spp.*)

Atacul se manifesta pe ramuri, frunze, flori si fructe. Prima dată boala apare pe lăstari și flori, în primăvară, la toate speciile de samburoase. Organele atacate se ofilesc brusc, ducând la pierderi de recoltă de până la 60-90%.

Lăstarii și florile atacate nu produc fructe. Lăstarii atacați, cu frunze și flori brunificate, reprezintă o sursă puternică de infecție ce se poate manifesta în perioada de pârgă-recoltat pe fructele mature. Infecțiile secundare ce provin de la organele atacate se răspândesc cu ușurință prin vânt, ploaie și insecte. Organele atacate, ofilite și uscate rămân prinse pe pomi până toamna sau chiar în timpul iernii. Pe fructele în pârgă sau cele mature, alături de *Monilinia laxa* se găsește și *Monilinia fructigena*.

Tratamentul este curativ pentru agentul de daunare .

Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă folosirea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:



1. SCORE 250 EC

Visin	Boli	Monilioza	0,15 L/ha, 7 zile pauza.
Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha, 14 zile pauza.

2. BOUILLIE BORDELAISE WDG(BORDOMIX – a doua denumire comerciala)

Visin, cires	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophylla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha), 3 zile pauza
--------------	------	---	--------------------------------

3. TELDOR 500 SC

Cires	Boli	Monilioza	0,8 L/ha, 1- 2 tratamente
-------	------	-----------	---------------------------

4. ORIUS 25 EW

Cires	Boli	Monilioza	0,075 - 0,1 % (0,075-1,0 l/ha in 1000 L apa), 7 zile pauza
-------	------	-----------	--

5. SWITCH 62,5 WG

Cires	Boli	Monilioza	1,0 kg/ha, 7 zile pauza
-------	------	-----------	-------------------------

6. CONSUS 250 EC

Cires	Boli	Monilioza	0,2 l/ha, se aplica de la deschiderea primelor flori pana cand fructele sunt aproape gata pentru recoltare. Maxim 3 tratamente.
Visin	Boli	Monilioza	0,15 l/ha, se aplica de la deschiderea primelor flori pana cand fructele sunt aproape gata pentru recoltare. Maxim 2 tratamente.

Alte recomandari :

Verificati cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine, în conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ,Ministerului Mediului Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare .

Responsabil Prognoza si Avertizare

Micut – Istrate Daniela