

BULETIN DE AVERTIZARE 73 din 18.07.2025

Oficiul Fitosanitar Calarasi recomanda pentru culturi in camp de tomate , vinete , ardei pentru prevenirea si combaterea agentilor de daunare: **MANA**(*PHYTOPHTORA I*), **PATAREA CAFENIE** (*FULVIA F.*), **ALTERNARIA**(*ALTERNARIA SP.*), **PUTREGAIUL CENUSIU** (*BOTRYTIS C.*), **CANCERUL BACTERIAN** (*CORYNEBACTERIUM M.*), **SEPTORIA** (*SEPTORIA L.*)+**OMIDA CAPSULELOR**(*HELICOVERPA A.*), **MUSCULITA ALBA DE SERA** (*TRIALEURODES VAPORARIORUM*), **AFIDE**, (*APHIS SP.*), **TRIPSI** (*THRIPS SP.*), **ACARIENI** (*TETRANYCHYS U.*)

Se recomanda tratamente cu produse de protectia plantelor dupa cum urmeaza:

- 1. EVALIA (TAZER – a doua denumire comerciala) -0,05-0,08 % (50 – 80 ml/100 l apa)-tomate -mana , fainare , alternarioza + NISSORUN 10 WP -1,0 kg/ha acarianul rosu comun**
- 2. CUPROFIX ULTRA / NOVICURE-a doua denumire comerciala) -1,6-2,4 kg/ha la tomate si 1,4 – 1,8 kg/ha la vinete + AFFIRM -1,4 kg / ha (omida fructelor , molia tomatelor) la tomate, ardei.**
- 3. CALIZI / (SINPRO - a doua denumire comerciala) - 0,8 l/ha la tomate + CORAGEN (omida fructelor , molia tomatelor) – 175ml/ha, la tomate, vinete.**
- 4. CUPERTINE SUPER(COMBIDUO COBRE – a doua denumire comerciala) - 3,5 kg/ha (tomate , ardei, vinete) – mana, alternarioza + MAVRIK – 0,05%(omida fructelor , paduchele solanaceelor la tomate).**
- 5. CUPROXAT FLOWABLE – 5,3 l/ha – mana la tomate, ardei, vinete, de la a 5-cea frunza pana la coacerea deplina cu 7 zile pauza la ardei si 10 zile pauza tomate, vinete pentru industrializare, 3 zile pauza tomate, vinete pentru consum proapat + Nissorun 10 WP 1,0 kg /ha**
- 6. RIDOMIL GOLD R – 5 kg/ha - mana la tomate, se aplica 1 tratament de la a 5 – cea frunza pana la coacerea a 40 % din fructe.**
- 7. CONSUS 250 EC – 0,5 l/ha – alternaria la tomate, se aplica de la inceputul formarii lastarilor pana cand 70% din fructe prezinta culoarea tipica pentru coacere.**

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de daunare :

mana -10-20% frunze GA ;

patarea cafenie -3-10% frunze GA,

putregaiul cenusiu- 3-30 % fructe ,

alternaria- 10-25% frunze GA,
septoria -10-25% frunze G ,
omida capsulelor- 3-10% fructe,
acarieni -15-30% frunze GA,
musculita alba de sera -15-30% frunze GA.

GA = grad de atac

Alte recomandari :

Verificati cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine în conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare .

Responsabil Proгноza si Avertizare
Micut – Istrate Daniela