

**BULETIN DE
AVERTIZARE**

Nr.46.din 02.07.2025



Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:


**ANTRACNOZA FRUNZELOR DE CIREȘ, CIURUIREA FRUNZELOR, MONILIOZA + PADUCHELE CENUSIU, INSECTE
MÎNĂTOARE, ACARIENI, AFIDE, ALȚI DAUNĂTORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: CIREȘ, VISIN

Monilioza este o boală cauzată de o ciupercă microscopică, frecvent întâlnită la pomii samburoși, putând produce mari pagube. Atacul de monilioza se manifestă pe ramuri, frunze, flori și fructe, primăvara, cauzând arsura monilinică, iar mai apoi putrezirea fructelor.



ANTRACNOZA




Patogenul răspunzător este *Cocomyces hiemalis*. Este considerată drept una dintre cele mai păgubitoare boli ale cireșului și vișinului. Ciuperca atacă frunzele, mai rar ramurile și fructele. Pe frunze apar numeroase pete punctiforme purpurii sau de culoare brună, de 1-3 mm în diametru. Tesuturile dintre pete se îngălbenesc și cu cât numărul petelor este mai mare, fac ca toată frunza să devină galbenă, cu pete purpurii.

Frunzele se desprind de pe lăstari începând cu sfârșitul lunii august. Atacul se extinde cu rapiditate în anii ploioși, manifestându-se pe frunzele și ramurile superioare, pomii din plantațiile tinere sunt desfrunziți prematur, cu excepția câtorva frunze din vârf. Conidiile asigură infecții secundare repetate în timpul perioadei de vegetație pe frunze și ramuri, ele germinând în picăturile de apă la temperaturi de 21-26 grade Celsius.

Patogenul iernează sub forma unui miceliu scleroțial format în scoarța ramurilor și pe frunzele atacate. În primăvară, pe ramuri miceliul scleroțial formează un număr mare de conidii ce asigură infecțiile primare pe frunze. Ciuperca mai formează primăvara, pe lângă conidii și apotecii cu asce și ascospori care asigură de asemenea infecțiile primare. Anii cu ierni blânde și cu primăveri și veri ploioase pot favoriza apariția unor atacuri puternice ale ciupercii.

CIURUIREA (*Stigmata carpophylla*) este cauzată de o ciupercă microscopică care afectează pomii samburoși (piersic, nectarin, cais, cireș, prun, visin). Îmbolnăvirea pe scoarță și pe lăstari se produce primăvara sub forma unor

pete brune,izolate,circulare(ovale dispuse in jurul mugurilor),tesuturile afectate se rup,in urma acestora aparand fenomenul de osmoza (secretii cleioase).



Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 7 , 8 .

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Antracnoza -frunze cu grad de atac peste 10%,ciuruire-frunze cu grad de atac peste 5%(afide-15%)frunze cu atac. Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos dupa caz:

- 1. ALCUPRAL 50PU:2,0 kg/ha + DELTAGR/ FASTER DELTA I:0,25-0,30 litri/ha sau**
 - 2. CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL :3,5 litri/ha + KARATE ZEON:0,150 litri/ha sau**
 - 3. MERPAN 80 WDG/ FFO-CAPTAN : 2,0 kg/ha + LASER 240 SC/ (NEXSUBA:0,6 litri/ha in 1000 L apa/ha sau**
 - 4. LUNA EXPERIENCE 400SC:0,5 litri/ha + ALKAZAM 500WG/VALMERI 500WG:0,120-0,140 kg/ha sau**
- ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI**

Masuri alternative de combatere igiena culturala(igiena riguroasa a ramurilor) ;toamna se vor aduna si distruge fructele mumificate ramase in pomi ;ramurile atacate eliminate din coroana in urma taierilor vor fi distruse,prefersbil prin ardere.

Metode durabile : biologice,fizice,mechanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; 02-07.07.2025.

Alte recomandari : *Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii . Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C. In plantatiile pe rod se considera tratament cheie,de baza(pentru antracnoza.*

REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELAS PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani.Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 7 si 8). *Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.*

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurător. Cititi cu mare atentie instructiunile de pe eticheta produsului de protectie a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare!Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 a' ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației.Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognoza si Avertizare,

Vilcu Daniela Viorica