

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii: **Păduchele din San Jose Gen. 2** (*Quadraspidiotus perniciosus*), **Monilioză prun** (*Monilinia spp.*), **Pătare roșie** (*Polistigma rubrum*), care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Prun**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **Gen. II - păduche din San Jose**
Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Poleci (Deca 2,5 EC) = 0,05 - 0,075% + Signum (Syrex Star) = 0,5 kg/ha sau**
2. **Juvinal 10 EC = 0,05% + Teldor 500 SC = 0,8 l/ha.**

Perioada optimă de tratament: păduchele din San Jose - la apariția primelor larve mobile.

Atenție! Analiza ramurilor infestate de păduche se face desprinzând cu acul țestele și observarea apariției larvelor. **tratamentul II** – la interval de 7 – 9 zile de la efectuarea tratamentului anterior, cu un insecticid din altă grupă chimică.

Alte recomandări:

- Respectați timpul de pauză specificat pentru consumul fructelor.
- **Atenție!** In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Alte măsuri de combatere: Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice;

• Metodele durabile de combatere: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

• **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligații**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatarea, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

