

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
 A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR

**LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA
 DIN DATA DE 05.06.2018**

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS/ SUBSTANȚA ACTIVĂ	DEȚINĂTOR OMOLOGARE/ NR.CERTIFICAT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL	TESTE OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ					
FUNGICIDE					
1.	VIBRANCE SB 15 g/l sedaxan 22,5g/l fludioxonil 14,4 g/l metalaxil M	SYNGENTA AGRO SRL, ROMANIA CO: 418PC/05.06.2018	SMRZ: OLANDA	SFECLĂ DE ZAHĂR ȘI SFECLĂ FURAJERĂ <i>Pythium ultimum,</i> <i>Phoma betae,</i> <i>Thanatephorus cucumeris</i> – (telomorf al <i>Rhizoctonia solani</i>) • 33,3 mL/unitate (100.000 semințe) Tratament la sămânță.	—
ERBICIDE					
1.	ANGELUS 360 g/l clomazona	Rotam Agrochemical Europe Ltd, Marea Britanie CO: 419PC/05.06.2018	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	RAPITĂ: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,33 L/ha Preemergent (BBCH 00-05) CARTOF: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,25 L/ha Preemergent (BBCH 00-07)	PERICOL
2.	FENCE 480 g/l flufenacet	Albaugh UK Ltd., Marea Britanie CO: 420PC/05.06.2018	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	GRAU DE TOAMNA: Buruieni mono și dicotiledonate anuale • 0,5 L/ha Se aplică preemergent toamna de la semănat până la răsărire (BBCH 00-09) sau postemergent timpuriu primavara devreme, până la al 3-lea internod (BBCH 23).	ATENȚIE

				ORZ DE TOAMNĂ: Buruieni mono și dicotiledonate anuale • 0,5 L/ha Se aplică preemergent toamna de la semănat până la răsărire (BBCH 00-09) sau postemergent timpuriu primavara devreme, până la al 4-lea internod (BBCH 24)	
3.	FLAME 500 g/kg tribenuron-metil	Albaugh UK Ltd., Marea Britanie CO: 421PC/05.06.2018	SMRZ: MAREA BRITANIE	GRÂU DE TOAMNĂ : Buruieni dicotiledonate • 30 g/ha Se aplică când cultura se află în stadiul de 3 frunze până când ligula frunzei devine vizibilă (BBCH 13 – 39), iar buruienile sunt tinere în faza activă de creștere ORZ DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ: Buruieni dicotiledonate • 30 g/ha Se aplică când cultura se află în stadiul de 3 frunze până când ligula frunzei devine vizibilă (BBCH 13 – 39), iar buruienile sunt tinere în faza activă de creștere.	ATENȚIE

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ

FUNGICIDE

1.	CURZATE 600 g/kg cimoxanil	DuPont International Operations Sarl CO: 422PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN OLANDA	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 0,2 kg/ha	ATENȚIE
2.	PROXANIL 400 g/L propamocarb HCl + 50 g/L cimoxanil	Arysta Lifescience Benelux SPRL, Belgia CO: 423PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN GERMANIA + ITALIA	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 L/ha TOMATE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 L/ha Se aplică preventiv sau la apariția primelor simptome.	ATENȚIE
3.	AMISTAR GOLD 125 g/L azoxistrobin + 125 g/L difenoconazol	SYNGENTA AGRO SRL, ROMANIA CO: 424PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN CROATIA	RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Leptosphaeria maculans</i> = <i>Phoma lingam</i> • 1,0 L/ha <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha	ATENȚIE



				SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola</i> <i>Uromyces betae</i> <i>Erysiphe betae</i> <i>Ramularia beticola</i> • 1,0 L/ha FLOAREA-SOARELUI: <i>Diaporthe (Phomopsis) helianthi</i> ; <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Leptosphaeria lindquistii=Phoma macdonaldi</i> • 1,0 L/ha	
4.	MAKLER 250 SE 250 g/L azoxistrobin	INNVIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 425PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	GRĂU DE TOAMNĂ: <i>Puccinia recondita</i> <i>Mycosphaerella graminicola</i> <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,0 L/ha TRITICALE DE TOAMNĂ: <i>Puccinia recondita</i> <i>Mycosphaerella graminicola</i> <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,0 L/ha ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Puccinia hordei</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Pyrenophora teres</i> • 1,0 L/ha RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Alternaria brassicae</i> <i>Botryotinia fuckeliana</i> • 1,0 L/ha <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha	ATENȚIE
5.	CUSTODIA 320 SC 120 g/L azoxistrobin + 200 g/L tebuconazol	ADAMA AGRICULTURE BV, OLANDA CO: 259PC/19.12.2016	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	EXTINDERE OMOLOGARE: VIȚĂ DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,175-0,7 L/ha Dozele de aplicare sunt următoarele și se aplică astfel: • 0,175 L/ha - când există pericol de infecție, la avertizare ; • 0,35 L/ha - la începutul înfloriturii (BBCH 61); • 0,525 L/ha - la formarea fructelor (BBCH 71); • 0,7 L/ha - când boabele sunt de mărimea boabelor de mazăre (BBCH 75).	ATENȚIE
INSECTICIDE-ACARICIDE					
1.	ACTELLIC 2/P 2% pirimifos-metil	NEWPHARM SRL, ITALIA CO: 426PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN <u>ITALIA</u>	CEREALE DEPOZITATE (GRĂU,OVĂZ,ORZ, TRITICALE): <i>Coleoptera: Sitophilus spp.,</i> <i>Tribolium spp., Oryzaephilus</i>	ATENȚIE



				spp., <i>Trogoderma</i> spp., <i>Rhyzopertha</i> spp. Molii: <i>Sitotroga</i> spp., <i>Ephestia</i> spp. • 200 g/tonă Se aplică încorporat omogen în toată cantitatea de cereale depozitate. • 25 g/m² Se aplică prin pulverizare pe pereți și tavan, pentru tratarea spațiilor pentru depozitarea cerealelor.	
2.	ACTELIC 5 5% pirimifos-metil	NEWPHARM SRL, ITALIA CO:427PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN ITALIA	CEREALE DEPOZITATE (GRÂU, OVĂZ, ORZ, TRITICALE): <i>Coleoptera: Sitophilus</i> spp., <i>Tribolium</i> spp., <i>Oryzaephilus</i> spp., <i>Trogoderma</i> spp., <i>Rhyzopertha</i> spp. Molii: <i>Sitotroga</i> spp., <i>Ephestia</i> spp. • 90mL/tonă Se aplică încorporat omogen în toată cantitatea de cereale depozitate. • 11,5 mL/m² Se aplică prin pulverizare pe pereți și tavan, pentru tratarea spațiilor pentru depozitarea cerealelor.	ATENȚIE

NEMATOCIDE

1.	TERVIGO 20 g/L abamectin	SYNGENTA AGRO SRL, ROMANIA CO: 428PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN ITALIA	ARDEI, VINETE, TOMATE, CASTRAVEȚI, DOVLECEI, FASOLE, PEPENE GALBEN, PEPENE VERDE, DOVLEAC (SPAȚII PROTEJATE): <i>Meloidogyne</i> spp. • 5,0 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunze până la coacere (BBCH 12-89).	ATENȚIE
----	------------------------------------	--	---	---	----------------

ERBICIDE

1.	ADIUNKT 500 SC 500 g/L diflufenican	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 429PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate Buruieni sensibile: <i>Viola arvensis, Stellaria</i> <i>media, Lamium amplexicaule,</i> <i>Myosotis arvensis, Veronica</i> <i>hederifolia, Veronica persica,</i> <i>Vicia cracca</i> Buruieni moderat sensibile: <i>Matricaria inodora, Galium</i> <i>aparine</i> Buruieni cu rezistență moderată: <i>Centaurea cyanus, Apera</i>	ATENȚIE
----	---	---	--	--	----------------



				<i>spica-venti</i> <u>Buruieni rezistente:</u> <i>Papaver rhoeas</i> • 0,24 L/ha Se aplică postemergent (BBCH 14-23), de la stadiul de 4 frunze până la stadiul de 3 frați vizibili; buruienile cât mai tinere în faze incipiente de creștere și dezvoltare. <u>Buruieni sensibile:</u> <i>Viola arvensis, Stellaria media, Lamium amplexicaule, Myosotis arvensis, Veronica hederifolia, Veronica persica, Vicia cracca</i> <u>Buruieni moderat sensibile:</u> <i>Matricaria inodora, Galium aparine, Apera spica-venti</i> <u>Buruieni cu rezistență moderată:</u> <i>Centaurea cyanus, Papaver rhoeas</i> • 0,30 L/ha Se aplică postemergent (BBCH 14-23), de la stadiul de 4 frunze până la 3 frați vizibili; buruienile cât mai tinere în faze incipiente de creștere și dezvoltare.	
2.	EFECTOR 360 CS 360 g/L clomazona	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 430PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>RAPIDĂ DE TOAMNĂ</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate <u>Buruieni sensibile:</u> <i>Geranium pusillum, Stellaria media, Chenopodium album, Matricaria inodora, Galium aparine, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense</i> <u>Buruieni moderat sensibile:</u> <i>Centaurea cyanus</i> <u>Buruieni cu rezistență moderată:</u> <i>Viola arvensis, Apera spica-venti</i> <u>Buruieni rezistente:</u> <i>Agropyron repens</i> • 0,33 L/ha Se aplică toamna, preemergent în timp de 3 zile după semănat (BBCH 00; buruienile sunt în curs de germinare	PERICOL
3.	MAJOR 300 SL 300 g/L clopiralid	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 431PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>RAPIDĂ DE TOAMNĂ:</u> Buruieni anuale și perene dicotiledonate (<i>Centaurea cyanus, Matricaria inodora, Cirsium arvense, Anthemis arvensis, Matricaria chamomilla</i>) • 0,3-0,4 L/ha Se aplică primăvara, după	ATENȚIE



				începerea vegetației, însă nu mai târziu de începutul formării bobocilor de flori de rapiță (BBCH 50). • 0,3 L/ha Se aplică toamna de la faza de 3 frunze până la cea de 4 frunze (BBCH 13-14). • 0,3 L/ha +1,5 L/ha METAX 500 SC Se aplică toamna de la faza de 3 frunze până la cea de 4 frunze (BBCH 13-14). GRÂU DE TOAMNĂ: Buruieni anuale și perene dicotiledonate (<i>Matricaria inodora</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>) • 0,3-0,4 L/ha Se aplică primăvara de la începutul înfrățirii până la sfârșitul fazei de înfrățire a cerealelor (BBCH 20-29). 1 tratament SFECLĂ DE ZAHĂR: Buruieni anuale și perene dicotiledonate (<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>) • 0,3-0,4 L/ha Se aplică în faza de 2-4 frunze de sfeclă (BBCH 12-14). • 0,2 L/ha x 3 Se aplică 3 tratamente a câte 0,2 L/ha, după cum urmează: primul tratament se efectuează în faza de 2-4 frunze de sfeclă (BBCH 12-14), iar următoarele tratamente se efectuează după apariția ulterioară a buruienilor.	
4.	WISH TOP 120 g/L quizalofop-p-etil	Sharda Europe b.v.b.a., Belgia CO: 432PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN ITALIA	MĂR, PĂR, PIERSIC: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). VITĂ DE VIE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică postemergent,	PERICOL



				buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>CĂPȘUN ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI (AFIN, ZMEUR, COACĂZ):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>CARTOF:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>SFECLĂ DE ZAHĂR:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>FLOAREA-SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>TUTUN:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>SFECLĂ DE ZAHĂR:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>LUCERNĂ, TRIFOI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>SOLANACEE (TOMATE, VINETE):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>LEGUME PENTRU FRUNZE</u>
--	--	--	--	---

				<u>(SALATĂ VERDE, SCAROLA, CICOARE, SPANAC, PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>LEGUMINOASE (MAZĂRE, FASOLE, LINTE, NĂUT):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>OLEAGINOASE (RAPIȚĂ, ÎN SOIA, BUMBAC):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>PLANTE ORNAMENTALE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm). <u>PĂDURI ȘI PEPINIERE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,83-1,25 L/ha Se aplică postemergent, buruieni în faza de 3-4 frunze (5-10 cm).	
5.	BASAGRAN SL 480 g/L bentazona	BASF SE GERMANIA CO: 433PC/05.06.2018	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN REPUBLICA CEHA	<u>CEREALE, PORUMB, TRIFOI, LUCERNĂ, BOB, SOIA, FASOLE, MAZĂRE, AMESTEC CEREALE-LEGUMINOASE, CARTOFI, AMESTEC TRIFOI-GRAMINEE:</u> Buruieni dicotiledonate • 2,0 L/ha Se aplică postemergent culturilor; buruieni în faza de 2-4 frunze.	ATENȚIE
6.	PIXXARO 12 g/L halauxifen + 280 g/L fluroxipir	DOW AGROSCIENCES LLC CO: 295PC/28.02.2017	AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN MAREA BRITANIE	<u>CEREALE DE PRIMĂVARĂ (GRÂU, GRÂU DURUM, ORZ, SECARĂ)</u> Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Polygonum</i>	ATENȚIE



				<i>convolvulus, Polygonum aviculare, Stellaria media, Solanum tuberosum</i>) • 0,25 L/ha - 0,5* L/ha Se aplică de la BBCH 13 (stadiul culturii 3 frunze) până la BBCH 45 (teaca frunzei stindard umflată). Pentru buruieni: când acestea sunt mici, în plină dezvoltare. (*în funcție de infestare) <u>CEREALE DE TOAMNĂ</u> <u>(GRÂU, GRÂU DURUM, ORZ, SECARĂ, TRITICALE)</u> Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Ambrosia artemisiifolia, Centaurea cyanus, Capsella bursa-pastoris, Fumaria officinalis, Galium aparine, Galeopsis tetrahit, Geranium pusillum, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Stellaria media</i>) • 0,25 L/ha - 0,5* L/ha Se aplică de la BBCH 13 (stadiul culturii 3 frunze) până la BBCH 45 (teaca frunzei steag umflată). Pentru buruieni: când acestea sunt mici, în plină dezvoltare. (*în funcție de gradul de infestare)	
7.	PROMAN 500 g/L metobromuron	Belchim Crop Protection NV/SA Belgia CO: 2871/29.09.2014	EXTINDERE AUTORIZARE DUPĂ OMOLOGARE DIN FRANTA	<u>EXTINDERE OMOLOGARE:</u> <u>FLOAREA-SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 2-3 L/ha (în funcție de tipul de sol) Se aplică preemergent. <u>SOIA:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 2-3 L/ha (în funcție de tipul de sol) Se aplică preemergent.	ATENȚIE

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR CONFORM ART.43

ERBICIDE

1.	ALLIANCE 660 WG 60 g/kg metsulfuron- metil + 600 g/kg diflufenican	NUFARM GmbH & Co KG, AUSTRIA CO: 2794/14.08.2008	<u>SMRZ:</u> SLOVENIA	<u>Grâu</u> Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 100 g/ha (singur sau asociat cu un adjuvant) Se aplică postemergent: <u>Cultura</u> – de la apariția primei frunze până la înfrățire (BBCH 10-29). <u>Buruieni</u>, peste 70% răsărite, 2-4 frunze	ATENȚIE
----	--	--	---	--	---------



2.	SAVVY/ (RICORSO-a doua denumire comercială) 200 g/kg metsulfuron-metil	Rotam Agrochemicals CO: 085PC/21.01.2015	SMRZ: SLOVENIA	CEREALE DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ (GRÂU, ORZ, OVĂZ, TRITICALE, SECARĂ, GRÂU DUR): Buruieni dicotiledonate • 30 g/ha Se aplică postemergent. CULTURA (Grâu, Ovăz, Triticale, Secară): de la stadiul de 2 frunze până la stadiul de frunză stindard (BBCH 12-39) Orz: de la stadiul de 3 frunze până la stadiul de frunză standard (BBCH 13-39). Buruieni: 2-3 frunze	ATENȚIE
3.	ACCURATE 200 g/kg metsulfuron-metil	CHEMINOVA A/S, DANEMARCA CO: 130PC/22.07.2015	SMRZ: SLOVENIA	GRÂU DE TOAMNĂ: Buruieni dicotiledonate anuale. Se aplică un tratament postemergent astfel: • 0,02 kg/ha toamna în fenofaza de 3-9 frunze (BBCH 13-19). sau • 0,03 kg/ha primăvara înainte de înfrățire până la apariția frunzei standard (BBCH 30-39). ORZ DE TOAMNĂ: Buruieni dicotiledonate anuale. Se aplică un tratament postemergent astfel: • 0,02 kg/ha toamna în fenofaza de 3-9 frunze (BBCH 13-19). sau • 0,03 kg/ha primăvara înainte de înfrățire până la apariția frunzei standard (BBCH 30-39). ORZ DE PRIMĂVARĂ: Buruieni dicotiledonate anuale. Se aplică un tratament postemergent astfel: • 0,02 kg/ha toamna în fenofaza de 3-9 frunze (BBCH 13-19). sau • 0,03 kg/ha primăvara înainte de înfrățire până la apariția frunzei standard (BBCH 30-39). SECARĂ: Buruieni dicotiledonate anuale. Se aplică un tratament postemergent astfel:	ATENȚIE



				• 0,02 kg/ha toamna în fenofaza de 3-9 frunze (BBCH 13-19) . sau • 0,03 kg/ha primavara înainte de înfrățire până la apariția frunzei standard (BBCH 30-39). TRITICALE : Buruieni dicotiledonate anuale. Se aplică un tratament postemergent astfel: • 0,02 kg/ha toamna în fenofaza de 3-9 frunze (BBCH 13-19) . sau • 0,03 kg/ha primavara înainte de înfrățire până la apariția frunzei standard (BBCH 30-39). TERENURI NECULTIVATE: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,02 kg/ha Se aplică un tratament postemergent, primăvara.	
4.	PELICAN DELTA 600 g/kg diflufenican + 60 g/kg metsulfuron – metil	CHEMINOVA A/S, DANEMARCA CO: 2775/27.03.2008	SMRZ: SLOVENIA	GRÂU: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,07 kg/ha (singur sau asociat cu un adjuvant). Se aplică postemergent, primăvara. Cultura: de la 3 frunze până la înfrățire (BBCH 13-29). Buruieni: 2–4 frunze. ORZ DE PRIMĂVARĂ: • 0,100 kg/ha (singur sau asociat cu un adjuvant). Se aplică postemergent, primăvara. Cultura: de la înfrățire până la apariția frunzei standard (BBCH 30-39). Buruieni: 2–4 frunze.	ATENȚIE
5.	DICOPUR D/ (PRODATE REDOX a doua denumire comercială) 600 g/L acid 2,4-D	NUFARM GmbH & Co KG, AUSTRIA CO: 1783/13.03.1997	SMRZ: OLANDA	GRÂU: Buruieni dicotiledonate anuale și perene, sensibile la 2,4 D (<i>Chenopodium album</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Atriplex</i> spp., <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Urtica</i> spp., <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Sonchus oleraceus</i>) • 1,0 L/ha Se aplică postemergent, primăvara. Grâu: de la stadiul de 3 frunze până la sfârșitul	PERICOL



				înfrățiului (BBCH 13-29) PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale și perene, sensibile la 2,4 D (<i>Chenopodium album</i> , <i>Cirsium arvense</i> -MS, <i>Convolvulus arvensis</i> -MS, <i>Polygonum</i> spp.-MS, <i>Stellaria media</i> -MS) • 1,0 L/ha Se aplică postemergent. Cultura: stadiul de 3-6 frunze (BBCH 13-16) Buruieni: 2-4 frunze (<i>Cirsium</i> < 10 cm)	
--	--	--	--	--	--

REOMOLOGARE

FUNGICIDE

1.	RANCONA 15 ME 15 g/L ipconazol	ARYSTA LIFESCENCE, MAREA BRITANIE CO: 2791/14.08.2008	-	GRÂU: <i>Tilletia</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. • 1,0 L/tona Se aplică preventiv la tratamentul seminței (BBCH 00) ORZ: <i>Ustilago nuda</i> , <i>Pyrenophora graminea</i> • 1,33 L/tona Se aplică preventiv la tratamentul seminței (BBCH 00).	ATENȚIE
2.	KARATHANE M35 CE 350 g/L meptildinocap	DOW AGROSCIENCES, SUA CO: 2365/19.12.2007	-	VITĂ DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,5 L/ha Se aplică de la stadiul de 3 frunze până la intrarea în pârgă (BBCH 13-81). MĂR: <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,06% (0,9 L/ha în 1500L de apă) Se aplica înainte de înflorit.	ATENȚIE
3.	KARATHANE GOLD 350 EC 350 g/L meptildinocap	DOW AGROSCIENCES, SUA CO: 2676/19.12.2006	=	VITĂ DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,5 L/ha Se aplică de la stadiul de 3 frunze până la intrarea în pârgă (BBCH 13-81). CASTRAVETI (SOLARII) <i>Sphaerotheca fuliginea</i> • 0,5 L/ha	ATENȚIE
4.	TACHIGAREN 70 WP 700 g/Kg himexazol	MITSUI CHEMICALS Inc., JAPONIA CO: 491/30.07.1976	SMRZ: FINLANDA	SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Aphanomyces</i> spp., <i>Pythium</i> spp. • 40 g/UG' (UG=100.000 semințe) Tratament sămânță.	PERICOL
5.	CYFLAMID 5 EW 50 g/l ciflufenamid	NIPPON SODA, JAPONIA CO:	SMRZ: OLANDA	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i> • 0,2 Lha VITĂ DE VIE:	—



		2270/27.05.2004		<i>Uncinula necator</i> • 0,3 L/ha MĂR: <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,45 L/ha	
6.	MIKAL FLASH 250 g/kg folpet + 500 g/kg fosetil de aluminiu	BAYER AG, Germania CO: 2153/11.10.2002	-	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 3,0 kg/ha	ATENȚIE
7.	DOMARK 10 EC 100 g/L tetraconazol	ISAGRO S.p.A., ITALIA CO: 2571/12.10.2005	-	MĂR: <i>Podosphaera leucotricha</i>, <i>Venturia inaequalis</i> • 0,4 L/ha (0.027%) VITĂ DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,250 L/ha TOMATE (SERE ȘI SOLARII): <i>Leveillula taurica</i> • 0,4 L/ha (0.04%)	PERICOL
8.	ORTIVA TOP 200 g/L azoxistrobin + 125 g/L didenoconazol	SYNGENTA AGRO SRL, ROMANIA CO: 068PC/21.01.2015	SMRZ: UK	TOMATE (SERE ȘI SOLARII): <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Cladosporium fulvum</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Alternaria alternata</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. VINETE (SERE ȘI SOLARII): <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Phytophthora parasitica</i>, <i>Cladosporium fulvum</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Alternaria alternata</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. ARDEI (CÂMP, SOLARII, SERE): <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Cladosporium fulvum</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Alternaria alternata</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. FASOLE VERDE (CÂMP): <i>Peronospora viciae</i>, <i>Erysiphe polygoni</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. VARZA (CÂMP): <i>Mycosphaerella brassicicola</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Peronospora brassicae</i>, <i>Erysiphe cruciferarum</i>,	ATENȚIE



			<i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Albugo candida</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. <u>VARZĂ DE BRUXELLES</u> <u>(CÂMP):</u> <i>Mycosphaerella brassicicola</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Peronospora brassicae</i>, <i>Erysiphe cruciferarum</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Albugo candida</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. <u>MORCOV, PĂSTÂRNAC,</u> <u>PĂTRUNJEL (CÂMP):</u> <i>Alternaria dauci</i>, <i>Erysiphe heraclei</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare <u>HREAN, RIDICHI (CÂMP):</u> <i>Mycosphaerella brassicicola</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Peronospora brassicae</i>, <i>Erysiphe cruciferarum</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Albugo candida</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. <u>CONOPIDĂ (CÂMP):</u> <i>Mycosphaerella brassicicola</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i> <i>Peronospora brassicae</i>, <i>Erysiphe cruciferarum</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Albugo candida</i> • 1,0 L/ha Se aplica la avertizare. <u>BROCCOLI (CÂMP):</u> <i>Mycosphaerella brassicicola</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Peronospora brassicae</i> <i>Erysiphe cruciferarum</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Albugo candida</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. <u>TELINĂ (SERE ȘI CÂMP):</u> <i>Erysiphe heraclei</i>, <i>Septoria apii</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha
--	--	--	--



				Se aplică la avertizare <u>DOVLECEI (SERE ȘI CÂMP):</u> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Cladosporium cucumerium</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare <u>CASTRAVEȚI (SERE ȘI CÂMP):</u> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Cladosporium cucumerium</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare <u>PEPENI GALBENI (SERE ȘI CÂMP):</u> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Cladosporium cucumerium</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare <u>PRAZ (CÂMP):</u> <i>Alternaria porri</i>, <i>Puccinia allii</i>, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Cladosporium allii</i>, <i>Phytophthora porri</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare <u>CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT, CEAPĂ DIN ARPAGIC, USTUROI (CÂMP):</u> <i>Alternaria porri</i>, <i>Puccinia allii</i>, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Cladosporium allii</i>, <i>Phytophthora porri</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare <u>CEAPĂ VERDE (CÂMP):</u> <i>Alternaria porri</i>, <i>Puccinia allii</i>, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Cladosporium allii</i>, <i>Phytophthora porri</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare <u>SALATĂ (CÂMP):</u> <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Cercospora lactucae-sativa</i>, <i>Bremia lactucae</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. <u>MAZĂRE (CÂMP):</u> <i>Ascochyta pisi</i>, <i>Peronospora viciae</i>, <i>Mycosphaerella pinodes</i>, <i>Erysiphe pisi</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. <u>CĂPȘUN, ZMEURĂ (SERE ȘI</u>
--	--	--	--	--

				CÂMP): <i>Podosphaera aphanis</i>, <i>Colletotrichum acutatum</i>, <i>Mycosphaerella fragariae</i>, <i>Gnomonia comari</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. PEPENE VERDE (SERE ȘI CÂMP): <i>Sphaerotheca fuliginea</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Cladosporium cucumerium</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare . FASOLE (CÂMP): <i>Peronospora viciae</i>, <i>Erysiphe polygoni</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. SALATĂ (SERE): <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Cercospora lactucae-sativa</i>, <i>Bremia lactucae</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,8 L/ha Se aplică la avertizare. TOMATE (CÂMP): <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Cladosporium fulvum</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Alternaria alternata</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. TELINĂ (CÂMP ȘI SERE): <i>Alternaria dauci</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare. VINETE (CÂMP): <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Phytophthora parasitica</i>, <i>Cladosporium fulvum</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Alternaria alternata</i> • 1,0 L/ha Se aplică la avertizare.	
9.	ORTIVA OPTI 80 g/L azoxistrobin + 400 g/L clorotalonil	SYNGENTA AGRO SRL, ROMANIA CO: 069PC/21.01.2015	SMRZ: UK	TOMATE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Leveillula sp.</i>, <i>Alternaria sp.</i> • 2,0-2,5 L/ha CASTRAVETI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca fuliginea</i>, <i>Pseudoperonospora cubensis</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i> • 2,0-2,5 L/ha CASTRAVETI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):	PERICOL

			<i>Didymella bryoniae</i> • 2,0-2,5 L/ha <u>TOMATE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Cladosporium</i> sp., <i>Colletotrichum</i> sp. • 2,0-2,5 L/ha <u>CARTOF (CÂMP):</u> <i>Phytophthora infestans</i> • 2,0-2,5 L/ha <u>ORZ (PRIMAVARA ȘI TOAMNĂ):</u> <i>Pyrenophora teres</i>, <i>Puccinia hordei</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Ramularia collo-cygni</i> • 1,8-2,5 L/ha <u>GRÂU (PRIMAVARĂ ȘI TOAMNĂ):</u> <i>Septoria tritici</i>, <i>Leptosphaeria</i> (<i>Phaeosphaeria</i>) <i>nodorum</i>, <i>Puccinia striiformis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Pyrenophora</i> (<i>Drechslera</i>) <i>tritici-repentis</i> • 1,8-2,5 L/ha <u>TRITICALE:</u> <i>Septoria tritici</i>, <i>Leptosphaeria</i> (<i>Phaeosphaeria</i>) <i>nodorum</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,8-2,5 L/ha <u>SECARĂ:</u> <i>Septoria tritici</i>, <i>Leptosphaeria</i> (<i>Phaeosphaeria</i>) <i>nodorum</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Puccinia striiformis</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i> • 1,8-2,5 L/ha <u>OVĂZ:</u> <i>Puccinia recondita</i> (<i>Puccinia dispersa</i>), <i>Puccinia striiformis</i>, <i>Puccinia hordei</i>, <i>Puccinia coronata</i>, <i>Pyrenophora avenae</i> • 1,8-2,5 L/ha <u>DOVLECEI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Spaerotheca fuliginea</i>, <i>Pseudoperonospora cubensis</i>, <i>Didymella bryoniae</i> • 2,0-2,5 L/ha <u>MAZĂRE (CÂMP):</u> <i>Ascochyta pisi</i>, <i>Peronospora viciae</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 2,0-2,5 L/ha <u>PEPENI GALBENI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Spaerotheca fuliginea</i>, <i>Pseudoperonospora cubensis</i>,
--	--	--	---

				<i>Didymella bryoniae</i> • 2,0-2,5 L/ha PEPENI VERZI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Didymella bryoniae</i> • 2,0-2,5 L/ha DOVLEAC (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Didymella bryoniae</i> • 2,0-2,5 L/ha	
10.	EMINENT 125 ME 125 g/L tetraconazol	ISAGRO S.p.A., ITALIA CO: 2570/12.10.2005	-	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>, <i>Phaeosphaeria nodorum</i>, <i>Mycosphaerella graminicola</i>, <i>Puccinia</i> sp., <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 0,9 L/ha SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola</i>, <i>Erysiphe betae</i> <i>Ramularia beticola</i>, <i>Uromyces betae</i> • 0,75 L/ha	—
11.	CUPERTINE SUPER 225 g/kg cupru + 30 g/kg cimoxanil	IQV, SPANIA CO: 2195/27.02.2003	—	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 4,0 kg/ha TOMATE: <i>Phytophthora infestans</i> • 3,5 kg/ha CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 3,5 kg/ha TOMATE, VINETE: <i>Alternaria solani</i> • 3,5 kg/ha ARDEI: <i>Phytophthora capsici</i> <i>Alternaria solani</i> • 3,5 kg/ha CARTOF: <i>Alternaria solani</i> • 3,5 kg/ha	ATENȚIE
12.	RIZA 250 EW 250 g/l tebuconazol	CHEMINOVA CO: 2684/19.04.2007	—	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pyrenophora teres</i> (complex de boli foliare) • 0,5 L/ha <i>Fusarium</i> spp. • 0,75 L/ha RAPITĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis</i> spp., <i>Phoma lingam</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Erysiphe cruciferatum</i> • 1,0 L/ha Tratament în vegetație, primăvară-vară.	PERICOL

				<i>Phoma lingam</i> • 0,5 L/ha Tratament aplicat toamna pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare și pentru combaterea agentului patogen MĂR: <i>Venturia inaequalis</i>, <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,750 L/ha (0,05%) VITĂ DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,4 L/ha (în 1000 L/apă)	
13.	ARMETIL M 80 g/kg metalaxil + 640 g/kg mancozeb	IQV, SPANIA CO: 2078/19.12.2000	—	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 2,5 kg/ha CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 kg/ha	ATENȚIE
14.	MERPAN 80 WDG 80% captan	ADAMA AGRICULTURE BV, OLANDA CO: 1891/17.02.1999	—	MĂR: <i>Venturia inaequalis</i> • 0,15% (2.25 kg/ha în 1500 l apă) <i>Nectria galligena</i> <i>Gloeosporium</i> spp. (boli de depozit) • 0,15% (2,25 kg/ha în 1500 l apă) TOMATE: <i>Phytophthora infestans</i> • 0,15% (1.5 kg/ha în 1000 l apă) <i>Phytophthora parasitica</i>, <i>Pythium debaryanum</i>, <i>Rhizoctonia solani</i> • 0,5% (4-5 l soluție/m²) CASTRAVETI: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 0,15% (1.5 kg/ha în 1000 l apă) FASOLE: <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> • 0.15% (0.9 kg/ha în 600 l apă) TUTUN (răsad): <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i>, <i>Peronospora tabacina</i> • 0,125%-preventiv • 0,3% curativ PĂR: <i>Venturia pirina</i>, <i>Nectria galligena</i>, <i>Gleosporium</i> spp. (boli de depozit) • 2,0 kg/ha în 1000 l apă CIRES: <i>Monilinia laxa</i>, <i>Blumeriella jaapii</i> • 2,0 kg/ha în 1000 l apă CAIS:	ATENȚIE

				<i>Monilinia laxa</i> • 2,0 kg/ha în 1000 l apă PIERSIC: <i>Taphrina deformans</i> • 2,0 kg/ha în 1000 l apă PRUN: <i>Monilinia laxa</i> • 2,0 kg/ha în 1000 l apă ZMEUR: <i>Botrytis cinerea</i> • 2,0 kg/ha în 1000 l apă	
15.	ORIOUS 6 FS 60 g/L tebuconazol	ADAMA AGRICULTURE BV, OLANDA CO: 2115/24.10.2001	SMRZ: CEHIA	GRÂU: <i>Tilletia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp. <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 0,5 L/T Se aplică la tratamentul semințelor. ORZ: <i>Ustilago nuda</i>, <i>Pyrenophora graminea</i> <i>Pyrenophora teres</i>, <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Erysiphe graminis</i> • 0,5 L/T Se aplică la tratamentul semințelor. OVĂZ, TRITICALE: <i>Fusarium</i> spp. • 0,5 L/T Se aplică la tratamentul semințelor. SECARA: <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Fusarium</i> spp. • 0,5 L/T Se aplică la tratamentul semințelor.	ATENȚIE
16.	CAPTAN 80 WDG 80% captan	ARYSTA LIFESCENCE SAS, FRANTA CO: 2664/19.12.2006	—	TOMATE: <i>Phytophthora infestans</i> <i>Fulvia fulva</i> • 0,15% (1,5 kg/ha) Se aplică maximum 2 tratamente /sezon. CEAPĂ: <i>Peronospora destructor</i> • 0,15% (1,5 kg/ha) CASTRAVEȚI: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 0,15% (1,5 kg/ha) MĂR: <i>Venturia</i> spp. • 0,15% (2,250 kg/ha) Se aplică maximum 10 tratamente/sezon. PRUN: <i>Polistigma rubrum</i>, <i>Monilinia</i> spp. • 0,15% (1,5 kg/ha)	PERICOL



				Se aplica maximum 4 tratamente /sezon. VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 1,250 kg/ha (în 1000 L soluție)	
ERBICIDE					
1.	CHIKARA 250 g/kg flazasulfuron	ISK BIOSCIENCES EUROPE NV, BELGIA CO: 2266/01.04.2004	—	VITĂ DE VIE: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și unele buruieni perene • 0,2 kg/ha Se aplică la postemergent. TERASAMENTE DE CALE FERATĂ: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și unele buruieni perene • 0,2 kg/ha Se aplică la postemergent.	ATENȚIE
2.	GALERA SUPER 40 g/l aminopirialid + 240 g/l clopiralid + 80 g/l picloram	DOW AGROSCIENCES, SUA CO: 2862/18.04.2008	—	RAPIȚĂ: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,20 L/ha Se aplica preemergent (imediat după semănat) sau postemergent timpuriu (buruieni și rapiță: la apariția a 2-4 frunze) • 0,25 L/ha Se aplica postemergent la: - rapiță de la stadiul de 6 frunze până la sfârșitul alungirii tulpinii principale; - buruieni dicotiledonate când au max. 15 cm	—
3.	BOREAL 4 SC 40 g/l nicosulfuron	SHARDA CROP CHEM LIMITED, INDIA CO: 2609/14.12.2005	—	PORUMB: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,8 L/ha Se aplică postemergent la: Cultura: 4-6 frunze Buruieni monocotiledonate anuale: 2-4 frunze <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,0-1,5 L/ha (în funcție de gradul de infestare și talia plantelor) Se aplică postemergent la: Cultura: 4-6 frunze <i>Sorghum halepense</i> din rizomi: 15-20 cm	ATENȚIE
4.	TARGA SUPER 5 EC 50 g/l quizalofop-p-etil	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD, JAPONIA CO: 1159/20.04.1989	SMRZ: Marea Britanie	EXTINDERE: MORCOV: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Buruieni monocotiledonate	PERICOL



				perene • 2,0 L/ha Se aplică postemergent la: Buruieni: de la faza de 2 frunze până la sfârșitul înfrățitului; Cultura: de la faza de 2 frunze (BBCH 12) până înainte de momentul acoperirii buruienilor. FASOLE DE CÂMP (uscată și păstăi): Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 - 1,25 L/ha Buruieni monocotiledonate perene • 1,25 - 2,5 L/ha Se aplică postemergent la: Buruieni: de la faza de 2 frunze până la sfârșitul înfrățitului; Cultura: de la faza de 2 frunze (BBCH 12) până înainte de momentul acoperirii buruienilor. MAZĂRE USCATĂ: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 - 1,25 L/ha Buruieni monocotiledonate perene • 1,25 - 2,5 L/ha Se aplică postemergent la: Buruieni: de la faza de 2 frunze până la sfârșitul înfrățitului; Cultura: de la faza de 2 frunze (BBCH 12) până înainte de momentul acoperirii buruienilor. MAZĂRE VERDE (boabe): Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 - 1,25 L/ha Buruieni monocotiledonate perene • 1,25 - 2,5 L/ha Se aplică postemergent la: Buruieni: de la faza de 2 frunze până la sfârșitul înfrățitului; Cultura: de la faza de 2 frunze (BBCH 12) până înainte de momentul acoperirii buruienilor.	
5.	MISTRAL 4 SC 40g/L nicosulfuron	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. Belgia CO: 1321/13.03.1992	SMRZ: MAREA BRITANIE	PORUMB: <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,0-1,5 L/ha (în funcție de gradul de infestare) Se aplică postemergent la: Cultura: 2 - 8 frunze (BBCH12-18) costreiu din rizomi: 15-25 cm înălțime <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 0,75 L/ha + 0,5 L/ha Primul tratament se aplică postemergent timpuriu când plantele de porumb au 3-4 frunze	ATENȚIE



				și costreiu < 15 cm înălțime, iar al doilea tratament la reinfestare după 2-3 săptămâni. PORUMB: Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (<i>Setaria species</i>), iarba bărboasă (<i>Echinochloa crus-galli</i>), costreiu (<i>Sorghum halepense</i>) din sămânță • 0,8 L/ha Se aplică postemergent la: Cultura: (4-6 frunze) Buruieni: 2-4 frunzulițe înainte de înfrățire.	
6.	KILLER SUPER 5 EC 50g/L quizalofop- p- etil	SHARDA EUROPE BVBA BELGIA CO: 2272/27.05.2004	-	RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate perene, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (5-15 cm). Buruieni monocotiledonate anuale, inclusiv samulastra de cereale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (3-6 frunze). SOIA: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (3-6 frunze). Buruieni monocotiledonate perene, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5-2,0 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (5-15 cm). FLOAREA-SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (3-6 frunze). Buruieni monocotiledonate perene, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5-1,75 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (5-15 cm). CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,7-1,0 L/ha	PERICOL



				Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (4-6 frunze). Buruieni monocotiledonate perene, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi și <i>Agropyron repens</i> • 1,5-2,0 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (5-15 cm). SFECLĂ DE ZAHĂR: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (3-6 frunze). Buruieni monocotiledonate perene, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 2,0 L/ha Se aplică postemergent, când buruienile sunt în faza activă de creștere (5-15 cm).	
7.	AMINO 600 SL 600 g/L acid 2,4-D	ADAMA Manufacturing Poland SA, POLONIA CO: 2530/22.02.2005	-	GRĂU: Buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile: <i>Cirsium arvense</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Chenopodium</i> spp., <i>Polygonum persicaria</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i> • 1L/ha Se aplică postemergent la: Cultura: de la începutul până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 21-29). Buruieni: la apariția a 2-4 frunze, <i>Chenopodium</i> <3 frunze, <i>Cirsium</i> <10 cm înălțime PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile: <i>Cirsium arvense</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Chenopodium</i> spp., <i>Polygonum persicaria</i> • 1.0 L/ha Se aplică postemergent, Cultura: 4 – 6 frunze (BBCH 12-14). Buruieni: 2 – 4 frunze, <i>Chenopodium</i> <3 frunze, <i>Cirsium</i> < 10 cm înălțime SORG: Buruieni dicotiledonate sensibile: anuale și perene sensibile: <i>Amaranthus retroflexus</i>,	PERICOL



				<i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Chenopodium</i> spp., <i>Cirsium arvense</i> • 1.0 L/ha Se aplică postemergent la: Cultura: de la începutul până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 21-29). Buruieni: la apariția a 2 – 4 frunze, <i>Chenopodium</i> <3 frunze, <i>Cirsium</i> < 10 cm înălțime	
8.	FLORAMIX 70,8 g/Kg piroxulam + 14,2 g/Kg florasulam + 70,8 g/Kg cloquintocet mexil (safener)	DOW AGROSCIENCES, SUA CO: 2868/11.07.2013	-	GRĂU: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Apera spica venti</i>) • 120 g/ha + 0.6 L/ha adjuvant Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Avena fatua</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Matricaria camomilla</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Polygonum</i> sp.- sub 3 frunze, <i>Galeopsis</i> sp. – sub 3 frunze) Monocotiledonate - înainte de înfrățire Dicotiledonate anuale, în faza de 2-4 frunze • 260 g/ha + 0.6 l/ha adjuvant Se aplică de la 2-3 frunze până la stadiul de 2 noduri (BBCH 12/13- 32).	ATENȚIE

INSECTICIDE

1.	ZEBRA 50 g/l lambda cihalotrin	STOCKTON CHEMICAL CORP., USA CO: 2203/06.05.2003	—	MAR: <i>Cydia pomonella</i> • 0,15 L/ha Se aplică 2 tratamente pe generație. Nu se aplică în perioada de înflorire. CEREALE: <i>Eurygaster integriceps</i> • 0,2 L/ha(adulti) • 0,125 L/ha (atunci când 30% din larve sunt de vârstă a 3-a) CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,2 L/ha	PERICOL
----	--	---	---	--	---------

B. A FOST APROBATĂ A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALA	A DOUA DENUMIRE COMERCIALA	Nr. C.O./DATA	DETINATORUL OMOLOGARII
1.	MOXA	TRIDUS	249PC/20.10.2016	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA
2.	BUSTER 100EC	JENOT PLUS 100EC	387PC/28.02.2018	INNVIPO Sp.z.o.o., Polonia
3.	INVISTER 200SL	MEPIQ 300SL	416PC/28.02.2018	INNVIPO Sp.z.o.o., Polonia
4.	APIS 200 SE	ACEPTIR 200 SE	405PC/28.02.2018	INNVIPO Sp.z.o.o., Polonia



5.	FURY 10EC	MINUET	1529/11.03.1994	FMC CORPORATION, SUA
6.	FOXTROT 69EW	FENOVA SUPER	2772/27.03.2008	FMC-CHEMINOVA A/S
7.	NOVADIM PROGRESS	DANADIM PROGRESS	2170/16.12.2002	CHEMINOVA A/S
8.	VANTEX 60CS	NEXIDE 60 CS	2172/16.12.2002	CHEMINOVA A/S
9.	TANARIS	BUTISAN PRO	302PC/10.04.2017	BASF SE, GERMANIA
10.	OMIX	EDEGAL	358PC/29.11.2017	Agria SA, Bulgaria
11.	FORTUNA GLOBE	FUDAN 75	401PC/28.02.2018	Agria SA, Bulgaria
12.	FORTUNA	FUDAN	400PC/28.02.2018	Agria SA, Bulgaria

2. REGULAMENTE SI RECTIFICARI PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA 19.02.2018-23.05.2018

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/303 al Comisiei din 27 februarie 2018 privind neaprobarea substanței active extract de *Reynoutria sachalinensis*, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare;

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/309 al Comisiei din 1 martie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active propineb, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/524 al Comisiei din 28 martie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosefil, mepanipirim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* tulpina: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metil, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram;

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 al Comisiei din 9 aprilie 2018 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2019, 2020 și 2021 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală;

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/660 al Comisiei din 26 aprilie 2018 de reînnoire a aprobării substanței active bentazon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/670 al Comisiei din 30 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare ale substanțelor active bromuconazol, buprofezin, haloxifop-P și napropamid;

7. Regulamentul (UE) 2018/676 al Comisiei din 3 mai 2018 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor;

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/679 al Comisiei din 3 mai 2018 de reînnoire a aprobării substanței active forclorfenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/690 al Comisiei din 7 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active fenazaquin;

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/691 al Comisiei din 7 mai 2018 de aprobare a substanței de bază Talc E553B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;



11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/692 al Comisiei din 7 mai 2018 de reînnoire a aprobării substanței active zoxamid în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/710 al Comisiei din 14 mai 2018 de reînnoire a aprobării substanței active siltiofam în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
13. Regulamentul (UE) 2018/685 al Comisiei din 3 mai 2018 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, bere, fluopiram, fluxapiraxad, hidrazidă maleică, pudră din semințe de muștar și teflutrin din sau de pe anumite produse;
14. Regulamentul (UE) 2018/686 al Comisiei din 4 mai 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorpirifos, clorpirifos-metil și triclorip din sau de pe anumite produse;
15. Regulamentul (UE) 2018/687 al Comisiei din 4 mai 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime ale reziduurilor de acibenzolar-S-metil, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, izofetamid, metrafenonă, pendimetalin și teflubenzuron din sau de pe anumite produse;
16. Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin;
17. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/303 al Comisiei din 27 februarie 2018 privind neaprobarea substanței active extract de Reynoutria sachalinensis, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare;
18. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/0000 al Comisiei din 30 august 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-metilciclopropenă, betaciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forclorfenuron, fostiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil și tribenuron.
19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/783 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active imidacloprid
20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/784 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active clotianidină
21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/785 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active tiametoxam

3. DIVERSE

1. CNOPPP a fost informată despre stadiul evaluării substanței active **benalaxil**, substanță activă pentru care România a fost desemnată stat membru raportor zonal de către Comisia Europeană.
2. CNOPPP a respins solicitarea **Ministerului Apelor și Pădurilor**, privind desemnarea unui membru permanent și a unui membru supleant în componența CNOPPP, deoarece nu există prevederi legale în vigoare și nu face obiectul de activitate al comisiei.
3. Compania **Shartec SRL** va reprezenta compania **Finchimica S.p.A., Italia**, în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate, pentru două produse aflate în procedură de omologare.



4. Doamna **Mihaela Daniela URSAN**, angajat al companiei **Belchim Crop Protection**, va reprezenta compania **Mitsui Chemicals**, în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate, pentru produsul **TREBON 30 EC** (certificat de omologare nr. 2738/19.12.2007).
5. Compania **AGRISOLV WASTE SRL**, în persoana d-lui **Eduard VISSARION**, va reprezenta compania **SFP Europe SA** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
6. Doamna **Claudia SAVALAS** va reprezenta compania **KOLLANT SRL** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
7. Domnul **Remus CIURDĂRESCU** va reprezenta compania **KNE CERTIS SRL** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
8. Doamna **Vica BONDOC** nu mai reprezintă compania **Agroprospect SRL** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.
9. Compania **Aectra Agrochemicals SRL** va reprezenta compania **OXON, Italia** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate, pentru produsele: **GRECALE, FEZAN** și **CLICK COMBI**.
10. Compania **Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd** și-a schimbat denumirea în **Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd**.
11. Compania **Imperial Chemical Logistics GmbH, Germania** și-a schimbat denumirea în **Schirm GmbH, Germania**.
12. Produsul de protecție a plantelor **ZEBRA** (certificat de omologare nr. 2203/06.05.2003) a fost transferat de la compania **Stokton Crop Protection AG, Elveția** la compania **Globachem N.V., Belgia**, noul deținător de omologare este compania **Globachem N.V., Belgia**.
13. Produsele de protecție a plantelor **ACCURATE** (certificat de omologare nr. 130PC/22.07.2015), **ACCURATE EXTRA** (certificat de omologare nr. 099PC/21.01.2015), **NUANCE 75 WG** (certificat de omologare nr. 066PC/29.06.2014), **PELICAN DELTA 606 WG** (certificat de omologare nr. 2775/27.03.2008), **SARACEN** (certificat de omologare nr. 132PC/22.07.2015), **SARACEN MAX** (certificat de omologare nr. 218PC/20.10.2016) au fost transferate de la compania **FMC/Cheminova** la compania **Nufarm România SRL**, noul deținător de omologare este compania **Nufarm România SRL**.
14. La solicitarea companiei **Syngenta** au fost aprobate două locații alternative de formulare pentru produsul **MODDUS EVO** (certificat de omologare nr. 192PC/03.06.2016).
15. La solicitarea companiei **Syngenta** au fost aprobate două locații alternative de formulare pentru produsul **MODDUS 250 EC** (certificat de omologare nr. 2532/22.02.2005).
16. La solicitarea companiei **ISK Biosciences** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **CHIKARA DUO** (certificat de omologare nr. 214PC/20.10.2016) și s-a luat notă de actualizarea datelor locației curente de formulare.
17. CNOPPP a luat notă de actualizarea datelor locației curente de formulare pentru produsul **CHIKARA** (certificat de omologare nr. 2266/21.01.2015).
18. La solicitarea companiei **Nissan Chemical Europe SARL** a fost aprobată o locație adițională de formulare pentru produsul **SANMITE 10 SC** (certificat de omologare nr. 211PC/20.10.2016).
19. La solicitarea companiei **Arysta LifeScience** au fost aprobate 5 locații adiționale de formulare pentru produsul **DIMILIN 48 SC** (certificat de omologare nr. 1175/20.12.1990);
20. CNOPPP a luat notă de schimbarea producătorului produsului **TAIFUN 360 SL** (certificate de omologare nr. 269PC/19.12.2016).
21. La solicitarea companiei **Societe Financier de Pontarlier (SFP), Franța** a doua denumire comercială „**CHLORMEGUARD**” a produsului de protecție a plantelor omologat pe teritoriul României cu denumirea comercială **JADEX-O-720** (certificat de omologare nr. 271PC/19.12.2016) a fost schimbată în „**RONIN**”.



22. Ca urmare a deciziei companiei **Arysta** de a nu mai susține reinnoirea autorizației produsului **ROYAL MH 30** (certificat de omologare nr. 1136A/20.02.1988) conform art. 43, produsul a fost retras.
23. La solicitarea companiei **UPL Europe Ltd.** produsul **SEMPRA 500 SC** a doua denumire comercială a produsului **PELICAN 500 SC** (certificat de omologare nr. 2774/27.03.2008), a fost retras.
24. La solicitarea companiei **Bayer** a fost aprobată o nouă sursă pentru substanța activă *spiroxamina*.
25. La solicitarea companiei **Arysta** a fost aprobată o schimbare în procesul de fabricație pentru substanța activă *hidrazida maleica*.
26. La solicitarea companiei **Indofil** a fost aprobată o nouă sursă pentru substanța activă *cimoxanil*.
27. La solicitarea companiei **Adama** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *tribenuron-metil*.
28. CNOPPP a fost informată de către compania **BAYER** privind actualizarea datelor referitoare la safenerul mefenpyr-dietil.
29. A fost aprobată solicitarea **Pestila II, Polonia** privind aprobarea unor ambalaje adiționale pentru produsul **FULGER 200SL** (certificat de omologare nr. 290PC/28.02.2017).
30. Solicitarea **ISK Biosciences** privind aprobarea unor ambalaje adiționale pentru produsul **RANMAN TOP / (KARITSU-a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 105PC/22.07.2015), va fi rediscutată în următoarea ședință CNOPPP, după ce Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății vor transmite puncte de vedere scrise.
31. Solicitarea **ISK Biosciences** privind aprobarea unor ambalaje adiționale pentru produsul **TEPPEKI** (certificat de omologare nr. 2263/01.04.2004) va fi rediscutată în următoarea ședință CNOPPP, după ce Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății vor transmite puncte de vedere scrise.
32. Solicitarea **Belchim CropProtection** privind aprobarea unui ambalaj adițional de 15 litri pentru produsul **KATOUN GOLD** (certificat de omologare nr. 365PC/29.11.2017) va fi rediscutată în următoarea ședință CNOPPP, după ce Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății vor transmite puncte de vedere scrise.
33. Solicitarea **Belchim CropProtection** privind aprobarea unor ambalaje adiționale pentru produsul **MILBEKNOCK EC** (certificat de omologare nr. 2213/20.08.2003) va fi rediscutată în următoarea ședință CNOPPP, după ce Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății vor transmite puncte de vedere scrise.
34. A fost aprobată solicitarea **BASF** privind aprobarea unui ambalaj adițional de 200 ml pentru produsul **VIVANDO** (certificat de omologare nr. 071PC/21.01.2015).
35. Solicitarea **Nufarm** privind aprobarea unei modificări minore în compoziția produsului **BUTOXONE M40** (certificat de omologare nr. 1587/27.04.1995) va fi rediscutată în următoarea ședință CNOPPP, după ce Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății vor transmite puncte de vedere scrise.
36. Solicitarea **Bayer** privind aprobarea unei modificări minore în compoziția produsului **PROPULSE 250 EC** (certificat de omologare nr. 041PC/27.02.2014) va fi rediscutată în următoarea ședință CNOPPP, după ce Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății vor transmite puncte de vedere scrise.
37. Solicitarea **Nissan Chemical Europe SARL, Franța** privind aprobarea unei modificări minore în compoziția produsului **LEIMAY** (certificat de omologare nr. 344PC/29.11.2017) va fi rediscutată în următoarea ședință CNOPPP, după ce Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății vor transmite puncte de vedere scrise.
38. La solicitarea companiei **Dow AgroSciences** a fost retrasă omologarea produsului **KERB 50 W** (certificat de omologare nr. 153/14.05.1974), la cultura de morcov, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 84/2018.

39. CNOPPP a respins solicitarea companiei Nufarm privind omologarea produsului **KESTREL** (acetamiprid 200 SL).
40. CNOPPP a respins solicitarea companiei GLOBACHEM NV, Belgia privind omologarea produsului **RAPSAN 500 SC** conform art.34 din Reg. nr. 1107/2009.
41. Începând cu data de 1 iulie 2018 formatul dRR va fi în conformitate cu prevederile art 43/R 1107 - SANCO /6895/2009v rev.2.2 din 26 ian 2018 pct.19.
42. Urmare aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/309 al Comisiei din 1 martie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active **propineb**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei, se retrag de la data de 22 iunie 2018 certificatele de omologare pentru următoarele produse de protecție a plantelor și se acordă o perioadă de grație care expiră la data de 22 iunie 2019:
- **ANTRACOL 70 WG** (certificat de omologare nr. 226PC/20.10.2016);
 - **ANTRACOL 70 WP** (certificat de omologare nr. 266/27.12.1974).
43. Urmare aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/783 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active **imidacloprid**, se retrag de la data de 19 septembrie 2018 certificatele de omologare ale următoarelor produse de protecție a plantelor și se acordă o perioadă de grație care expiră la data de 19 decembrie 2018:
- **CONFIDOR ENERGY** (certificat de omologare nr. 2523/22.02.2005);
 - **CONFIDOR OIL SC 004** (certificat de omologare nr. 2589/14.12.2005);
 - **CORSARIO 20 SL** (certificat de omologare nr. 2825/09.03.2009);
 - **GAUCHO 600 FS** (certificat de omologare nr. 2016/26.10.1999);
 - **MIDASH 600 FS** (certificat de omologare nr. 2801/15.10.2008);
 - **NUPRID 600 FS** (certificat de omologare nr. 2783/26.06.2008);
 - **NUPRID AL 600 FS** (certificat de omologare nr. 2352/19.12.2006);
 - **NUPRID MAX AL 222 FS** (certificat de omologare nr. 2353/19.12.2006);
 - **NUPRID OIL 004 CE** (certificat de omologare nr. 2376/09.03.2009);
 - **PICUS 600 FS** (certificat de omologare nr. 2688/19.04.2007);
 - **PRESTIGE EXTRA 370 FS** (certificat de omologare nr. 2644/06.09.2006);
 - **PRONTO 70 WG** (certificat de omologare nr. 2762/27.03.2008);
 - **SEEDOPRID 600 FS** (certificat de omologare nr. 2634/29.06.2006);
 - **WARRANT 700 WG** (certificat de omologare nr. 2689/19.04.2007);
 - **YUNTA 246 FS** (certificat de omologare nr. 2509/16.12.2004);
 - **YUNTA QUATTRO 373,4 FS** (certificat de omologare nr. 003PC/18.04.2011).

În cazul următoarelor produse de protecție a plantelor, din certificatele de omologare se retrag omologările pentru culturile care nu respectă prevederile regulamentului mai sus amintit:

- **KOHINOR 200 SL / (TALENT – a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2615/02.03.2006);
- **LIDER 200 SL** (certificat de omologare nr. 2761/27.03.2008);
- **MIDASH 200 SL** (certificat de omologare nr. 2705/11.06.2007);
- **MIDASH FORTE** (certificat de omologare nr. 2635/29.06.2006);
- **NUPRID 200 SC** (certificat de omologare nr. 2763/27.03.2008);
- **NUPRID AL 200 SC** (certificat de omologare nr. 2372/15.10.2008);
- **WARRANT 200 SL** (certificat de omologare nr. 2686/19.04.2007).



44. Urmare aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/784 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active **clotianidin**, se retrag de la data de 19 septembrie 2018 certificatele de omologare ale următoarelor produse de protecție a plantelor și se acordă o perioadă de grație care expiră la data de 19 decembrie 2018:

- **DANTOP 50 WG** (certificat de omologare nr. 2228/15.12.2003);
- **PONCHO BETA FS 453,34** (certificat de omologare nr. 2764/27.03.2008).

45. Urmare aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/785 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active **tiametoxam**, se retrag de la data de 19 septembrie 2018 certificatele de omologare ale următoarelor produse de protecție a plantelor și se acordă o perioadă de grație care expiră la data de 19 decembrie 2018:

- **CRUISER 350 FS** (certificat de omologare nr. 2029/14.12.1999);
- **EFORIA 045 ZC** (certificat de omologare nr. 007PC/28.05.2012).

În cazul produsului de protecție a plantelor **ACTARA 25 WG** (certificat de omologare nr. 1885/17.02.1999), din certificatul de omologare se retrag omologările pentru culturile care nu respectă prevederile regulamentului mai sus amintit.

PREȘEDINTE,
Paulina GABOR



