


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 07.03.2024

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ (art.33-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)					
FUNGICIDE					
1.	PROMINO XTRA 100 g/L protioconazol + 140 g/L azoxistrobin	CAC Chemical GmbH, Germania CO:904PC/07.03.2024	SMRZ: REPUBLICA CEHA	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ: <i>Puccinia striiformis, Puccinia recondite, Pyrenophora tritici-repentis, Parastagonospora nodorum, Zymoseptoria tritici</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la apariția frunzei stindard până la sfârșitul înspicatlui (BBCH 30-59). <i>Fusarium sp.</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la sfârșitul înspicatlui până la sfârșitul înfloritului (BBCH 59-69). ORZ DE TOAMNĂ: <i>Puccinia hordei, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la apariția frunzei stindard până la sfârșitul înspicatlui (BBCH 30-59). ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Pyrenophora teres</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la apariția frunzei stindard până la sfârșitul înspicatlui (BBCH 30-59). SECARĂ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ: <i>Parastagonospora nodorum, Rhynchosporium secalis,</i>	PERICOL



				<i>Puccinia recondite</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la apariția frunzei stindard până la sfârșitul înspicatului (BBCH 30-59). TRITICALE DE TOAMNĂ: <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>(Parastagonospora nodorum)</i> <i>Puccinia recondite</i>, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la apariția frunzei stindard până la sfârșitul înspicatului (BBCH 30-59). RAPITĂ DE TOAMNĂ, RAPITĂ DE PRIMAVARĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Alternaria brassicae</i> • 1,2 L/ha Se aplică în perioada înfloritului (BBCH 59-69).	
2.	SURRENDER 100 g/L fludioxonil	Globachem N.V., Belgia CO:905PC/07.03.2024	SMRZ: POLONIA	PORUMB PENTRU BOABE, PORUMB PENTRU FURAJ*, PORUMB ZAHARAT*: <i>Fusarium spp.</i>, <i>Pythium spp.</i> • 0,50 L/t Tratament sămânță (BBCH 00) FLOAREA SOARELUI: <i>Plasmopara halstedii</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Fusarium spp.</i> • 1,25 L/t Tratament sămânță (BBCH 00) *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>PERICOL</u>
3.	JOUST 250 g/L protioconazol	Nufarm România SRL CO:906PC/07.03.2024	SMRZ: POLONIA	ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Ramularia collo-cygni</i>, <i>Blumeria graminis</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora teres</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la începutul împăierii până la începutul înfloritului (BBCH 30-61). GRÂU DE TOAMNĂ, ALAC* ALTE VARIETĂȚI DE GRÂU*: <i>Zymoseptoria tritici</i>, <i>Puccinia recondite</i>, <i>Blumeria graminis</i>, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>, <i>Fusarium spp.</i> • 0,6 - 0,8 L/ha Se aplică de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). GRÂU DURUM*: <i>Zymoseptoria tritici</i>, <i>Puccinia</i>	<u>ATENȚIE</u>



			recondite, <i>Blumeria graminis</i>, <i>Fusarium spp.</i> • 0,6 - 0,8 L/ha Se aplică de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30-69). <u>TRITICALE*:</u> <i>Zymoseptoria tritici</i>, <i>Puccinia</i> <i>recondite</i>, <i>Blumeria graminis</i> <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Fusarium spp.</i> • 0,6 - 0,8 L/ha Se aplică de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30-69). <u>SECARĂ DE TOAMNĂ/ DE PRIMĂVARĂ*:</u> <i>Zymoseptoria tritici</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,6 - 0,8 L/ha Se aplică de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30-69). <u>RAPITĂ DE TOAMNĂ:</u> <i>Leptosphaeria maculans</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Erysiphe cruciferarum</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Pyrenopeziza brassicae</i> • 0,6-0,7 L/ha Se aplică toamna între 4 și 8 frunze (BBCH 14-18). Se aplică primăvara- niciun lăstar lateral - sfârșitul înfloririi (BBCH 20-69). <u>IN * (DOAR PENTRU PRODUCȚIA DE FIBRE):</u> <i>Erysiphe spp.</i>, <i>Oidium lin</i> • 0,6-0,7 L/ha Se aplică la alungirea primului lăstar-apariția primei inflorescențe(BBCH 33-51). <u>MUȘTAR*, CAMELINĂ*, ALTE CRUCIFERE PRODUCĂTOARE DE SĂMÂNȚĂ</u> (ex. <i>Brassica</i> <i>carinata</i>) *: <i>Leptosphaeria maculans</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Erysiphe cruciferarum</i>, <i>Alternaria brassicae</i> <i>Pyrenopeziza brassicae</i> • 0,6-0,7 L/ha	
--	--	--	--	--



				Se aplică toamna (BBCH 14-18). Se aplică primăvara (BBCH 20-69). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
ERBICIDE					
1.	FLUROSTAR FORTE 576 g/L fluroxipir-meptil (echivalent cu 400 g/L fluroxipir acid)	Globachem N.V., Belgia CO:907PC/07.03.2024	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	GRÂU, ORZ, OVĂZ, SECARĂ, TRITICALE: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,5 L/ha Se aplică postemergent de la începutul înfrățirii până la apariția frunzei standard (BBCH 20-39). PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,28 L/ha Se aplică postemergent între 3-6 frunze (BBCH 13-16). PAJISTI ȘI PĂȘUNI (NOU INSAMANTATE): Buruieni dicotiledonate anuale • 0,375 L/ha Se aplică postemergent de la începutul înfrățirii până la 9 sau mai multe internoduri (BBCH 20-39) PAJISTI ȘI PĂȘUNI: Buruieni dicotiledonate anuale si perene • 0,75 L/ha Se aplică postemergent.	PERICOL
2.	BELOUKHA / (KALINA - a doua denumire comerciala) 680 g/L acid pelargonic (acid nonanoic)	Certis Belchim BV, Olanda CO: 337PC/28.08.2017	SMRZ: AUSTRIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: POMI FRUCTIFERI (MĂR, PĂR, GUTUI*, MOȘMON*, PRUN, CAIS*, CIREȘ, VISIN*, PIERȘIC*, NECTARIN*, MIGDAL*): Buruieni monocotiledonate anuale si dicotiledonate • 16 L/ha Se aplică în timpul perioadei de vegetație. Plivitul lăstarilor de pe tulpină: • 16 L/ha Se aplică pe lăstarii tineri și nelignificați cu o lungime mai mică de 25 cm. DIVERSE CULTURI¹: Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate • 16 L/ha Se aplică înainte de răsărirea culturilor (BBCH 00-08) sau în timpul perioadei de vegetație sau pre-plantare și pre-însămânțare.	PERICOL



				<u>FRUCTE DE PADURE (MURE, ZMEUR, AFIN*, MERISOR*, AGRIS, COACĂZ, MĂCEȘ*, DUD*, SOC*) :</u> Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate • 16 L/ha Se aplică în timpul perioadei de vegetație. Plivitul lăstarilor de pe tulpină: • 16 L/ha Se aplică pe lăstarii tineri și nelignificați cu o lungime mai mică de 25 cm. (1: Ceapă, Morcov, Arbori și arbuști ornamentali, Brazi de Crăciun, Migdal*, Castan*, Alun*, Cartof dulce*, Țelină pentru rădăcină*, Anghinare*, Pătrunjel*, Scorțonera*, Păstârnac, Sfeclă roșie*, Sfeclă de pețiol*, Hrean*, Ridichi*, Napi*, Usturoi*, Ceapă, Ceapă eșalotă*, Ceapă verde*, Vinete*, Bame*, Dovlecei*, Pepene galben*, Dovleac*, Porumb dulce*, Broccoli, Conopidă*, Varză de Bruxelles*, Varză chinezească*, Varză creată*, Gulii*, Andive*, Culturi Baby de frunze*, Creson*, Fetică*, Lăptucă*, Micșunea*, Muștar*, Spanac, Cicoare*, Angelica*, Melisa*, Busuioc*, Dafin*, Chimen*, Țelină pentru frunze*, Asmățui*, Arpagic*, Coriandru*, Mărar*, Isop*, Leuștean*, Mentă*, Maghiran*, Oregano*, Rozmarin*, Salvie*, Cimbru*, Tarhon*, Linte*, Fasole verde*, Mazăre verde*, Sparanghel*, Cardon*, Fenicul*, Praz*, Rubarbă*, Năut*, Lupin*, In pentru semințe*, Limba mielului*, Căneapă*, Camelină*, Mac*, Susan*, Șofrănel, Hrișcă*, Mei*, Secară* Sorg*, Triticale*, Grâu dur*, Alac*, Quinoa*, Mușetel*, Hibiscus*, Iasomie*, Trandafir, Căpșun, Valeriană*, Nalbă*, Hamei*, Anason* Chimion*, Schinduf*, Sfecla furajeră*, Porumb furajer*, Măzărice*, Sparcetă*, Trifoi alb*, Miscanthus*, Amaryllis*, Dalie*, Gladiolă, Zambilă*, Liliac*, Narcisă*, Lalea, Iris*, Brândușă, Plante de ghiveci*, Flori tăiate*. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
3.	PENSHUI 45,5 CS 455 g/L pendimetalin	Sharda Cropchem España SL, Spania CO:908PC/07.03.2024	SMRZ: POLONIA	<u>CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, ORZ, SECARĂ*, TRITICALE*):</u> Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate • 2,5 - 3,0 L/ha	ATENȚIE



				Se aplică preemergent, înainte de răsărire (BBCH 00-09) sau se aplică postemergent, după răsărire în faza de 1-3 frunze (BBCH 10-13). PORUMB: Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate • 2,5 - 3,0 L/ha Se aplică preemergent, înainte de răsărire (BBCH 00-09) sau se aplică postemergent, după răsărire în faza de 1-3 frunze (BBCH 10-13). POMI FRUCTIFERI (MĂR, PĂR*, PIERȘIC*, CAIS*, NECTARIN*, CIRES*): Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate • 3,0 L/ha Se aplică preemergent între rânduri (BBCH 00-09), după recoltare și înainte de apariție în sezonul următor. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
4.	TIMELINE FX 1,75 g/L florasulam + 75 g/L fluroxipir-meptil + 30 g/L pinoxaden (conține 7,5 g/L cloquintocet-metil ca safener)	SYNGENTA AGRO SRL, România CO:909PC/07.03.2024	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	GRÂU DE PRIMĂVARĂ, GRÂU DE TOAMNĂ: Buruieni monocotiledonate (<i>Apera spica-venti, Avena fatua</i>) • 1,5 L/ha Se aplică postemergent din stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 13-37). Buruieni monocotiledonate (<i>Alopecurus myosurides, Lolium sp.</i>) • 2,0 L/ha Se aplică postemergent din stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 13-37). Buruieni dicotiledonate (<i>Ambrosia artemisiifolia*, Anagallis arvensis*, Cyanus segetum*, Matricaria chamomilla*, Fallopia convolvulus*, Stellaria media*, Vicia sativa*, Spergula arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cyanus segetum, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Sinapis sp., Senecio vulgaris etc.,</i>) • 1,5-2,0 L/ha (in funcție de gradul de infestare) Se aplică postemergent din stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 13-37). * Buruieni mult mai sensibile la doza de 2 L/ha.	ATENȚIE



5.	UPTON/ (ULTEGRA - a doua denumire comercială) 50 g/L florasulam	Albaugh TKI d.o.o., Slovenia CO:581PC/03.02.2020	SMRZ: POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: GRÂU DUR DE TOAMNĂ: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,075 L/ha Se aplică toamna, începând de la stadiul de trei frunze până la sfârșitul înfrățitului (BBCH 13-29). GRÂU DUR DE TOAMNĂ: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,1 L /ha Se aplică primăvara, începând de la stadiul de trei frunze până la apariția frunzei stindard, ligula vizibilă (BBCH 13-39). GRÂU DUR DE PRIMĂVARĂ: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,1 L /ha Se aplică începând de la stadiul de trei frunze până la apariția frunzei stindard, ligula vizibilă (BBCH 13-39).	ATENȚIE
6.	REXADE 37,5 g/kg florasulam + 52,1g/kg halauxifen -metil + 187,5 g/kg piroxsulam + 266 g/kg cloquintocet acid (safener)	CORTEVA AGRISCIENCE România SRL CO:910PC/07.03.2024	SMRZ: BELGIA	CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, SECARĂ*, TRITICALE*): <i>Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, Lolium spp., Avena spp., Bromus spp., Fumaria officinalis, Maricaria spp., Lamium spp., Stellaria media Veronica spp., Papaver rhoeas</i> • 100 g/ha + 0,1%v/v adjuvant Vivolt Se aplică postemergent, toamna sau primăvara , de la stadiul de 2 frunze până la stadiul de 2 noduri ale plantei de cultură (BBCH 12-32); 1 tratament/sezon. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	ATENȚIE
7.	TARZEC 66,7 g/kg halauxifen metil + 250 g/kg piroxsulam + 354 g/kg cloquintocet acid (safener)	CORTEVA AGRISCIENCE România SRL CO:911PC/07.03.2024	SMRZ: BELGIA	CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, SECARĂ, TRITICALE): <i>Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, Lolium spp.Avena spp., Fumaria officinalis, Lamium spp., Veronica spp., Papaver rhoeas</i> • 75 g/ha + 0,1%v/v adjuvant Vivolt Se aplică postemergent, toamna sau primăvara , de la stadiul de 2 frunze până la stadiul de 2 noduri ale plantei de cultură (BBCH 12-32); 1 tratament/sezon.	ATENȚIE
8.	SENRALLAS 30 g/L tifensulfuron metil + 150 g/L fluroxipir (formulat ca fluroxipir-	FMC International Switzerland Sarl (FISSA), Elveția CO:912PC/07.03.2024	SMRZ: POLONIA	CEREALE DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ (GRÂU, ORZ, OVĂZ, ORZOAICĂ*, SECARĂ, TRITICALE): Buruieni dicotiledonate (<i>Aethusa cynapium, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis**</i>, <i>Anthem</i>	ATENȚIE



	meptil 216,1 g/L)			arvensis, <i>Aphanes arvensis</i>**, <i>Arabidopsis thaliana</i>**, <i>Atriplex patula</i>**, <i>Bifora radians</i>**, <i>Brassica oleifera</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Centaurea cyanus</i>, <i>Cerastium glomeratum</i>**, <i>henopodium album</i>, <i>Cirsium arvense</i>**, <i>Consolida regalis</i>, <i>Convolvulus arvensis</i>**, <i>Daucus carota</i>**, <i>Descurainia sophia</i>, <i>Fumaria officinalis</i>**, <i>Galium aparine</i>, <i>Galeopsis tetrahit</i>, <i>Geranium dissectum</i>, <i>Geranium purpureum</i>, <i>Lamium</i> spp., <i>Matricaria</i> spp., <i>Mercurialis annua</i>**, <i>Myosotis arvensis</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Polygonum</i> spp., <i>Raphanus raphanistrum</i>**, <i>Rumex crispus</i>**, <i>Senecio vulgaris</i>**, <i>Sinapis vulgaris</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Sisymbrium officinale</i>**, <i>Solanum nigrum</i> **, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Veronica</i> spp., <i>Vicia sativa</i>, <i>Viola arvensis</i> • 0,5 - 1,0 L/ha Se aplică în funcție de spectrul de buruieni și gradul de îmburuienare. Se aplică postemergent, 1 tratament, astfel : Cereale de toamnă: - de la înfrățit până la apariția frunzei stindard (BBCH 20-39). Cereale de primăvară: - din stadiu de 2 frunze până la apariția frunzei stindard (BBCH 12-39). Buruieni: - în perioada de creștere activă a buruienilor în stadiul de 2-6 frunze. **Buruieni necontrolate la doza de 0,5 L/ha. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	-------------------	--	--	---	--

REGULATORI DE CREȘTERE

					ATENTIE
1.	STABILAN 400 400 g/L cloromequat clorură	Nufarm GmbH & Co KG, Austria CO:913PC/07.03.2024	SMRZ: OLANDA	<u>GRÂU DE TOAMNA, GRÂU DE PRIMĂVARĂ, GRÂU DURUM DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ, OVĂZ , SECARĂ, TRITICALE, ALAC:</u> • 3,75 L/ha 1 aplicare împotriva căderii plantelor Se aplică înainte de înfrățire până la apariția frunzei stindard, ligula abia vizibilă) (BBCH 20-39).	



				SAU • 1,75 L/ha prima aplicare (BBCH 20-29) • 2,0 L/ha a doua aplicare (BBCH 30-39) 2 aplicări Se aplică înainte de înfrățire până la apariția frunzei standard, ligula abia vizibilă (BBCH 20-39) ;	
--	--	--	--	---	--

OMOLOGARE ZONALĂ (art.34-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

ERBICIDE

1.	FORTUNA FORTE	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:914PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	FLOAREA-SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i>, <i>Echinochloa</i>, <i>Digitaria</i>, <i>Sorghum</i> din semințe) • 0,8 L/ha Postemergent Costrei (<i>Sorghum</i>) din rizomi când plantele de costrei au înălțimea mai mică de 15 cm • 1,0 L/ha Postemergent Costrei (<i>Sorghum</i>) din rizomi când plantele de costrei au înălțimea între 15 și 25 cm • 1,3 L/ha Postemergent CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>) • 0,8-1,0 L/ha Postemergent aplicare doar până la BBCH 51(înainte de înflorire) Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Avena fatua</i>) • 1,0 L/ha Postemergent aplicare doar până la BBCH 51(înainte de înflorire) Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i> până la 10-15 cm, <i>Sorghum halepense</i> mai mic de 20-25 cm înălțime) • 1,3 L/ha Postemergent aplicare doar până la BBCH 51(înainte de înflorire) Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i> până la 25 cm, înălțime, <i>Sorghum halepense</i> până la 25-35 cm înălțime) • 1,5 L/ha	ATENȚIE
	150 g/L fluazifop-p-butil				



				Postemergent aplicare doar până la BBCH 51(înainte de înflorire) <u>SFECLĂ DE ZAHĂR:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (până în faza de înfrățire) • 0,8 L/ha Postemergent Buruieni monocotiledonate perene (până la 15 cm înălțime) • 1,0-1,3 L/ha Postemergent <u>RAPITĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (la 2-4 frunze) (<i>Setaria</i>, <i>Echinochloa</i>, <i>Sorghum</i> din semințe) • 0,8 L/ha Postemergent Costrei (<i>Sorghum halepense</i>) la faza optimă de 15-20 cm • 1,0 L/ha Postemergent <u>MĂR PE ROD:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene până la înălțimea de 15 cm • 1,0 L/ha Postemergent Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțimea de 15-25 cm • 1,3 L/ha Postemergent <u>VITĂ DE VIE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 1,3 L/ha Postemergent <u>CĂPȘUN:</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Postemergent Buruieni monocotiledonate perene • 1,3 L/ha Postemergent <u>PEPINIERE POMICOLE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Postemergent	
--	--	--	--	---	--



				Buruieni monocotiledonate perene • 1,3 L/ha Postemergent ARBUSTI FRUCTIFERI (MUR, ZMEUR): Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Postemergent Buruieni monocotiledonate perene • 1,3 L/ha Postemergent ARBUSTI FRUCTIFERI (COACĂZ, AFIN): Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Postemergent Buruieni monocotiledonate perene • 1,3 L/ha Postemergent CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT ÎN CÂMP: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 L/ha Postemergent Buruieni monocotiledonate perene • 1,0 L/ha Postemergent MAC: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,8 - 1,6 L/ha Postemergent Până înainte de înflorit (BBCH50) IN, MUSTAR: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,8 - 1,25 L/ha Postemergent Până înainte de înflorit (BBCH50) FASOLE DE CÂMP, MAZĂRE, LUPIN: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 0,8 - 1,6 L/ha Postemergent Până înainte de înflorit (BBCH50).	
2.	STRIM 960 g/L S-metolacior	UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A., Olanda CO:915PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	CEAPĂ DIN ARPAGIC, FASOLE VERDE: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (Setaria, Galinsoga parviflora)	ATENȚIE



				• 1,0 L/ha Preemergent <u>ARDEI GRAS, VARZĂ, CONOPIDĂ DE TOAMNĂ*:</u> Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate • 1,2 L/ha Preemergent <u>SOIA:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria,</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Înainte de semănat ppi cu încorporare 3-4 cm <u>PRODUCERE RASAD DE TOMATE:</u> Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate • 0,25 mL/m² Preemergent <u>CĂPSUN* (FRUCTE ȘI STOLONI):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent <u>ARBUSTI FRUCTIFERI (ZMEUR*, MUR*, AFIN*, COACĂZ NEGRU*):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent <u>CARTOF:</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent <u>VINETE*:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent <u>MORCOVI, PEPENE VERDE, CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT ÎN CÂMP:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 0,8 - 1,0 L/ha Preemergent <u>RAPITĂ:</u> Buruieni monocotiledonate	
--	--	--	--	---	--



				anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (în funcție de tipul de sol - doza mare pe cernoziom) <u>SORG * SEMINTE TRATATE CU CONCEP III):</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (în funcție de tipul de sol - doza mare pe cernoziom) *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	DON 960 g/L S-metolacloz	RANGOLI ROMANIA PESTICIDES SRL CO:916PC/07.03.2024	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>PORUMB:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria,</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0 – 1.5 L/ha 3-4 cm ppi (zone secetoase) Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0 – 1.5 L/ha Preemergent (imediat după semănat în condiții de umiditate) <u>FLOAREA SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria,</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0 – 1.5 L/ha 3-4 cm ppi 3 cm ppi (zone secetoase) Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0 – 1.5 L/ha Preemergent (imediat după semănat în condiții de umiditate) <u>SFECLĂ DE ZAHĂR:</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 1,2 L/ha	<u>ATENȚIE</u>



				Preemergent Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate • 1,2 – 1,5 L/ha ppi (cu încorporare superficială) • 1,5 L/ha Preemergent FASOLE BOABE: Buruieni monocotiledonate anuale <i>Setaria, Echinochloa, Digitaria,</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0-1,5 L/ha Preemergent zone umede sau ppi cu încorporare la 3 cm în zone secetoase IN DE FIBRĂ SAU ULEI*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria,</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0-1,5 L/ha Preemergent zone umede sau ppi cu încorporare la 3 cm în zone secetoase TUTUN*: Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate • 1.0 L/ha Preemergent TOMATE SEMĂNATE DIRECT ÎN CÂMP, TOMATE ÎN CÂMP (CULTURĂ ÎNFIINTATĂ PRIN RĂSAD), CEAPĂ DIN ARPAGIC, FASOLE VERDE*: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (<i>Setaria, Galinsoga</i>) • 1.0 L/ha Preemergent ARDEI GRAS, VARZĂ, CONOPIDĂ DE TOAMNĂ*: Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate • 1.2 L/ha Preemergent PRODUCERE RĂSAD TOMATE: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate • 0,25 mL/m² Preemergent SOIA: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria,</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>)	
--	--	--	--	---	--



				• 1,0-1,5 L/ha Înainte de semănat ppi cu încorporare 3-4 cm CĂPSUN* (FRUCTE ȘI STOLONI) Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent ARBUSTI FRUCTIFERI (ZMEUR*, MUR*, AFIN*, COACĂZ NEGRU*): Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent VINETE*: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent MORCOVI, PEPENE VERDE CEAPĂ SEMANATĂ DIRECT ÎN CAMP: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale • 0,8 - 1,0 L/ha Preemergent RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0-1,5 L/ha Preemergent (în funcție de tipul de sol - doza mare pe cernoziom) SORG*(SEMINTE TRATATE CU CONCEP III): Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0-1,5 L/ha Preemergent (în funcție de tipul de sol - doza mare pe cernoziom) *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	---	--



4.	JUNIPER MAX 240 g/L cletodim	Albaugh TKI d.o.o., Slovenia CO:917PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	<u>SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ FURAJERĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale <i>Apera spica-venti, Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, Lolium multiflorum, Avena fatua, Bromus sterilis, Samulastra de cereale, Alopecurus myosuroides și Poa annua</i> • 0,75 L/ha Cultura: de la primele frunze vizibile până în faza în care frunzele acoperă 10 % din teren (BBCH 10 – BBCH 30) <u>RAPITĂ DE TOAMNĂ:</u> Samulastra de cereale • 0,5 L/ha Cultura: din faza de cotiledoane complet desfăcute până înaintea începerii alungirii tulpinii (BBCH 10 – BBCH 31) Samulastra de cereale: în perioada activă de creștere	<u>PERICOL</u>
5.	FANTASIA 800 g/L prosulfocarb	ALBAUGH TKI d.o.o. Slovenia CO:918PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	<u>GRÂU DE TOAMNĂ :</u> Buruieni monocotiledonate anuale (inclusiv <i>Apera spica-venti</i>) și dicotiledonate anuale • 2 - 3 L/ha Preemergent. <u>ORZ DE TOAMNĂ:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 2 - 3 L/ha Preemergent. <u>CARTOF :</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3 - 5 L/ha Preemergent. <u>CEAPĂ:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3 - 5 L/ha Preemergent. <u>MORCOV :</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3 - 3,5 L/ha Preemergent.	<u>PERICOL</u>
6.	PIRATE 600 g/L 2,4-D (722 g/L 2,4-D dimethylammonium)	AGRIA S.A., Bulgaria CO:919PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	<u>GRÂU:</u> Buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile: <i>(Cirsium arvense, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Chenopodium spp., Polygonum persicaria, Thlaspi arvense, Capsella bursa pastoris)</i> • 1,0 L/ha Postemergent Grâu: De la începutul până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 21-29).	<u>PERICOL</u>



				PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile: <i>(Cirsium arvense, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp.)</i> • 1,0 L/ha Postemergent PORUMB: De la 4 la 6 frunze (BBCH 14-16) Buruieni: 2-4 frunze Chenopodium <3 frunze Cirsium <10 cm înălțime	
7.	PROFESSIONAL 800 EC 800 g/L prosulfocarb	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:920PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (inclusiv <i>Apera spica-venti</i>) și dicotiledonate anuale • 2,0 – 3,0 L/ha Preemergent MORCOV : Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3,0 – 3,5 L/ha Preemergent CEAPĂ: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3,0 – 5,0 L/ha Preemergent CARTOF: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3,0 – 5,0 L/ha Preemergent	PERICOL
8.	GRAND TOTAL 960 g/L S-metolacior	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:921PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	PORUMB: Buruieni monocotiledonate anuale <i>(Setaria, Echinochloa, Digitaria,)</i> și unele dicotiledonate anuale <i>(Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus)</i> • 1,0 - 1,5 L/ha 3-4 cm ppi(zone secetoase) Buruieni monocotiledonate anuale <i>(Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din sămânță)</i> și unele dicotiledonate anuale- <i>Amaranthus, Chenopodium</i> • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (imediat după semănat în condiții de umiditate) FLOAREA-SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale <i>(Setaria, Echinochloa, Digitaria)</i> și unele dicotiledonate anuale <i>(Amaranthus Chenopodium, Hibiscus)</i> • 1,0 - 1,5 L/ha	ATENȚIE



				3-4 cm ppi 3 cm ppi (zone secetoase) Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (imediat după semănat în condiții de umiditate) SFECLĂ DE ZAHĂR: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate • 1,2 – 1,5 L/ha ppi (cu incorporare superficiala) • 1,5 L/ha Preemergent FASOLE BOABE: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (zone umede) sau ppi cu incorporare la 3 cm (zone secetoase) IN DE FIBRĂ SAU ULEI*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (zone umede) sau ppi cu incorporare la 3 cm (zone secetoase) TUTUN*: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate • 1,0 L/ha Preemergent TOMATE SEMĂNATE DIRECT ÎN CÂMP, TOMATE ÎN CÂMP (CULTURĂ ÎNFIINTATĂ PRIN RĂSAD), CEAPĂ DIN ARPAGIC, FASOLE VERDE*: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (<i>Setaria, Galinsoga</i>) • 1,0 L/ha Preemergent
--	--	--	--	--



				ARDEI GRAS, VARZĂ ȘI CONOPIDĂ DE TOAMNĂ*: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate • 1,2 L/ha Preemergent SOIA: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Înainte de semănat ppi cu încorporare la 3-4 cm PRODUCERE RĂSAD DE TOMATE: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate • 0,25 mL/m² Preemergent CAPSUN* (FRUCTE ȘI STOLONI): Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent ARBUSTI FRUCTIFERI (ZMEUR*, MUR*, AFIN*, COACĂZ NEGRU*): Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale • 1,2 L/ha Preemergent CARTOF: Buruieni anuale monocotiledonate • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent VINETE*: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate • 1,2 L/ha Preemergent MORCOVI, PEPENI VERZI, CEAPĂ SEMANATĂ DIRECT ÎN CAMP: Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate • 0,8-1,0 L/ha Preemergent RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>,) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (în funcție de tipul de sol - doza mare pe cernoziom)	
--	--	--	--	---	--



				SORG* (SEMINTE TRATATE CU CONCEP III): Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i>) • 1,0 - 1,5 L/ha Preemergent (în funcție de tipul de sol - doza mare pe cernoziom) *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
9.	DIODE 100 SC 100 g/L mesotriona	ADAMA Agricultural Solutions SRL, România CO:922PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	Porumb: Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0 L/ha De la semănat până la răsărire (aparitia coleoptilului) (BBCH 00-09) • 1,0 L/ha Se aplică de la răsărire până în faza de cel mult 8 frunze ale porumbului (BBCH 10-18).	ATENȚIE
FUNGICIDE					
1.	DITTO 250 EC 250 g/L difenoconazol	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:923PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	CAIS* : <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.max. tratamente: 2. Primul tratament la deschiderea primelor flori (BBCH 60) iar al 2-lea până la 7 zile înainte de recoltare. CĂPSUN*: <i>Mycosphaella fragariae</i> • 0,3 L/ha (0,03%) Nr.max. tratamente: 2. Se aplică de la deschiderea primelor flori până la 3 zile înainte de recoltare (BBCH 60-89) CIRES* : <i>Monilia spp., Blumeriella jaapii</i> • 0,2 L/ha (0,02%) Nr.max. tratamente: 3. Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85). VISIN* : <i>Monilinia spp.</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.max. tratamente: 2. Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85). MĂR : <i>Venturia inequalis, Podosphaera leucotricha</i> • 0,2 L/ha (0,027%)	PERICOL



				Nr.max. tratamente: 3. Se aplică de la începutul înfloririi până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 61-84). PIERSIC* : <i>Monilinia</i> spp • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.max. tratamente: 2. Se aplică de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare. <i>Taphrina deformans, Coryneum beijerinckii, Spaerotecha pannosa var.persicae, Monilia spp.</i> • 0,2 L/ha (0,02%) Nr.max. tratamente: 2. Se aplică de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare. RAPITĂ : <i>Phoma lingam, Alternaria brassicae Erysiphe communis</i> • 0,5 L/ha Nr.max. tratamente: 2, 1 aplicare în toamnă și 1 în primăvară. Toamna în stadiul de 1-8 frunze (BBCH 11-18). Primavara de la apariția primului internod până la apariția mugurilor floralii (BBCH 31-55). SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola, Erysiphe betae</i> • 0,3 L/ha Nr.max. tratamente: 2. Se aplică din faza în care frunzele încep să acopere solul până când rădăcina de sfeclă ajunge la dimensiunea recoltabilă (BBCH 31-49). TOMATE : <i>Alternaria solani</i> • 0,5 L/ha (0,05%) Nr.max. tratamente: 2. Se aplică de la începutul formării lăstarilor până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică pentru coacere (BBCH 20-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
2.	MILLER 500 g/kg boscalid	UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. Olanda CO:924PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	VITA DE VIE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,0-1,2 kg/ha (în funcție de presiunea de atac) Se aplică un singur tratament/an în unul din următoarele stadii de dezvoltare a viței de vie: sfârșitul înfloritului, înaintea de	-



				compactarea ciorchinului sau la intrarea în pârgă a strugurilor <u>RAPITA DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Plenodomus lingam</i> • 0,2-0,5 kg/ha (în funcție de presiunea de atac) Se pot aplica maxim 2 tratamente/sezon (o aplicare în toamnă și una în primăvară) din faza de 3 frunze – până când inflorescența este complet dezvoltată dar mugurii floralii sunt încă închiși) (BBCH 13-57) <u>RAPITA DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Alternaria</i> spp. • 0,2-0,5 kg/ha (în funcție de presiunea de atac) Se pot aplica maxim 2 tratamente/sezon la un interval de minim 14 zile între tratamente din faza de inflorescența complet dezvoltată cu mugurii floralii închiși până când -10% din silicve au ajuns la mărimea finală) (BBCH 57-71).	
3.	SOCIETY 375 g/kg ciprodinil + 250 g/kg fludioxonil	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:925PC/07.03.2024	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>ARDEI:</u> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 - 1,0 kg/ha Se aplică de la apariția primelor 5 flori până la fructe complet maturate (BBCH 55-89) <u>ARDEI (SPATI PROTEJATE):</u> <i>Sclerotinia</i> spp. • 0,8 kg/ha Se aplică de la apariția primelor 5 flori până la fructe complet maturate (BBCH 55-89). <u>CASTRAVETI:</u> <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 - 1,0 kg/ha Se aplică de la apariția primelor fructe până la recoltare (BBCH 71-79). <u>CĂPSUN*:</u> <i>Botrytis</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp. • 1,0 kg/ha Se aplică de la apariția primelor flori până la a doua recoltare (BBCH 55-89). <u>CIRES*:</u> <i>Monilinia</i> spp. • 1,0 kg/ha Primul tratament: De la începutul înfloririi până la sfârșitul înfloririi	<u>ATENȚIE</u>



				(BBCH 57-69) Al doilea tratament: De la începutul coacerii până la maturarea deplină (BBCH 81-89) <u>TOMATE, VINETE*:</u> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 - 1,0 kg/ha Se aplică de la 7 frunze deschise până la maturare completă: fructele au ajuns la culoarea lor tipică de maturitate deplină (BBCH 67-89). <u>MAR :</u> <i>Monilinia spp., Penicillium spp., Botrytis cinerea, Stemphylium spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp., Fusarium spp., Gloeosporium spp., Nectria spp., Venturia spp.</i> • 0,8-1,0 kg/ha Primul tratament: De la apariția primelor flori (10%) până la finalul înfloririi (BBCH 61-69) Al doilea tratament: De la începutul coacerii până la maturarea deplină (BBCH 81-89) <u>PAR*, GUTUI* :</u> <i>Colletotrichum spp., Nectria spp., Fusarium spp., Monilinia spp., Penicillium spp., Botrytis cinerea, Gloeosporium spp., Gloeosporium spp., Venturia spp.</i> • 0,8 - 1,0 kg/ha Primul tratament: De la apariția primelor flori (10%) până la finalul înfloririi (BBCH 61-69) Al doilea tratament: De la începutul coacerii până la maturarea deplină (BBCH 81-89) <u>PIERSIC*, NECTARIN*, CAIS*, PRUN:</u> <i>Monilinia spp.</i> • 0,8 - 1,0 kg/ha Primul tratament: De la apariția primelor flori (10%) până la finalul înfloririi (BBCH 61-69) Al doilea tratament: De la începutul coacerii până la maturarea deplină (BBCH 81-89) <u>MORCOV:</u> <i>Sclerotinia spp.</i> • 1,0 kg/ha Se aplică de la 4 frunze până la maturitate (BBCH 51-79) . <u>MORCOV:</u> <i>Alternaria spp.</i> • 0,8 kg/ha Se aplică de la 4 frunze până la maturitate (BBCH 51-79). <u>TELINĂ*:</u> <i>Sclerotinia spp</i> • 0,8 kg/ha Se aplică de la 4 frunze până când	
--	--	--	--	--	--

				ajunge la recoltare (BBCH 14-49). <u>AFIN*, COACĂZ*, AGRIS*:</u> <i>Monilinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>, • 1,0 kg/ha Se aplică de la apariția primei inflorescențe până la fructe complet mature (BBCH 61-89). <u>ZMEUR*, MUR*:</u> <i>Botrytis</i> spp., <i>Didimella</i> spp. • 1,0 kg/ha Se aplică de la apariția primei inflorescențe până la fructe complet mature (BBCH 61-89). <u>SALATA*:</u> <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>, • 0,6 kg/ha Se aplică de la prima frunză până când ajunge la recoltare, (BBCH 11-49). <u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,6-1,0 kg/ha Se aplică de la primele flori deschise până la maturitate (BBCH 60-88). <u>CEAPĂ, USTUROI*:</u> <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i> • 1,0 kg/ha Se aplică de la apariția a 9 frunze până bulbul a ajuns la 70% din mărimea inițială (BBCH 20-47). <u>FASOLE, MAZARE:</u> <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Colletotrichum</i> spp. • 1,0 kg/ha Se aplică de la apariția primelor flori (10%) până când 40% din păstăi au mărimea inițială (BBCH 61-74). <u>PLANTE ORNAMENTALE*</u> <u>(CICLAMEN, ANEMONE,</u> <u>PRIMULA, PANSELUTE,</u> <u>TRANDAFIRI, HORTENSII,</u> <u>PELARGONIUM, BEGONII)</u> <u>(SPATII PROTEJATE) :</u> <i>Monilinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 kg/ha Se aplică de la apariția primelor 4 frunze până la sfârșitul înfloririi (BBCH 14-67) *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
4.	CAMBIO 60SL 60 g/L metconazol	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:926PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	<u>GRĂU:</u> <i>Compex boli foliare (Erysiphe graminis, Septoria spp., Puccinia spp., Helminthosporium spp.), Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha	<u>ATENȚIE</u>



				Se aplică pentru boli foliare de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69), Se aplică pentru fuzarioza de la începutul înfloririi până la sfârșitul înfloririi (BBCH 51-59) GRÂU: <i>Septoria nodorum</i> • 1,2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). ORZ: Complex boli foliare (<i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia</i> spp., <i>Septoria tritici</i>, <i>Fusarium</i> spp.), <i>Septoria nodorum</i> • 1,2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). ORZ: <i>Septoria nodorum</i> • 1,2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). RAPITĂ: <i>Phoma lingam</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Erysiphe communis</i> • 1,0 L/ha Toamna, de la 4 frunze la 8 frunze (BBCH 14-18). Primăvara, de la primul internod vizibil până la primele petale vizibile, cu mugurii floralii încă închiși. (BBCH 31-59) RAPITĂ: Regulator de creștere • 0,7 L/ha Toamna, de la 4 frunze la 8 frunze (BBCH 14-18).	
5.	JADE 250 EC 125 g/L protioconazol + 125 g/L tebuconazol	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:927PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Septoria</i> spp., <i>Puccinia</i> spp., <i>Helminthosporium</i> spp. • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). GRÂU: <i>Fusarium</i> spp. • 0,9 L/ha În timpul înfloririi (BBCH 61-69) ORZ: <i>Erysiphe graminis</i> f. sp. hordei, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora teres</i> (sin. Drechslera)	ATENȚIE



				teres) <i>Helminthosporium sativum</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). PORUMB: <i>Fusarium</i> spp. • 1,0 L/ha În timpul înfloririi (BBCH 61-69).	
6.	AZARIUS TOP 250 g/L azoxistrobin	JT Agro Ltd. Irlanda CO:928PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	CASTRAVETI (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Erysiphe</i> spp., <i>Oidiopsis</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88). TOMATE (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE): <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria</i> spp., <i>Leveillula taurica</i>, <i>Cladosporium</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88). ARDEI (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE): <i>Alternaria capsici annui</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88). CEAPĂ (CÂMP): <i>Alternaria porri</i>, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Puccinia allii</i>, <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplecate (BBCH 14-48). CEAPĂ VERDE*(CÂMP): <i>Alternaria porri</i>, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Puccinia allii</i>, <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplecate (BBCH 14-48).	ATENȚIE



			frunze aplecate (BBCH 14-48). ARPAGIC* (CÂMP): <i>Alternaria porri</i>, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Cladosporium allii-porri</i>, <i>Puccinia allii</i>, <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la formarea primelor 3 frunze până la formarea completă a bulbului (BBCH 13-50). MORCOV (CÂMP): <i>Erysiphe</i> spp., <i>Alternaria dauci</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 50% din rădăcini s-au maturat (BBCH 19-85). CARTOF (CÂMP): <i>Alternaria</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primelor ramificații bazale până la îngălbenirea frunzelor (BBCH 21-91). CARTOF (APLICARE PE RÂND): <i>Rhizoctonia solani</i> • 3,0 L/ha La plantare sau înainte de plantare pe rând prin încorporare în sol (BBCH 00). BROCCOLI*: <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49). DOVLECEL* DOVLEAC* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Cladosporium cucumerinum</i>, <i>Colletotrichum lagenarium</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Peronospora</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până la 80% din fructe maturate (BBCH 16-88). CĂPSUN* (SPATII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca macularis</i>, <i>Colletotrichum acutatum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe	
--	--	--	--	--



				până la a 2- a recoltare (BBCH 55-89). CONOPIDĂ* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria brassicae, Albugo candida, Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate, până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49). GRÂU: <i>Erysiphe graminis, Pyrenophora tritici-repentis, Puccinia recondita, Septoria tritici, Septoria nodorum, Fusarium spp., Alternaria spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). FASOLE (CÂMP): <i>Colletotrichum lindemuthianum, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Uromyces viciae-fabae, Ascochyta spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primilor lastari până când 20% păstai au dimensiune normală (BBCH 21 -72) MAZĂRE (CÂMP): <i>Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes, Botrytis cinerea, Peronospora viciae..</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la faza de buton floral până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 51-69) ORZ: <i>Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Puccinia hordei, Fusarium spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul perioadei de înspicare/ spicul este complet vizibil (BBCH 30-59). PEPENE GALBEN*, PEPENE VERDE (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i> • 0,75-1,0 L/ha	
--	--	--	--	--	--



				(în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88). <u>PORUMB (PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ):</u> <i>Helminthosporium spp.</i> <i>Puccinia sorghi</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, când internodiile încep să fie vizibile, până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 30-69). <u>RAPITĂ:</u> <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul înfloritului, până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 60-69). <u>PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Microsphaera spp.</i>, <i>Podosphaera xanthii</i>, <i>Puccinia horiana</i>, <i>Sphaerotheca pannosa</i>, <i>Albugo candida</i>, <i>Alternaria spp.</i>, <i>Ascochyta spp.</i>, <i>Botrytis spp.</i>, <i>Cladosporium spp.</i>, <i>Colletotrichum spp.</i>, <i>Glomerella cingulata</i>, <i>Peronospora spp.</i>, <i>Phoma spp.</i>, <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Plasmopara spp.</i>, <i>Pythium spp.</i>, <i>Septoria spp.</i>, <i>Stemphylium spp.</i> • 0,8-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație <u>PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Rhizoctonia spp.</i> • 3,0 L/ha (aplicare prin încorporare în sol) În prima parte a perioadei de vegetație <u>PEPINIERE FORESTIERE:</u> <i>Melampsora capraearum</i> <i>Colletotrichum trifolii</i> <i>Glomerella cingulata</i>, <i>Phoma spp.</i>, <i>Septoria spp.</i>, <i>Lophodermella concolor</i>, <i>Lophodermium pinastri</i> • 0,8-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație	
--	--	--	--	--	--



				<u>PRAZ* (CÂMP):</u> <i>Cladosporium allii-porri</i>, <i>Alternaria porri</i>, <i>Phytophthora porri</i>, <i>Puccinia allii</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până când 50% din frunze sunt aplecate (îndoite) (BBCH 14-48) <u>SALATĂ* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Bremia lactucae</i>, <i>Rhizoctonia solani</i>, <i>Erysiphe spp.</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 4 frunze până când căpățâna are mărimea caracteristică soiului (BBCH14-49) <u>SECARĂ*:</u> <i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). <u>TRITICALE*:</u> <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Septoria tritici</i>, <i>Septoria nodorum</i>, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69) <u>VINETE*(CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria solani</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Phytophthora infestans</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe – până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88). <u>VARZĂ (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Albugo candida</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățânii (BBCH 16-49).
--	--	--	--	--



				VARZĂ DE BRUXELLES* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria brassicae</i> <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățanii (BBCH 16-49). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care compania nu a efectuat teste de eficacitate.	
7.	ALPINA 250 g/L azoxistrobin	RANGOLI ROMANIA PESTICIDES SRL CO:929PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	CASTRAVETI (CÂMP, SPATII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Erysiphe</i> spp., <i>Oidiopsis</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88). TOMATE (CÂMP, SPATII PROTEJATE): <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Alternaria</i> spp., <i>Leveillula taurica</i> , <i>Cladosporium</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88). ARDEI (CÂMP, SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria capsici annui</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88). CEAPĂ (CÂMP): <i>Alternaria porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Puccinia allii</i> , <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplecate (BBCH 14-48). CEAPĂ VERDE*(CÂMP) <i>Alternaria porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Puccinia allii</i> , <i>Sclerotium cepivorum</i>	ATENȚIE



				• 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplecate (BBCH 14-48). ARPAGIC* (CÂMP): <i>Alternaria porri</i>, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Cladosporium allii-porri</i>, <i>Puccinia allii</i>, <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la formarea primelor 3 frunze până la formarea completa a bulbului (BBCH 13-50). MORCOV (CÂMP): <i>Erysiphe spp.</i>, <i>Alternaria dauci</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 50% din rădăcini s-au maturat (BBCH 19-85). CARTOF (CÂMP): <i>Alternaria spp</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primelor ramificații bazale până la îngălbenirea frunzelor (BBCH 21-91). CARTOF (APLICARE PE RÂND): <i>Rhizoctonia solani</i> • 3,0 L/ha La plantare sau înainte de plantare pe rând prin încorporare în sol (BBCH 00). BROCCOLI*: <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49). DOVLECEL*, DOVLEAC* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Cladosporium cucumerinum</i>, <i>Colletotrichum lagenarium</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Peronospora spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până la 80% din fructe au s-au maturat (BBCH 16-88). CĂPSUN* (SPAȚII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca macularis</i>	
--	--	--	--	--	--



				<i>Colletotrichum acutatum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până la a 2- a recoltare (BBCH 55-89). CONOPIDĂ* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Albugo candida</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate, până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49). GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Septoria tritici</i>, <i>Septoria nodorum</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Alternaria spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). FASOLE (CÂMP): <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Uromyces viciae-fabae</i>, <i>Ascochyta spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primilor lastari până când 20% păstai au dimensiune normală (BBCH 21 -72). MAZĂRE (CÂMP): <i>Ascochyta pisi</i>, <i>Mycosphaerella pinodes</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Peronospora viciae</i>. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la faza de buton floral până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 51-69). ORZ: <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Pyrenophora teres</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Puccinia hordei</i>, <i>Fusarium spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul perioadei de înspicare/ spicul este complet vizibil (BBCH 30-59).
--	--	--	--	--



				PEPENE GALBEN*, PEPENE VERDE (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Spaerotheca fuliginea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88). PORUMB (PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ): <i>Helminthosporium spp.</i> <i>Puccinia sorghi</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, când internodiile încep să fie vizibile, până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 30-69). RAPITĂ: <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul înfloritului, până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 60-69) . PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Microsphaera spp.</i>, <i>Podosphaera xanthii</i>, <i>Puccinia horiana</i>, <i>Sphaerotheca pannosa</i>, <i>Albugo candida</i>, <i>Alternaria spp.</i>, <i>Ascochyta spp.</i>, <i>Botrytis spp.</i>, <i>Cladosporium spp.</i>, <i>Colletotrichum spp.</i>, <i>Glomerella cingulata</i>, <i>Peronospora spp.</i>, <i>Phoma spp.</i>, <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Plasmopara spp.</i>, <i>Pythium spp.</i>, <i>Septoria spp.</i>, <i>Stemphylium spp.</i> • 0,8-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Rhizoctonia spp.</i> • 3,0 L/ha (aplicare prin încorporare în sol) În prima parte a perioadei de vegetație PEPINIERE FORESTIERE: <i>Melampsora capraearum</i> <i>Colletotrichum trifolii</i>, <i>Glomerella cingulata</i>, <i>Phoma spp.</i>, <i>Septoria spp.</i> <i>Lophodermella concolor</i>, <i>Lophodermium pinastri</i>	
--	--	--	--	--	--



				• 0,8-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație <u>PRAZ* (CÂMP):</u> <i>Cladosporium allii-porri</i>, <i>Alternaria porri</i>, <i>Phytophthora porri</i>, <i>Puccinia allii</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până când 50% din frunze sunt aplecate (îndoite) (BBCH 14-48). <u>SALATĂ* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Bremia lactucae</i>, <i>Rhizoctonia solani</i>, <i>Erysiphe</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 4 frunze până când căpățâna are mărimea caracteristică soiului (BBCH14-49). <u>SECARĂ*:</u> <i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). <u>TRITICALE*:</u> <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Fusarium</i> spp., <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Septoria tritici</i>, <i>Septoria nodorum</i>, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). <u>VINETE* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria solani</i>, <i>Leveillula taurica</i>, <i>Phytophthora infestans</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe – până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88). <u>VARZĂ (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Albugo candida</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha	
--	--	--	--	---	--



				(în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățânii (BBCH 16-49). VARZĂ DE BRUXELLES* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Alternaria brassicae, Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățânii (BBCH 16-49). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care compania nu a efectuat teste de eficacitate.	
8.	SEEMA 400 FS 250 g/L protioconazol + 150 g/L tebuconazol	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:930PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	GRĂU: <i>Tilletia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp. • 0,15 L/t Se aplică înainte de semănat (BBCH 00) ORZ: <i>Ustilago nuda, Pyrenophora graminea</i> • 0,15 L/t Se aplică înainte de semănat (BBCH 00)	ATENȚIE
9.	BONAFIDE 500 WG 500 g/Kg boscalid	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:931PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	VITA DE VIE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,0-1,2 kg/ha (în funcție de presiunea de atac) Se aplică un singur tratament/an în unul din următoarele stadii de dezvoltare a viței de vie: sfârșitul înfloritului, înaintea de compactarea ciorchinului sau la intrarea în pârgă a strugurilor. RAPITA DE TOAMNĂ, RAPITĂ DE PRIMAVARĂ: <i>Plenodomus lingam</i> • 0,2-0,5 kg/ha (în funcție de presiunea de atac) Se pot aplica maxim 2 tratamente/sezon (o aplicare în toamnă și una în primăvară) din faza de 3 frunze – până când inflorescența este complet dezvoltată dar mugurii floralii sunt încă închiși) (BBCH 13-57). RAPITA DE TOAMNĂ, RAPITĂ DE PRIMAVARĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria</i> spp. • 0,2-0,5 kg/ha (în funcție de presiunea de atac) Se pot aplica maxim	-----



				tratamente/sezon la un interval de minim 14 zile între tratamente din faza de inflorescență complet dezvoltată cu mugurii floriali închiși până când -10% din silicve au ajuns la mărimea finală) (BBCH 57-71).	
10.	KURSOR 250 g/L difenconazol	RANGOLI ROMANIA PESTICIDES SRL CO:932PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	CAIS*: <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică primul tratament la deschiderea primelor flori (BBCH 60) iar al 2-lea până la 7 zile înainte de recoltare. CĂPSUN*: <i>Mycospharella fragariae</i> • 0,3 L/ha (0,03%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori până la 3 zile înainte de recoltare (BBCH 60-89). CIRES*: <i>Blumeriella jaapii, Monilia spp.</i> • 0,2 L/ha (0,02%) Nr.maxim tratamente: 3 Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85). MĂR: <i>Venturia inequalis</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,2 L/ha (0,0267%) Nr.maxim tratamente: 3 Se aplică de la începutul înfloririi - până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 61-84). PIERSIC*: <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare. <i>Taphrina deformans, Coryneum beijerinckii, Spaerotecha pannosa var.persicae, Monilia spp.</i> • 0,2 L/ha (0,02%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare. RAPITĂ:	ATENTIE



				<i>Phoma lingam</i>, <i>Alternaria brassicae</i> <i>Erysiphe communis</i> • 0,5 L/ha Nr. maxim tratamente: 2 1 aplicare în toamnă și 1 în primăvară Toamna în stadiul de 1-8 frunze (BBCH 11-18) Se aplică primăvara de la apariția primului internod până la apariția mugurilor floralii (BBCH 31-55). SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola</i>, <i>Erysiphe betae</i> • 0,5 L/ha Nr. maxim tratamente: 2 Se aplică din faza în care frunzele încep să acopere solul până când rădăcina de sfeclă ajunge la dimensiunea recoltabilă (BBCH 31-49). TOMATE: <i>Alternaria solani</i> • 0,5 L/ha (0,05%) Nr. maxim tratamente: 2 Se aplică de la începutul formării lăstarilor - până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică pentru coacere (BBCH 20-87). VIȘIN*: <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr. maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85). *Utilizari minore in Romania, conform Ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
11.	TOKAMA 125 g/L protioconazol + 125 g/L tebuconazol	Ciech Sarzyna S.A., Polonia CO:933PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Septoria</i> spp., <i>Puccinia</i> spp., <i>Helminthosporium</i> spp. • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). GRÂU: <i>Fusarium</i> spp • 0,9 L/ha Se aplică în timpul înfloririi (BBCH 61-69) ORZ: <i>Erysiphe graminis f. sp. hordei</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora teres</i> (sin. <i>Drechslera teres</i>), <i>Helminthosporium sativum</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii	ATENȚIE



				paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). PORUMB: <i>Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică în timpul înfloririi (BBCH 61-69).	
12.	FALANGA 250 EC 250 g/L difenoconazol	Ciech Sarzyna S.A., Polonia CO:934PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	CAIS*: <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică primul tratament la deschiderea primelor flori (BBCH 60) iar al 2-lea până la 7 zile înainte de recoltare. CĂPSUN*: <i>Mycosphaella fragariae</i> • 0,3 L/ha (0,03%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori până la 3 zile înainte de recoltare (BBCH 60-89) CIRES*: <i>Blumeriella jaapii, Monilia spp.</i> • 0,2 L/ha (0,02%) Nr.maxim tratamente: 3 Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85). MĂR: <i>Venturia inequalis</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,2 L/ha (0,0267%) Nr.maxim tratamente: 3 Se aplică de la începutul înfloririi - până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 61-84). PIERSIC*: <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori până la 7 zile înainte de recoltare (BBCH 60). <i>Taphrina deformans</i> <i>Coryneum beijerinckii</i> <i>Spaerotecha pannosa var.persicae</i> <i>Monilia spp.</i> • 0,2 L/ha (0,02%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori până la 7 zile înainte de recoltare (BBCH 60).	ATENȚIE



				RAPITĂ: <i>Phoma lingam</i>, <i>Alternaria brassicae</i> <i>Erysiphe communis</i> • 0,5 L/ha Nr.maxim tratamente: 2 1 aplicare în toamnă și 1 în primăvară Toamna în stadiul de 1-8 frunze (BBCH 11-18). Se aplică primăvara de la apariția primului internod până la apariția mugurilor florali (BBCH 31-55). SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola</i>, <i>Erysiphe betae</i> • 0,5 L/ha Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică din faza în care frunzele încep să acopere solul până când rădăcina de sfeclă ajunge la dimensiunea recoltabilă (BBCH 31-49). TOMATE: <i>Alternaria solani</i> • 0,5 L/ha(0,05%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la începutul formării lăstarilor - până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică pentru coacere(BBCH 20-87). VIȘIN*: <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Nr.maxim tratamente: 2 Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85). *Utilizari minore in Romania, conform Ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
13.	FIELDSAR 60 SL 60 g/L metconazol	Ciech Sarzyna S.A, Polonia CO:935PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia spp</i> <i>Septoria tritici</i>, <i>Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). GRÂU: <i>Septoria nodorum</i> • 1,2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69).	<u>PERICOL</u>



				ORZ: Complex boli foliare (<i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia</i> spp., <i>Septoria tritici</i>, <i>Fusarium</i> spp.), <i>Septoria nodorum</i> • 1,2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). RAPITĂ: <i>Phoma lingam</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Erysiphe communis</i> • 1,0 L/ha Primăvara: Se aplică de la alungirea tulpinii până la înflorirea completă (BBCH 31-59). RAPITĂ: Regulator de creștere • 0,7 L/ha Toamna: Se aplică de la 4 frunze la 8 (BBCH 14-18).	
--	--	--	--	--	--

INSECTICIDE

					ATENȚIE
1.	TEKTON 15 g/kg teflutrin	Galenika-Fitofarmacija d.o.o., Slovenia CO:936PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	PORUMB: <i>Agriotes</i> spp. • 12,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). PORUMB: <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> • 15,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). PORUMB ZAHARAT*: <i>Agriotes</i> spp. • 12,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). PORUMB ZAHARAT*: <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> • 15,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). FLOAREA SOARELUI: <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). TOMATE (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10,0 kg/ha Înainte sau la transplantare (BBCH 12).	



				SALATĂ*(CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). CEAPĂ (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). FASOLE* (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). DOVLECEI*(CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). PEPENE GALBEN*(CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). PEPENE VERDE (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10,0 kg/ha La semănat pe rând (BBCH 00). PEPINIERE, CULTURI ÎNFIINTATE PRIN RĂSAD, BUTASI ȘI PLANTE ALTOITE (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 15,0 kg/ha Se aplică la plantare (BBCH 00). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	---	--

REGULATORI DE CREȘTERE

1.	CLUSTER 400SL 400 g/L clorura de cloromequat	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:937PC/07.03.2024	SMRZ: ROMÂNIA	GRÂU: Regulator de creștere • 1,8 - 2,0 L/ha Se aplică de la începutul înfrățirii până la frunza stindard abia vizibilă, încă înfășurată. (BBCH 21-37). RAPITĂ: • 2,0 - 3,75 L/ha De la 4 la 6 frunze (BBCH 14 -16). Se aplică de la primul internod până la 9 sau mai multe internoduri vizibil extinse (BBCH 30 - 39).	ATENȚIE
----	---	---	------------------	--	---------

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 – 42 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

FUNGICIDE

1.	OXITEC HI BIO 419,79 g/kg oxiclorură de cupru (250 g/kg Cu)	Albaugh TKI d.o.o Slovenia CO:938PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN SPANIA	TOMATE (SPAȚII PROTEJATE): Bacterioze (ex.: <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>; <i>Pseudomonas corrugate</i>; <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>)	ATENȚIE
----	--	--	---	---	---------



				<i>Phytophthora</i> spp. • 3,0 kg/ha Se aplică de la a 5-a frunză apărută până când fructele au culoarea tipică de recoltare (BBCH 15-89); max. 3-4 tratamente/sezon. VINETE (SPAȚII PROTEJATE)*: <i>Bacterioze</i> (ex.: <i>Pseudomonas syringae</i>; <i>Pseudomonas corrugate</i>; <i>Xanthomonas campestris</i>), <i>Phytophthora</i> spp. • 3,0 kg/ha Se aplică de la a 5-a frunză apărută până când fructele au culoarea tipică de recoltare (BBCH 15-89); max. 3-4 tratamente/sezon. CUCURBITACEE CU COAJA COMESTIBILĂ (SPAȚII PROTEJATE): <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 2,0 kg/ha Se aplică de la apariția cotiledonelor până când fructele au culoarea tipică de recoltare (BBCH 10-89); max. 3-4 tratamente/sezon. *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
2.	GAMELAN 100FS 100 g/L protioconazol	INNVIKO Sp.z.o.o., Polonia CO:939PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ: <i>Tilletia caries</i>, <i>Fusarium</i> sp., <i>Monographella nivalis</i> (anam. <i>Microdochium nivale</i>) • 1,0 L/T sămânță (100 mL/100 kg sămânță) Tratament sămânță (BBCH 00). TRITICALE DE TOAMNĂ: <i>Fusarium</i> sp., <i>Monographella nivalis</i> (anam. <i>Microdochium nivale</i>) • 1,0 L/T sămânță (100 mL/100 kg sămânță) Tratament sămânță (BBCH 00). SECARĂ DE TOAMNĂ: <i>Fusarium</i> sp., <i>Monographella nivalis</i> (anam. <i>Microdochium nivale</i>), <i>Urocystis occulta</i> • 1,0 L/T sămânță (100 mL/100 kg sămânță) Tratament sămânță (BBCH 00).	ATENȚIE
3.	SCAB 80 WG 800 g/kg captan	Sharda Cropchem Espana S.L, Spania CO:116PC/22.07.2015	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PEPINIERE POMI FRUCTIFERI*, PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE) : Patarea frunzelor (ex :<i>Polystigma rubrum</i> - prun ; <i>Fabraea maculata-gutui</i> ; <i>Diplocarpon rosae</i>-trandafir) • 0,2 %	PERICOL



				Se aplică de la apariția primelor trei frunze până la sfârșitul înfloriturii și căderea petalelor (BBCH 13-69). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
4.	LS METCO PLUS 48 g/L metconazole + 100 g/L protioconazol	LIFE SCIENTIFIC Ltd, Irlanda CO:940PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM*, GRÂU SPELTA* (TOAMNĂ, PRIMAVARĂ): <i>Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică din stadiul în care jumătate din inflorescență a apărut până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 55–69). GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM*, GRÂU SPELTA*, SECARĂ*, TRITICALE* (TOAMNĂ, PRIMAVARĂ): <i>Septoria tritici, Puccinia recondita</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30 – 69).	PERICOL
5.	GEOXE 500 g/kg fludioxonil	SYNGENTA AGRO SRL, România CO:941PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	MĂR, PĂR*: <i>Penicillium expansum, Botrytis cinerea, Gloeosporium spp.</i> • 0,45 kg/ha Se aplică de la momentul când fructele au diametrul de 40 mm până la maturitatea de consum a fructelor (BBCH 74-89); 2 tratamente/sezon la interval de 7 zile. CĂPȘUN* (CÂMP): <i>Botrytis cinerea, Colletotrichum fragariae</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la începutul înfloririi - 10% flori se deschid până la sfârșitul recoltării (BBCH 61-89); 2 tratamente/sezon la interval de 10 zile. SALATA VERDE* (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la prima frunză adevărată până când plantele ating masa foliară tipică (BBCH 11-49); 2 tratamente/sezon la interval de 10 zile. PĂR*: <i>Monilinia laxa, Nectria galigena</i> • 0,45 kg/ha Se aplică de la momentul când fructele au diametrul de 40 mm până la maturitatea de consum a fructelor (BBCH 74-89); 2	ATENȚIE



				tratamente/sezon la interval de 7 zile. <u>PĂR ASIATIC*, MĂR PĂDURET*, GUTUI*, GUTUI JAPONEZ*:</u> <i>Neofabraea vagabunda/Gleosporium, Botrytis cinerea, Monilinia laxa, Nectria galigena, Penicilium expansum</i> • 0,45 kg/ha Se aplică de la momentul cand fructele au diametrul de 40 mm până la maturitatea de consum a fructelor (bbch74-89); 2 tratamente/sezon la interval de 7 zile. <u>AFIN*, ZMEUR*, MUR*, COACĂZ* (ROSU, ALB, NEGRU), AGRIS*, ARONIA*, MERISOR*, SOC*, SCORUȘ*:</u> <i>Botrytis cinerea, Elsinoe veneta, Leptosphaeria coniothyrium, Godronia cassandrae</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la începutul înfloririi. 10% flori se deschid până la sfârșitul fazei de coacere a fructelor (BBCH 61-89); 2 tratamente/sezon la interval de 10 zile. <u>KIWI*:</u> <i>Botrytis cinerea, Alternaria sp.</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la începutul fazei de înflorire până la sfârșitul fazei de coacere a fructelor (BBCH 61-89); 2 tratamente/sezon la interval de 21 zile. <u>BOB*, NĂUT * - PENTRU SEMINTE (CÂMP):</u> <i>Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,75 kg/ha Se aplică din momentul în care sunt vizibili primii boboci florali până la cca. toate păstăile au atins lungimea finală 15-20 mm (BBCH 51-79); 2 tratamente/sezon la interval de 10 zile. <u>CICOARE*, ANDIVE*, SPANAC*, IERBURI AROMATICE*, FLORI COMESTIBILE (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE)*:</u> <i>Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la faza primei frunze adevărate până la faza în care plantele ating greutatea tipică a frunzei sau dimensiunea tipică (BBCH 11-49); 2 tratamente/sezon la interval de 10 zile.
--	--	--	--	---



				LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE (CÂMP, SPATII PROTEJATE)*: <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la prima până la a opta frunză adevărată (BBCH 11-18); 2 tratamente/sezon la interval de 10 zile. ZUCCHINI*, DOVLEAC*, DOVLECEL PATISON*, PEPENE GALBEN*: <i>Botrytis cinerea</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la începutul fazei de înflorire până la faza în care nouă sau mai multe fructe de pe lăstarul principal au atins forma și dimensiunea tipică (BBCH 61-79); 2 tratamente/sezon la interval de 7 zile. CEAPĂ EȘALOTĂ *, USTUROI * (CÂMP): <i>Botrytis allii</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la începutul fazei vizibile a primei frunze până la sfârșitul fazei de dezvoltare a părților plantelor destinate recoltării (BBCH 11-49); 2 tratamente/sezon la interval de 14 zile. PLANTE ORNAMENTALE (CÂMP, SPATII PROTEJATE)*: <i>Botrytis cinerea</i> • 0,45 kg/ha Se aplică de la stadiul de 7 frune până la sfârșitul fazei de înflorire (BBCH 17-69); 2 tratamente/sezon la interval de 7 zile. *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
6.	TRESO 500 g/kg fludioxonil	SYNGENTA AGRO SRL, România CO:942PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	RAPITĂ DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament/sezon. FLOAREA- SOARELUI: <i>Puccinia helianthi</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul înfloritului până la înflorire completă (BBCH 61-65); 1 tratament/sezon. SOIA: <i>Septoria glycines</i>	ATENȚIE



				• 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul înfloritului până la înflorire completă (BBCH 61-65); 1 tratament/sezon. <u>CAMELINĂ*, MUSTAR*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Alternaria spp., Albugo candida</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament/sezon. <u>RAPITĂ FURAJERĂ*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria spp.</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament/sezon. <u>MAC*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament/sezon. <u>IN*:</u> <i>Botrytis cinerea, Colletotrichum lini, Melampsora linii, Septoria linicola, Alternaria linicola, Alternaria alternata</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament/sezon. <u>CÂNEPĂ (PENTRU ULEI)*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Phyllostica cannabidis, Stemphylium botryosum, Septoria cannabidis, Dendrophoma marconii</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul înfloritului până la înflorire completă (BBCH 61-65); 1 tratament/sezon. <u>CÂNEPĂ (PENTRU FIBRĂ ȘI SEMINTE)*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Phyllostica cannabidis, Stemphylium botryosum, Septoria cannabidis, Dendrophoma marconii</i> • 0,5 - 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament/sezon. (doza mai mare se utilizează la o presiune mai mare a bolii sau în condiții meteorologice nefavorabile, rata mai mică - atunci când condițiile sunt mai puțin favorabile pentru răspândirea bolii.)	
--	--	--	--	--	--



				*Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
INSECTICIDE					
1.	AZA 10 EC 10 g/L azadiractină	Sharda Cropchem Espana S.L, Spania CO:943PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 2,5 L/ha Se aplică de la a doua etapă a frunzelor până la începutul îngălbenirii frunzelor (BBCH12 – 91). PLANTE ORNAMENTALE*: <i>Bemisia tabaci, Thrips sp., Aphis sp.</i> • 3,0 L/ha Se aplică de la faza de două frunze adevărate (două perechi de frunze sau două vârfuri) până la maturitatea completa a fructelor (semințe) (BBCH12 –89). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	ATENȚIE
2.	SIVANTO PRIME 200 SL 200 g/L flupiradifuron	BAYER SRL, România CO:644PC/24.11.2020	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN OLANDA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PĂR*: <i>Rhopalosiphum oxyacanthae, Anuraphis farfarae, Dysaphis pyri</i> • 0,40 L/ha Se aplică la diferențierea primelor frunze până la 50% flori desfăcute, căderea primelor petale (BBCH 10-65); 1 tratament/an în perioada martie-mai. CARTOF: <i>Myzus persicae, Aphis frangulae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,50 L/ha Se aplică atunci când 10% plante acoperă banda dintre rânduri până la apariția primelor fructe (BBCH 31-89); 1 tratament/an în perioada mai-septembrie. CONOPIDA*, BROCCOLI*, VARZA DE BRUXELLES*, VARZĂ: <i>Brevicoryne brassicae, Myzus persicae</i> • 0,625 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a 2a frunze până la apariția tuturor frunzelor BBCH 12- 39); 1 tratament la 2 ani în perioada aprilie – octombrie. sau Se aplică la începutul formării căpățanii până la maturarea acestora	ATENȚIE



				BBCH 40- 49) ; 1 tratament/an în perioada aprilie – octombrie. <u>FASOLE PROASPĂTĂ CU SAU FĂRĂ PĂSTĂI*:</u> <i>Acyrtosiphon pisum</i> • 0,375 L/ha Se aplică la apariția primei perechi de frunze - 9 lăstari vizibili (BBCH 12- 29);1 tratament la 2 ani în perioada aprilie - octombrie sau Se aplică de la primii boboci floriali vizibili până la 70% păstăi maturate (BBCH 51- 87); 1 tratament/an în perioada aprilie – octombrie. <u>MAZĂRE PROASPĂTĂ*:</u> <i>Acyrtosiphon pisum</i> • 0,375 L/ha Se aplică de la 2 frunze desfăcute până la 9 sau mai multe frunze desfăcute (BBCH 12-29);1 tratament la 2 ani în perioada aprilie – octombrie. <u>MAZĂRE PROASPĂTĂ CU PĂSTĂI* INCLUSIV LINTE* ȘI NĂUT*:</u> <i>Acyrtosiphon pisum</i> • 0,375 L/ha Se aplică de la 2 frunze desfăcute până la 9 sau mai multe frunze desfăcute (BBCH 30- 87); 1 tratament/an în perioada aprilie – octombrie *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
3.	LOS OVADOS 200 SE/(BIATOX - a doua denumire comercială) 200 g/L acetamiprid	INNVIGO Sp.z.o.o., Polonia CO:794PC/23.08.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>RAPITĂ DE TOAMNĂ:</u> <i>Brevicoryne brassicae, Athalia rosae, Psylliodes chrysocephala, Delia radicum</i> • 0,25 L/ha + 0,1 L/ha Asystent+/ Silitop Se aplică de la începutul apariției frunzelor până la apariția celei de-a 7-a frunze (BBCH 10-17). <i>Ceuthorynchus quadridens</i> • 0,2 - 0,25 L/ha Se aplică de la faza de muguri de flori vizibili până la sfârșitul înfloririi (BBCH 55-67). <u>GRÂU DE TOAMNĂ:</u> <i>Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae</i> • 0,2 L/ha sau 0,2 L/ha + 0,1 L/ha Asystent	<u>ATENȚIE</u>



				Se aplică de la apariția celei de a 3-a frunze până la începutul înfloririi (BBCH 13-21). <i>Sitobion avenae, Oulema melanopa</i> • 0,2 L/ha sau 0,2 L/ha +0,1 L/ha Asysent + Se aplică de la începutul apariției spicului până la maturitatea boabelor (în lapte) (BBCH 51-77).	
--	--	--	--	---	--

ERBICIDE

1.	FLAME DUO 354 SG 104 g/kg florasulam + 250 g/kg tribenuron-metil	Albaugh TKI d.o.o Slovenia CO:944PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN MALTA	CEREALE DE TOAMNĂ (ORZ, GRĂU, OVĂZ, SECARĂ*, TRITICALE*, GRĂU DURUM*): Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Chenopodium album, Centaurea cyanus, Lamium purpureum, Veronica spp. Viola arvensis, Sinapis arvensis etc.</i>) • 60 g/ha Se aplică postemergent, de la începutul alungirii tulpinii până la apariția frunzei stindard (BBCH 30-39). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	ATENȚIE
2.	ETHOSAT 500 SC 500 g/L etofumesat	Adama Agricultural Solutions SRL, România CO:945PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Stellaria media, Galium aparine</i> • 0,6 L/ha Se aplică din faza de cotiledoane până în faza de 8 frunze (BBCH 10-18); max.3 tratamente/sezon.	ATENȚIE
3.	ZEPPPOS 6 g/kg iodosulfuron (iodosulfuron – metil - sodiu + 30 g/kg mezosulfuron metil + 90 g/kg mefenpir dietil - safener	Globachem NV, Belgia CO:946PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRĂU DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ, SECARĂ: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate • 0,2 -0,4 L/ha Se aplică de la începutul înfrățirii până la apariția nodul 2 la cel puțin 2 cm deasupra nodului 1 (BBCH 21-32); 1 tratament/sezon. GRĂU DUR DE TOAMNĂ*, GRĂU SPELTA DE TOAMNĂ*: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate • 0,2 -0,4 L/ha Se aplică de la începutul înfrățirii până la apariția nodul 2 la cel puțin 2 cm deasupra nodului 1 (BBCH 21-32); 1 tratament/sezon. *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	PERICOL



4.	Clinic Xtreme 540SL 540 g/L glifosat (amestec de sare de isopropilamină și sare de potasiu)	Nufarm Polska Sp. z.o.o., Polonia CO:947PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>TERENURI CULTIVATE ÎNAINTE DE ÎNSĂMÂNTARE SAU PLANTAREA PLANTELOR DE CULTURĂ:</u> Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abuthilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium pratense, Triticum aestivum, Veronica arvensis, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Viola tricolor, Xanthium strumarium, etc.)</i> • 2,67 L/ha Se aplică primăvara sau toamna cu 5 zile înainte de însămânțare sau plantare, în perioada de creștere activă a buruienilor (Monocotiledonate: 5 cm înălțime Dicotiledonate: 2 frunze). <u>TERENURI CULTIVATE DUPĂ ÎNSĂMÂNTARE SAU PLANTARE ȘI ÎNAINTE DE RĂSĂRIREA PLANTEI DE CULTURĂ:</u> Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abuthilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum</i>	-----
----	---	---	---	--	-------



				<i>nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium pratense, Triticum aestivum, Veronica arvensis, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Viola tricolor, Xanthium strumarium, etc.)</i> • 2,0 L/ha Se aplică preemergent după răsărirea buruienilor, însă nu mai târziu de 2-3 zile înainte de răsărirea plantei de cultură. La porumb și sfeclă de zahăr, tratamentul se aplică în termen de până la 5 zile după însămânțare. MIRIȘTI: Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium pratense, Triticum aestivum, Veronica arvensis, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Viola tricolor, Xanthium strumarium, etc.)</i> • 2,67 L/ha Se aplică de la mijlocul lunii august până toamna târziu pe buruienile verzi, cu creștere intensivă. Tratamentul trebuie efectuat cu cel mult 5 zile înainte de însămânțarea/plantarea plantei succesive. <i>Agropyron repens</i> : 10-25 cm înălțime; Monocotiledonate: 5 cm înălțime Dicotiledonate: 2 frunze MĂR, PĂR, PRUN, VIȘIN: Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens,</i>
--	--	--	--	--



			<i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Ambrosia artemisiifolia</i>, <i>Anagallis arvensis</i>, <i>Apera spica-venti</i>, <i>Brassica napus</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Consolida regalis</i>, <i>Convolvulus arvensis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Geranium pusillum</i>, <i>Hordeum vulgare</i>, <i>Lapsana communis</i>, <i>Tripleurospermum maritimum</i> subsp. <i>Inodorum</i>, <i>Mentha arvensis</i>, <i>Poa annua</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>, <i>Polygonum aviculare</i>, <i>Persicaria maculosa</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Sorghum halepense</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Trifolium pratense</i>, <i>Triticum aestivum</i>, <i>Veronica arvensis</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Viola arvensis</i>, <i>Viola tricolor</i>, <i>Xanthium strumarium</i>, etc.) • 2,0 L/ha Tratamentul se va aplica în benzi între rânduri în perioada de creștere activă a buruienilor. VITĂ DE VIE: Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum</i> subsp. <i>Inodorum</i>, <i>Mentha arvensis</i>, <i>Poa annua</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>, <i>Polygonum aviculare</i>, <i>Persicaria maculosa</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Sorghum halepense</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Trifolium pratense</i>, <i>Triticum aestivum</i>, <i>Veronica arvensis</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Viola arvensis</i>, <i>Viola tricolor</i>, <i>Xanthium strumarium</i>, etc.) • 2,0 L/ha Tratamentul se va aplica în benzi între rânduri în perioada de creștere activă a buruienilor, în plantații viticole începând cu al 3-lea an de la
--	--	--	---



				plantare. PAJISTI, TERENURI VERZI, PELUZE, ZONE DE AGREMENT SI TERENURI DE SPORT: Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium pratense, Triticum aestivum, Veronica arvensis, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Viola tricolor, Xanthium strumarium, etc.)</i> • 2,67 L/ha Se aplică în perioada de creștere intensivă a buruienilor, pe toată perioada de vegetație. Tratamentul se v-a efectua cu 24 de ore înainte de însămânțarea ierburilor. Semănatul ierburilor se va face cel mai devreme la 5 zile de la tratamentul de recultivare. TERENURI NECULTIVATE: Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca</i>	
--	--	--	--	--	--



				oleracea, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Sorghum halepense</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Trifolium pratense</i>, <i>Triticum aestivum</i>, <i>Veronica arvensis</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Viola arvensis</i>, <i>Viola tricolor</i>, <i>Xanthium strumarium</i>, etc.) • 2,67 L/ha Se aplică din primăvara până toamna, înainte de însămânțarea plantei de cultură în perioada de creștere activă a buruienilor. <u>PEPINIERE FORESTIERE, CULTURI FORESTIERE:</u> Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium pratense, Triticum aestivum, Veronica arvensis, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Viola tricolor, Xanthium strumarium, etc.)</i> • 2,0 L/ha Tratamentul se va aplica în benzi între rânduri în perioada de creștere activă a buruienilor. <u>PEPINIERE PLANTE DECORATIVE (PLANTE LEMNOASE DE FOIOASE ȘI CONIFERE, ALE CĂROR RĂSADURI SUNT MAI VECHI DE DOI ANI):</u> Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abutilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium</i>
--	--	--	--	---



				arvense, <i>Consolida regalis</i>, <i>Convolvulus arvensis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Galium</i> <i>aparine</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Geranium pusillum</i>, <i>Hordeum vulgare</i> <i>Lapsana communis</i>, <i>Tripleurospermum maritimum</i> subsp. <i>Inodorum</i>, <i>Mentha arvensis</i>, <i>Poa</i> <i>annua</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>, <i>Polygonum aviculare</i>, <i>Persicaria</i> <i>maculosa</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Sorghum</i> <i>halepense</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Thlaspi</i> <i>arvense</i>, <i>Trifolium pratense</i>, <i>Triticum</i> <i>aestivum</i>, <i>Veronica arvensis</i>, <i>Veronica</i> <i>hederifolia</i>, <i>Viola arvensis</i>, <i>Viola</i> <i>tricolor</i>, <i>Xanthium strumarium</i>, etc.) • 3,0 L/ha Tratamentul se va aplica în benzi între rânduri în perioada de creștere activă a buruienilor. TERENURI NEUTILIZATE PENTRU AGRICULTURĂ (CURTI DE DEPOZITARE, TERENURI INDUSTRIALE, MARGINI DE DRUMURI, DRUMURI, CĂI PIETONALE, TROTUARE, PAVAJE): Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate (<i>Abutilon theophrasti</i>, <i>Achillea</i> <i>millefolium</i>, <i>Elytrigia repens</i>, <i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Amaranthus</i> <i>retroflexus</i>, <i>Ambrosia artemisiifolia</i>, <i>Anagallis arvensis</i>, <i>Apera spica-venti</i>, <i>Brassica napus</i>, <i>Capsella bursa-</i> <i>pastoris</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Cirsium</i> <i>arvense</i>, <i>Consolida regalis</i>, <i>Convolvulus arvensis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Galium</i> <i>aparine</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Geranium pusillum</i>, <i>Hordeum vulgare</i> <i>Lapsana communis</i>, <i>Tripleurospermum maritimum</i> subsp. <i>Inodorum</i>, <i>Mentha arvensis</i>, <i>Poa annua</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>, <i>Polygonum aviculare</i>, <i>Persicaria</i> <i>maculosa</i>, <i>Portulaca</i> <i>oleracea</i>, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Setaria</i> <i>viridis</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Solanum</i> <i>nigrum</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Sorghum</i> <i>halepense</i>, <i>Stellaria</i> <i>media</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Thlaspi</i> <i>arvense</i>, <i>Trifolium pratense</i>, <i>Triticum</i> <i>aestivum</i>, <i>Veronica arvensis</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Viola</i> <i>arvensis</i>, <i>Viola tricolor</i>, <i>Xanthium</i> <i>strumarium</i>, etc.) • 2,0 L/ha Tratamentul se va aplica localizat, în stadiul de creștere intensivă a buruienilor.	
--	--	--	--	---	--



			CĂI FERATE: Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abuthilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium pratense, Triticum aestivum, Veronica arvensis, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Viola tricolor, Xanthium strumarium, etc.)</i> • 2,67 L/ha Se aplică în perioada de creștere activă a buruienilor . POMI NUCIFERI (NUC, ALUN): Buruieni anuale și perene mono și dicotiledonate <i>(Abuthilon theophrasti, Achillea millefolium, Elytrigia repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Hordeum vulgare, Lapsana communis, Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum, Mentha arvensis, Poa annua, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium pratense, Triticum aestivum, Veronica arvensis, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Viola tricolor, Xanthium strumarium,</i>	
--	--	--	--	--



				• 2,0 L/ha Tratamentul se va aplica în benzi între rânduri în perioada de creștere activă a buruienilor.	
5.	URI 600 SL 600 g/L 2,4 D sub formă de sare de dimetilamina	Sharda Cropchem Espana S.L, Spania CO:948PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE TOAMNĂ:</u> Buruieni dicotiledonate anuale și perene <i>(Galium aparine, Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Cirsium arvensis, Stellaria media, Lamium purpureum, Chenopodium album, Thlaspi arvensis, Matricaria spp.), etc.</i> • 1,25 L/ha Se aplică postemergent, de la începutul înfrățirii până la stadiul de 2 noduri (BBCH 21-32); 1 tratament/an.	<u>PERICOL</u>
6.	CLOWN 600 SC 600 g/L aclonifen	Sharda Cropchem Espana S.L, Spania CO:949PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>PORTUGALIA</u>	<u>FLOAREA-SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 2,5 -3,0 L/ha Se aplică preemergent (BBCH 00-09). <u>CEAPĂ:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 2,5 L/ha Se aplică preemergent (BBCH 00-09 sau înainte de transplantare. <u>MORCOV:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 2,5 L/ha Se aplică preemergent (BBCH 00-09 sau înainte de transplantare.	<u>ATENȚIE</u>
7.	ELIPRIS 11,7 g/L halauxifen metil + 180 g/L diflufenican + 240 g/L flufenacet + 7,8 g/L cloquintocet acid - safener	CORTEVA AGRISCIENCE ROMÂNIA SRL CO:950PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>Republica Cehă</u>	<u>CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, GRÂU ȘPELTA, TRITICALE, ORZ, SECARĂ):</u> <i>Apera spica-ventis, Centaurea cyanus Galium aparine, Matricaria inodora, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas</i> • 0,5 L/ha Se aplică pre- și postemergent, în toamnă, înainte de răsărit și până la înfrățire (BBCH 00-21); max. 1 aplicare/sezon. <i>Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Geranium pusillum, Lamium spp., Senecio vulgaris, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica officinalis, Viola arvensis</i> • 0,375 L/ha Se aplică pre- și postemergent, în toamnă, înainte de răsărit și până la înfrățire (BBCH 00-21); max.1 aplicare/sezon.	<u>ATENȚIE</u>
8.	TEKNO 500SC 500 g/L terbutilazină	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO:951PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>PORUMB:</u> Buruieni dicotiledonate: <i>Centaurea cyanus, Viola arvensis, Stellaria media,</i>	<u>ATENȚIE</u>



				<i>Chenopodium album</i>, <i>Tripleurospermum inodorum</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Fallopia convolvulus</i> • 1,0 L/ha + 0,2 % (0,2 L la 100 L apă) adjuvant Hydronis 100 LQ Se aplică preemergent de la semănat, până la apariția radicelei (BBCH 00-05); Se aplică odată la 3 ani pe aceeași suprafață la o doză maximă de 850 g terbutilazină/ha.	
9.	SPICULUS 500 g/L etofumesat	Certiplant BV, Olanda CO:952PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>Republica Cehă</u>	SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ FURAJERĂ: <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Brassica napus</i>, <i>Chenopodium ficifolium</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Chenopodium album</i> • 0,66 L/ha Se aplică din faza de cotiledoane până în faza de 8 frunze (BBCH 10-18), max.3 tratamente/sezon. Se aplică odată la 3 ani pe aceeași suprafață la o doză maximă de 1,0 kg etofumesat /ha.	<u>ATENȚIE</u>
10.	ALTIVATE 60 g/kg mezosulfuron metil	HELM AG, Germania CO:953PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>AUSTRIA</u>	GRÂU DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ*, SECARĂ*: <i>Poa annua</i>, <i>Apera spica-venti</i> • 0,15 kg/ha Se aplică toamna, de la desfacerea primei frunze până la înfrățire (BBCH11 -25). sau Se aplică primăvara, de la începutul înfrățirii până la apariția celui de-al 2-lea nod (BBCH 20 -32). GRÂU DE TOAMNĂ: <i>Avena fatua</i>, <i>Lolium sp.</i>, <i>Alopecurus myosuroides</i> • 0,25 kg/ha Se aplică primăvara, de la începutul înfrățirii până la apariția celui de-al 2-lea nod (BBCH 20 -32). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	<u>ATENȚIE</u>
11.	MATENO DUO 600 SC 100 g/L diflufenican + 500 g/L aclonifen	BAYER SRL, România CO:954PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	GRÂU DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ*, GRÂU DURUM DE TOAMNĂ*: Buruieni dicotiledonate anuale, <i>Apera-spica venti</i>, <i>Poa annua</i> • 0,7 L/ha Se aplică în toamnă preemergent (BBCH 00-09); 1 tratament/sezon ORZ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE TOAMNĂ*: Buruieni dicotiledonate anuale	<u>ATENȚIE</u>



				• 0,35 L/ha Se aplică în toamnă preemergent (BBCH 00-09) sau în postemergență timpurie de la apariția primei funze până la 3 frunze desfăcute (BBCH 10-13).	
REGULATORI DE CREȘTERE					
1.	PIQUE 38 SL 50 g/L clorură de mepiquat	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:955PC/07.03.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ:</u> • 0,75 L/ha Se aplică de la formarea primului internod – frunza standard deschisă (BBCH 31 - 39); 1 tratament/an	
REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR – (ART.43– Reg.(CE) nr.1107/2009)					
ERBICIDE					
1.	CORUM/ (PASSAT DUO - a doua denumire comercială) 22,4 g/L imazamox + 480 g/L bentazonă	BASF SE, GERMANIA CO:043PC/ 27.02.2014	<u>SMRZ:</u> OLANDA	NU SE REÎNNOIEȘTE OMOLOGAREA Certificatul de omologare nr.: 043PC/ 27.02.2014 se retrage cu data de 07.03.2024 fără acordarea unei perioade de grație.	
2.	VALDOR FLEX 37 WG 360 g/kg diflufenican + 10 g/kg iodosulfuron-metil-sodiu	2022 Environmental Science CER RO SRL CO:202PC/ 03.06.2016	<u>SMRZ:</u> REPUBLICA CEHĂ	<u>ZONE NEAGRICOLE, ALINIAMENTE DE CĂI FERATE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate (ex: <i>Poa pratensis</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Helminthotheca echioides</i> , <i>Conyza canadensis</i> , <i>Jacobaea vulgaris</i> , <i>Senecio</i> spp., <i>Sonchus arvensis</i> , <i>Matricaria recutita</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Geranium robertianum</i> , <i>Epilobium hirsutum</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Ambrosia artemisiifolia</i> , <i>Veronica officinalis</i> etc.) • 0,5 kg/ha Se aplică în martie - iunie (în funcție de aria de aplicare) sau postemergență timpurie (în funcție de tipul buruienilor).	<u>ATENȚIE</u>
3.	GUILD 261 g/L glifosat + 1,71 g/L piraflofen-etil	ARYSTA LIFESCENCE SAS, FRANTA CO:413PC/ 28.02.2018	<u>SMRZ:</u> FRANTA	NU SE REÎNNOIEȘTE OMOLOGAREA Certificatul de omologare nr.: 413PC/ 28.02.2018 se retrage cu data de 07.03.2024 fără acordarea unei perioade de grație.	
4.	KORVETTO 5 g/L halauxifen metil + 120 g/L clopiralid	CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL CO:559PC/ 20.11.2019	<u>SMRZ:</u> REPUBLICA CEHĂ	<u>RĂPITA DE TOAMNĂ</u> Buruieni dicotiledonate (<i>Anthemis arvensis</i> , <i>Centaurea cyannus</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Descurainia sophia</i> , <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Matricaria inodore</i> and <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Senecio vulgaris</i>) • 1,0 L/ha Se aplică postemergent o singură	<u>ATENȚIE</u>



				dată/ cultură/ sezon - primăvara de la stadiul de rozetă până când mugurii floralii sunt prezenți dar sunt încă acoperiți de frunze (BBCH 30-50). Buruieni: în primele faze de dezvoltare 2-4 frunze (BBCH 12-14).	
5.	SIMBA/ (FALSTAR - a doua denumire comercială) 100 g/L mezotrionă	HELM AG, GERMANIA CO:334PC/ 28.08.2017	SMRZ: GERMANIA	PORUMB (PENTRU BOABE ȘI SILOZ): Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Echinocoa crus - galli, Poa annua</i>) și Buruieni dicotiledonate anuale: (<i>Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Galium aparine, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Stellaria media, Thlapsi arvense, Veronica persica, Viola arvensis</i>) • 0,75 – 1,0 L/ ha Se aplică postemergent (o singura aplicare). <u>Porumb:</u> Se aplică de la 2 până la maxim 8 frunze (BBCH 12-18). <u>Buruieni dicotiledonate anuale:</u> Se aplică de la 2 până la 4 frunze. <u>Buruieni monocotiledonate anuale:</u> Se aplică de la o frunză până la 3 frunze. PORUMB (PENTRU BOABE ȘI SILOZ): Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Echinocoa crus - galli, Poa annua</i>) și Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Galium aparine, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Stellaria media, Thlapsi arvense, Veronica persica, Viola arvensis</i>) • 0,75 + 0,75 L/ ha Se aplică postemergent (2 aplicări secvențiale la un interval de 14 zile) <u>Porumb:</u> Se aplică de la 2 până la maxim 8 frunze (BBCH 12-18). <u>Buruieni dicotiledonate anuale:</u> Se aplică de la 2 până la 4 frunze. <u>Buruieni monocotiledonate anuale:</u> Se aplică de la o frunză până la 3 frunze.	PERICOL



EXTINDEREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU UTILIZĂRI MINORE (ART.51 - Reg.(CE) nr. 1107 / 2009)

FUNGICIDE

1.	BATALION 450SC/(GLADIUS 450 SC - a doua denumire comercială) 450 g/L pirimetanil	Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia CO:285PC/ 28.02.2017	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	PĂR: <i>Venturia inaequalis</i> • 0,7-1,0 L/ha Se aplică de la începutul înfloritului până la sfârșitul înfloritului (BBCH 55-69). CĂPSUN: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,66 L/ha Se aplică de la începutul înfloritului până la maturitatea fructelor (BBCH 61-87). ZMEUR: <i>Botrytis cinerea, Didymella-applanata</i> • 1,66 L/ha Se aplică la înflorire deplină până la maturitatea fructelor (BBCH 65-87).	ATENȚIE
----	--	--	--	---	----------------

INSECTICIDE

2.	DELMETROS 100 SC/(KORON 100 SC – a doua denumire comercială) 100 g/L deltametrin	Innvigo Sp. Z.o.o., Polonia CO:499PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	VINETE (CÂMP): <i>Leptinotarsa decemlineata, Helicoverpa armigera, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae)</i> • 0,05 L/ha VINETE (SERE): <i>Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Phytomyza sp, Mamestra brassicae, Plusia gamma, Helicoverpa armigera</i> • 0,05 L/ha DOVLECEI (CÂMP): <i>Delia florilega, Delia platura, Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci, Lygus rugulipennis</i> • 0,05 L/ha DOVLECEI (SERE): <i>Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Phytomyza sp, Sciara militaris</i> • 0,05 L/ha TUTUN: <i>Thrips tabaci, Myzus persicae</i> • 0,05 L/ha PLANTE DECORATIVE: <i>Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis,</i>	ATENȚIE
----	--	--	--	--	----------------



				<i>Myzus persicae</i> , <i>Otiorynchus sulcatus</i> , <i>Mamestra brassicae</i> <i>Plusia gamma</i> , <i>Cecidomyia</i> sp, <i>Dasineura</i> sp • 0,05 L/ha	
--	--	--	--	--	--

B. APROBARE A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ (CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013)

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALĂ	A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ	NR. CERTIFICAT DE OMOLOGARE/ DATA	DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII
1	Kupfer Fusilan WG	CUPROPUR	225PC/20.10.2016	Kwizda Agro GmbH, Austria
2	BOLT 250	CORRIB 250	883PC/28.09.2023	Barclay Chemical (R&D) Ltd., Irlanda
3	ROUBAIX	ZINGARO	878PC/28.09.2023	Albaugh TKI d.o.o, Slovenia
4	VitiSan	VITIPROTECT	729PC/07.12.2021	Biofa GmbH, Germania
5	FUDAN 250 SC	BALEDO	875PC/28.09.2023	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd.
6	ORTIVA TOP	SIMPLIA	068PC/21.01.2015	Syngenta Agro SRL, România
7	SHALIMAR 250 EC	ORIUS PRO	821PC/07.12.2022	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
8	COBALT	PROPIDIN MAX	870PC/28.09.2023	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
9	HYCOP 50 WP	CUPRIDIN MAX	885PC/28.09.2023	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
10	READY 100 EC	QUIZOMAX	882PC/28.09.2023	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
11	FORCE EVO	DIASTAR MAXI	598PC/30.06.2020	DIACHEM Sp.A, Italia
12	DITOFLO 700 WG	DIOZINOS 700 WG	881PC/28.09.2023	JT Agro Ltd, Irlanda
13	SARACEN DELTA	FRAGMA DELTA	716PC/09.09.2021	Nufarm GmbH & Co KG, Austria



C. APROBARE PERMISE DE COMERȚ PARALEL (CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013)

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT	NR. PERMIS DE COMERȚ PARALEL (P.C.P.) DENUMIRE COMERCIALĂ PRODUS	CULTURI	AGENȚI DE DĂUNARE	DOZE DE APLICARE
1	RELY 600 SC 200 g/L diflufenican + 400 g/L flufenacet	S.C. AGROVENA S.R.L.	Nr.32/07.03.2024	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Apera spica-venti</i> , <i>Poa annua</i>) și Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Galium aparine</i> , <i>Matricaria spp.</i> , <i>Stelaria media</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Veronica spp.</i>)	0,6 L/ha Se aplică postemergent. <u>Cultura:</u> se aplică de la apariția primei frunze până la începutul înfrățirii (BBCH 10-21). <u>Buruieni:</u> se aplică de la 1-3 frunze (BBCH 10-13).
				TRITICALE DE TOAMNĂ, SECARĂ DE TOAMNĂ	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Apera spica-venti</i> , <i>Poa annua</i>) și Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Galium aparine</i> , <i>Matricaria spp.</i> , <i>Stelaria media</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Veronica spp.</i>)	0,6 L/ha Se aplică postemergent. <u>Cultura:</u> se aplică de la apariția primei frunze până la începutul înfrățirii (BBCH 10-21). <u>Buruieni:</u> se aplică de la 1-3 frunze (BBCH 10-13).
2	BROMO 75 WG 75 g/kg piroxulam + 75 g/kg cloquintocet-mexil(safener)	S.C. AGROVENA S.R.L.	Nr.33/07.03.2024	GRÂU	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Apera spica-venti</i>)	110 g/ha + 0,5 L/ha adjuvant (Dassoil 26-2N) Se aplică de la apariția a 2 frunze desfăcute până la formarea celui de al doilea nod (BBCH 12-32).
					Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Avena fatua</i>) și unele dicotiledonate (<i>Matricaria sp.</i> , <i>Anthemis sp.</i> , <i>Gallium sp.</i> , <i>Capsela sp.</i> , <i>Raphanus sp.</i> , <i>Adonis sp.</i>)	250 g/ha + 0,5 L/ha adjuvant (Dassoil 26-2N) Se aplică de la apariția a 2 frunze desfăcute până la formarea celui de al doilea nod (BBCH 12-32).
3	BRASIC 500 SC 375 g/L	S.C. AGROVENA S.R.L.	Nr.34/07.03.2024	RAPIȚĂ	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate	2,0 L/ha Se aplică preemergent.



	metazaclor + 125 g/L quinmerac					2,0 L/ha Se aplică postemergent timpuriu (BBCH 10-14)
4	ASSIM 12 g/L halauxifen + 280 g/L fluroxipir + 12 g/L cloquintocet mexyl	S.C. AGROVENA S.R.L.	Nr.35/07.03.2024	CEREALE DE PRIMĂVARĂ (GRÂU, GRÂU DURUM, ORZ, SECARĂ)	Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Ambrosia artemisifolia</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Solanum tuberosum</i>)	0,25 - 0,5* L/ha (* în funcție de gradul de infestare)
				CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, GRÂU DURUM, ORZ, SECARĂ, TRITICALE)	Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Ambrosia artemisifolia</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Capsella bursa pastoris</i> , <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Galeopsis tetrahit</i> , <i>Geranium pusillum</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Stellaria media</i>)	0,25 - 0,5* L/ha (* în funcție de gradul de infestare)

2.REGULAMENTE PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE IN PERIOADA 16.11.2023 – 07.03.2024

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2513 al Comisiei din 16 noiembrie 2023 privind **nereînnoirea aprobării substanței active triflusulfuron-metil**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2589 al Comisiei din 21 noiembrie 2023 de **reînnoire a aprobării substanței active sulfat de amoniu și aluminiu**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.
3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2591 al Comisiei din 21 noiembrie 2023 de **reînnoire a aprobării substanței etefon**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2592 al Comisiei din 21 noiembrie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește **prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-naftilacetamidă, acid 1-naftilacetic, 2-fenilfenol (inclusiv sărurile sale cum ar fi sarea de sodiu), 8-hidroxichinolină, amidosulfuron, bifenox, dicamba, difenoconazol, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerat, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamină, fluazifop-P, lenacil, napropamid, nicosulfuron, uleiuri parafinice, ulei de parafină, penconazol, picloram, prohexadion, spiroxamină, sulf, tetraconazol și trialat**.
5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2657 al Comisiei din 6 noiembrie 2023 privind **nereînnoirea aprobării substanței active bentiavalicarb**, în conformitate cu Regulamentul (CE)



nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2660 al Comisiei din 28 noiembrie 2023 de **reînnoire a aprobării substanței active glifosat**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

7. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1755 al Comisiei din 11 septembrie 2023 de **reînnoire a aprobării substanței active cu risc mic reziduuri de la distilarea grăsimilor**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 224, 12.9.2023).

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/20 al Comisiei din 12 decembrie 2023 privind **reînnoirea aprobării substanței active S-metolaclor**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

9. Regulamentul (UE) 2024/246 al Comisiei din 16 ianuarie 2024 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **Pythium oligandrum tulpina M1, Trichoderma atroviride tulpina AGR2 și Trichoderma atroviride tulpina AT10**.

10. Regulamentul (UE) 2024/331 al Comisiei din 19 ianuarie 2024 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime de reziduuri pentru oxamil din sau de pe anumite produse**.

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/324 al Comisiei din 19 ianuarie 2024 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește **prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active benzovindiflupir, bromuconazol, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, fluopiram, flutolanil, lambda-cihalotrin, mecoprop-P, mepiquat, metsulfuron-metil, fosfan și piraclostrobin**.

12. Regulamentul (UE) 2024/341 al Comisiei din 22 ianuarie 2024 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime de reziduuri pentru dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol și pencicuron din sau de pe anumite produse**.

13. Regulamentul (UE) 2024/342 al Comisiei din 22 ianuarie 2024 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor ciflumetofen, oxatiapiprolin și piraclostrobin din sau de pe anumite produse**.

14. Regulamentul (UE) 2024/344 al Comisiei din 22 ianuarie 2024 de modificare și rectificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime pentru reziduurile de mandipropamid din sau de pe anumite produse**.

15. Regulamentul (UE) 2024/345 al Comisiei din 22 ianuarie 2024 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime de reziduuri pentru desmedifam, etridiazol, flurtamon, profoxidim, difenacum și permanganat de potasiu din sau de pe anumite produse**.

16. Regulamentul (UE) 2024/347 al Comisiei din 22 ianuarie 2024 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime de reziduuri pentru fipronil din sau de pe anumite produse**.

17. Regulamentul (UE) 2024/352 al Comisiei din 22 ianuarie 2024 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime de reziduuri pentru acetat de (Z)-13-hexadecen-11-in-1-il, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il, acrinatrin, azimsulfuron, famoxadon, procloraz și hipoclorit de sodiu din sau de pe anumite produse**.



18. Regulamentul (UE) 2024/376 al Comisiei din 24 ianuarie 2024 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime pentru reziduurile de indoxacarb din sau de pe anumite produse.**

19. Regulamentul (UE) 2024/398 al Comisiei din 29 ianuarie 2024 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime pentru reziduurile de haloxifop din sau de pe anumite produse.**

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/425 al Comisiei din 2 februarie 2024 privind **neaprobarea substanței active asulam-sodiu**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

21. Regulamentul (UE) 2024/451 al Comisiei din 5 februarie 2024 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime pentru reziduurile de nicotină din sau de pe anumite produse.**

22. Rectificare la Regulamentul (UE) 2024/344 al Comisiei din 22 ianuarie 2024 de modificare și rectificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește **limitele maxime pentru reziduurile de mandipropamid din sau de pe anumite produse.**

3. DIVERSE

1. CNOPPP a respins solicitarea asociației **AIPROM**, privind asumarea de către România a rolului de stat membru raportor zonal pentru autorizarea produselor de protecție a plantelor.

2. CNOPPP a respins solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL**, privind asumarea de către România a rolului de stat membru raportor zonal pentru autorizarea unui produs de protecție a plantelor.

3. CNOPPP a respins solicitarea companiei **Barclay Chemicals Ltd**, privind acordarea unei perioade de grație pentru epuizarea stocurilor de produs ca urmare a aprobării unui nou GAP.

4. Ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/20 al Comisiei din 12 decembrie 2023 privind nereînnoirea aprobării substanței active **S-metolaclor**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei, pentru produsele de protecție a plantelor :

- **ALOHA/(ANACONDA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 408PC/28.02.2018);
- **BASAR/(HEKTOR - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 483PC/14.03.2019);
- **CAMIX** (certificat de omologare nr. 027PC/17.12.2013);
- **DEFLEXO MIX/(INFINOR MIX - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 630PC/30.06.2020);
- **DEFLEXO ULTRA** (certificat de omologare nr. 629PC/30.06.2020);
- **DELUGE 960 EC/(ATOL - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 665PC/24.11.2020);
- **DUAL GOLD 960 EC/(TENDER - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 1854/29.09.1998);
- **GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC/(SILBA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2158/11.10.2002);
- **KABALA 960 EC** (certificat de omologare nr. 783PC/23.08.2022);
- **LS S-METO** (certificat de omologare nr. 845PC/25.04.2023);
- **LUMAX 537,5 SE/(LUMISTO - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2595/14.12.2005);
- **LUMAX H** (certificat de omologare nr. 293PC/28.02.2017);
- **MESIMET** (certificat de omologare nr. 901PC/17.11.2023);



- **METOS 960 EC** (certificat de omologare nr. 700PC/09.09.2021);
- **TOTAL 960 EC/ (METEOR - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 575PC/20.11.2019);
- **STRIM** (certificat de omologare nr. 915PC/07.03.2024);
- **DON** (certificat de omologare nr. 916PC/07.03.2024);
- **GRAND TOTAL** (certificat de omologare nr. 915PC/07.03.2024);
- **EFICA 960 EC (permis de comerț paralel nr. 6/15.11.2018);**
- **METOLLAC 960 (permis de comerț paralel nr. 21/07.12.2022);**

certIFICATELE de omologare și permisele de comerț paralel se retrag de la data de **23.04.2024** și se acordă o perioadă de grație de **3 luni** doar pentru depozitarea, utilizarea și eliminarea stocurilor de produs la utilizatori (până la data de **23.07.2024**).

5. Ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/2657 al Comisiei din 6 noiembrie 2023 privind nereînnoirea aprobării substanței active **bentiavalicarb**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei, pentru produsele de protecție a plantelor **VINCARE 51,7 WG** (certificat de omologare nr. 023PC/17.12.2013), respectiv **ZORVEC ENDAVIA** (certificat de omologare nr. 642PC/24.11.2020), **certificatele de omologare** se retrag de la data de **13.06.2024** și se acordă o perioadă de grație de **3 luni** pentru **comercializare și distribuire** (până la data de **13.09.2024**), la care se adaugă o perioadă de grație de **3 luni** pentru **depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori** (până la data de **13.12.2024**).

6. Ca urmare a nesușinerii, conform art.43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, a produsului de protecție a plantelor **VERSUS EXTRA**, de către deținătorul omologării, certificatul de omologare nr. **091PC/ 21.01.2015**) se retrage de la data de **01.09.2024**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de **6 luni** pentru **comercializare și distribuire** (până la data de **01.03.2025**), la care se adaugă o perioadă de grație de **12 luni** pentru **depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori** (până la data de **01.03.2026**).

7. La solicitarea deținătorului omologării, ca urmare a nesușinerii omologării produsului de protecție a plantelor **STABILAN**, certificatul de omologare nr. **375/27.12.1974** se va retrage cu data ședinței CNOPPP și se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de **6 luni** pentru **comercializare și distribuire** (până la data de **07.09.2024**), la care se adaugă o perioadă de grație de **12 luni** pentru **depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori** (până la data de **07.09.2025**).

8. La solicitarea deținătorului omologării, ca urmare a nesușinerii omologării produsului de protecție a plantelor **ARKEM (a doua denumire comercială a produsului LAREN PRO 20 SG)**, certificatul de omologare nr. **2604/14.12.2005** se va retrage cu data ședinței CNOPPP fără acordarea unei perioade de grație.

9. La solicitarea deținătorului omologării, ca urmare a nesușinerii omologării produsului de protecție a plantelor **MISTRAL 240 SC (a doua denumire comercială a produsului INNOVATE 240 SC)**, certificatul de omologare nr. **2773/27.03.2008** se va retrage cu data ședinței CNOPPP fără acordarea unei perioade de grație.

10. CNOPPP a aprobat solicitările **ADAMA Agricultural Solutions SRL**, privind modificarea dozei de aplicare sub formă de interval, pentru produsul de protecție a plantelor **LEANDER 750 EC** (certificat de omologare nr. 2717/25.10.2007), pentru culturile omologate de **grâu, triticale și secară**



doar pentru combaterea agentului de dăunare *Blumeria graminis* sin. *Erysiphe graminis*) de la 0,75 L/ha la 0,5 - 0,75 L/ha precum și modificarea timpului de pauză de la 42 zile la 35 zile.

11.CNOPPP a aprobat solicitarea **SYNGENTA AGRO SRL**, privind extinderea spectrului de buruieni combătute în cultura de **rapiță de toamnă** pentru produsul de protecție a plantelor **TERIDOX 500 EC** (certificat de omologare nr. 2768/27.03.2008, conform tabelului de mai jos:

Cultura	Agentul dăunător	Aplicare	Doza L/ha
Rapiță de toamnă	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Apera</i> sp. <i>Lolium rigidum</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> *, samulastră de cereale) și buruieni dicotiledonate anuale (<i>Anagallis</i> spp., <i>Anthemis arvensis</i> , <i>Atriplex patula</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Cardamine hirsuta</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Cerastium glomeratum</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Fumaria</i> sp., <i>Galeopsis</i> sp, <i>Geranium</i> sp., <i>Lamium</i> sp., <i>Lapsana communis</i> , <i>Mercurialis annua</i> , <i>Myosotis arvensis</i> , <i>Rumex</i> sp., <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Sonchus</i> sp., <i>Torilis arvensis</i> , <i>Taraxacum officinale</i> , <i>Papaver</i> sp.*, <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Thlaspi arvensis</i> *) *Specii moderat sensibile	Preemergent , de la sămânță până la apariția cotiledoanelor (BBCH 00-09) sau Postemergent, de la apariția cotiledoanelor până la stadiul de 6 frunze (BBCH 10-16). În cazul buruienilor, se aplică înainte de răsărire sau imediat după aceea. Produsul se va aplica o dată la 3 ani pe același teren.	2,0

12.La solicitările companiei **ARYSTA LIFESCENCE SAS, FRANTA**, CNOPPP a aprobat retragerea produselor de protecție a plantelor **COSMIC** (certificat de omologare nr. 2088/ 19.12.2000) și **OXALIS** (certificat de omologare nr. 2237/ 15.12.2003) cu data **ședinței CNOPPP** fără acordarea unei perioade de grație.

13.CNOPPP a luat notă de modificarea adresei companiei **Adama Agricultural Solutions SRL Romania**.

14.CNOPPP a luat notă de modificarea adresei companiei **SPARTA RESEARCH LTD**.

15.CNOPPP a aprobat schimbarea numelui deținătorului de omologare și producătorului **Mitsui Chemicals Agro, Inc.** în **Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc** pentru produsul de protecție a plantelor **TACHIGAREN 70 WP** (certificat de omologare nr. 491/30.07.1976).

16.CNOPPP a luat notă de schimbarea denumirii producătorului din **Mitsui Chemicals Agro, Inc** în **Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc.**, pentru substanța activă **etofenprox** aflată în compoziția produsului de protecție a plantelor **TREBON 30 EC** (certificat de omologare nr. 2738/ 19.12.2007).

17.CNOPPP a luat notă de schimbarea adresei deținătorului de omologare a produsului de protecție a plantelor **URANSER** (certificat de omologare nr. 849PC/ 25.04.2023), compania **SERVALESA S.L.U, SPANIA**.

18.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **BASF SE, GERMANIA**, privind corectarea denumirii fabricii de fermentație și actualizarea informațiilor privind codul poștal din adresa locației post formulare pentru substanța activă *Bacillus amyloliquefaciens*, tulpina **MBI600** aflată în



compoziția produselor de protecție a plantelor **INTEGRAL PRO** (certificat de omologare nr. 437PC/ 15.11.2018) și **SERIFEL** (certificat de omologare nr. 853PC/ 25.04.2023).

19.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **BAYER SRL, ROMANIA**, privind modificarea numelui sursei de producție din **Lonza AG** în **Arxada AG** pentru substanțele active foramsulfuron, foramsulfuron sodiu, iodosulfuron-metil-sodiu și amidosulfuron din compoziția unor produse de protecție a plantelor.

3a. SCHIMBARE DENUMIRI COMERCIALE

20. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **CAC Chemical GmbH, Germania**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **PROMINO 300EC** (a doua denumire comercială a produsului **ERA**) (certificat de omologare nr. 721PC/07.12.2021) în **KOLERON**.

21.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **JT Agro Ltd, Irlanda**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **MULAN 700 WG** (certificat de omologare nr. 881PC/28.09.2023) în **DITOFLO 700 WG**.

22. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **SHIP 75 WG** (certificat de omologare nr. 217PC/20.10.2026) în **COMOD SUPER 75 WG**.

23.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **SYNGENTA AGRO SRL, ROMÂNIA**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **INDAVIUS** (a doua denumire comercială a produsului **ELATUS ERA**) (certificat de omologare nr. 342PC/ 29.11.2017) în **APROVIA**.

24.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Corteva Agriscience România SRL**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **ZORVEC VINTERA** (a doua denumire comercială a produsului **ZORVEC VINABEL**) (certificat de omologare nr. 807PC/ 07.12.2022) în **ZORVEC VINATREL**.

25.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Irlanda**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **COSMIC NEO** (certificat de omologare nr. 695PC/ 22.04.2021) în **TARTAN 360**.

26.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **DIFECOL** (certificat de omologare nr. 880PC/ 28.09.2023) în **DIFESTAR**.

3b. SCRISORI DE REPREZENTARE

27.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Life Scientific Ltd, Irlanda**, privind desemnarea companiei **AGRICONNECT SRL, București, România**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a 10 produse de protecție a plantelor.

28.CNOPPP a luat notă de informările companiei **Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Irlanda**, privind desemnarea companiei **AGRICONNECT SRL, București, România**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor **Cosmic Neo/(Clean Up Gold** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 695PC/22.04.2021), **Barclay Gallup Hi-Aktiv/ (TRUSTEE HI-AKTIV** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.029PC/17.12.2013), **DARBY** (certificat de omologare nr.799PC/23.08.2023), **BOLT 250** (certificat de omologare nr.883PC/28.09.2023), **KINVARA/(ARRVA** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr.560PC/20.11.2019), **Gallup Super 360/(Barbarian Super 360** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.270PC/19.12.2016).

29.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **DIACHEM S.p.A**, privind desemnarea companiei **Agrisolv Waste SRL**, prin domnul **Eduard Vissarion** pentru reprezentare în procesul de omologare și comunicarea cu autoritățile române implicate pentru produsul de protecție a plantelor **FORCE EVO**, omologat cu certificatul de omologare nr. 598PC/30.06.2020.



30.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **2022 Environmental Science FR SAS**, privind desemnarea companiei **ERM Ltd (Environmental Resources Management Limited)** și a birourilor sale afiliate pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

31.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Syngenta Agro SRL**, privind desemnarea d-**Andreea Mitan** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

32.CNOPPP a luat notă de informările companiei **Corteva Agriscience România SRL**, privind desemnarea doamnelor **Pascariu Ana Maria** și **Bondoc Vica**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

33.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Nichino Europe CO**, privind desemnarea companiei **SC KWIZDA Agro Romania**, pentru reprezentare în procesul de omologare și comunicarea cu autoritățile române implicate pentru produsul de protecție a plantelor **ORTUS 5SC**, omologat cu certificatul de omologare nr. 1331/03.07.1992.

34.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Summit Agro România SRL**, privind desemnarea domnului **Ciprian Păcuraru** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

35.CNOPPP a luat notă de informarea grupului de companii **ROVENSA NEXT (TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.U., SDP Franța, ORO AGRI EUROPE SA, Portugalia, IDAI NATURE, Spania)**, privind desemnarea doamnei **Andreea Irina Ion Zamfirescu**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

36.CNOPPP a luat notă de informarea **SC CROPTech SRL** privind desemnarea domnului **ROIBAN Călin George** pentru reprezentare, în relația cu autoritățile române în procesul de obținere a permiselor de comerț paralel.

3c. NOTIFICĂRI TRANSFER PRODUSE

37. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, următoarele produse de protecție a plantelor vor fi transferate de la deținătorul de omologare actual **UPL Europe Ltd, UK**, către noul deținător de omologare **UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda**:

Nr.crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare
1.	MICROTHIOL SPECIAL/(MICROTHIOL JETT – a doua denumire comercială)	182/30.10.1974
2.	AGROXIN	1754/05.09.1996
3.	AGROXIN PELLETS	122PC/22.07.2015
4.	BETASANA SC	692PC/22.04.2021
5.	OBLIX 500 SC	694PC/22.04.2021
6.	XANADU/(PHYTON - a doua denumire comercială)	543PC/12.07.2019
7.	BETTIX WG	233PC/20.10.2016
8.	CHAMANE	357PC/29.11.2017
9.	FINY	102PC/21.01.2015
10.	OVIPRON TOP/(VERNOIL - a doua denumire comercială)	167PC/16.03.2016



38. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, produsul de protecție a plantelor **SAFECAP WG** (certificat de omologare nr. 119PC/22.07.2015) va fi transferat de la deținătorul de omologare actual **UPL Agricultural Solutions România SRL**, către deținătorul de omologare **UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda**.

39. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, următoarele produse de protecție a plantelor se vor transfera de la deținătorul de omologare actual **United Phosphorus Ltd., UK**, către noul deținător de omologare **UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda**:

Nr.crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare
1.	DEVIRINOL 45 F	1563/30.01.1995
2.	QUICKPHOS-UP	1852/29.09.1998

40. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, produsele de protecție a plantelor **BOUILLIE BORDELAISE WDG/(BORDOMIX - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2124/18.12.2001), se vor transfera de la deținătorul de omologare actual **CEREXAGRI, Franța** către noul deținător de omologare **UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda**.

41. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, produsul de protecție a plantelor **LONDAX 60 DF** (certificat de omologare nr. 1161/03.11.1989), se va transfera de la deținătorul de omologare actual **Cequisa, Spania**, către noul deținător de omologare **UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda**.

42. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, următoarele produse de protecție a plantelor se vor transfera de la deținătorul de omologare actual **Arysta LifeScience SAS, Franța**, către noul deținător de omologare **UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda**:

Nr.crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare
1.	CAPTAN 80 WDG/(CAPTADIN - a doua denumire comercială)	2664/19.12.2006
2.	CARPOVIRUSINE	2792/14.08.2008
3.	EVITO T	593PC/30.06.2020
4.	SELECT SUPER/(CENTURION PLUS - a doua denumire comercială)	1817/29.01.1998

43. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, produsul de protecție a plantelor **ARGOS** (certificat de omologare nr. 683PC/22.04.2021), se transferă de la deținătorul de omologare actual **Arysta LifeScience România** către noul deținător de omologare **UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda**.

44. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions SRL, România**, următoarele produse de protecție a plantelor se vor transfera de la deținătorul de omologare actual **Arysta LifeScience Benelux Sprl, Belgia** către noul deținător de omologare **UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda**:

Nr.crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare
---------	-----------------	-------------------------------



1.	DELTAGRI/(FASTER DELTA - a doua denumire comercială)	439PC/15.11.2018
2.	METRIPHAR 70 WG	2020/26.10.1999
3.	PROPLANT 72,2 SL	1825/19.05.1998
4.	PYRUS 400 SC/(PAPYRUS 400 SC - a doua denumire comercială)	2534/21.04.2005
5.	CLIOPHAR 600 SL	443PC/15.11.2018
6.	CYPERGUARD MAX/(FASTER MAGNUM - a doua denumire comercială)	571PC/20.11.2019
7.	PAKET 250 EC	349PC/29.11.2017
8.	PROXANIL/(COMBI DUO FORTE- a doua denumire comercială)	423PC/05.06.2018
10.	SPIROX D/(LINKIT - a doua denumire comercială)	515PC/12.07.2019
11.	SYLLIT 400 SC	2154/11.10.2002
12.	ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 - a doua denumire comercială)	562PC/20.11.2019

45. La solicitarea companiei **ADAMA Agricultural Solutions SRL, România**, următoarele produse de protecție a plantelor se vor transfera de la deținătorii de omologare actuali **ADAMA Agricultural Solutions Ltd. Israel, ADAMA Agriculture BV, Olanda, ADAMA Deutschland GmbH, Germania**, către noul deținător de omologare **ADAMA Agricultural Solutions SRL, România**:

Nr.crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare
1.	LEOPARD 5 EC/(ERBISTAR – a doua denumire comercială)	1874/15.12.1998
2.	SULTAN 50 SC/(MAGISTRAL 50 SC – a doua denumire comercială)	2159/11.10.2002
3.	AGIL 100 EC/(ZETROLA – a doua denumire comercială)	1345/16.11.1992
4.	LEANDER 750 EC	2717/25.10.2007
5.	NICOGAN 40 OD/(RADIAL – a doua denumire comercială)	2605/14.12.2005
6.	CUSTODIA 320 SC/(SALVATOR MAX - a doua denumire comercială)	259PC/19.12.2016
7.	MERPAN 80 WDG/(FLO-CAPTAN – a doua denumire comercială)	1891/17.02.1999
8.	SULTAN COMPLET/(BENGALA – a doua denumire comercială)	378PC/29.11.2017
9.	BREVIS	577PC/20.11.2019
10.	POWERTWIN SC	2193/12.03.2003



11.	TORNADO SC	2182/16.12.2002
-----	-------------------	-----------------

3d. NOTIFICĂRI LOCAȚII DE FORMULARE

- 46.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsele **DIPIRIL/ (DEIRA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 627PC/ 30.06.2020).
- 47.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Nufarm Romania, SRL**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsele **IKANOS/ (UBIKA- a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 442PC/ 15.11.2018).
- 48.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **UPL Europe Ltd., Marea Britanie**, privind adăugarea unor noi locații de formulare pentru produsele **OVIPRON TOP/ (VERNOIL - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 167PC/ 16.03.2016).
- 49.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **SERVALESA S.L.U, SPANIA**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **URANSER** (certificat de omologare nr. 849PC/ 25.04.2023).
- 50.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **ADAMA AGRICULTURAL SOLUTION**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **LEANDER 750 EC** (certificat de omologare nr. 2717/ 25.10.2007).
- 51.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BIOCHEM SRL, ROMANIA**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsele **ALOHA/ (ANACONDA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 408PC/ 28.02.2018), **ARMADA** (certificat de omologare nr. 359PC/ 29.11.2017) și **STARLIGHT/ (STARLORD - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 414PC/ 28.02.2018).
- 52.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **CYCLO-R LIQUIDO** (certificat de omologare nr. 305PC/ 10.04.2017).
- 53.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **NUFARM GmbH&Co.KG,AUSTRIA**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **DICOPUR M** (certificat de omologare nr. 1782/ 13.03.1997).
- 54.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BARCLAY CHEMICALS R&D Ltd., IRLANDA**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **BOLT 250** (certificat de omologare nr. 883PC/ 28.09.2023).
- 55.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsele **AGRO - GLYFO/ (GLYPHO - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 179PC/ 16.03.2016).
- 56.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **FMC Agro Operational Romania SRL**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **INNOVATE 240 SC** (certificat de omologare nr. 2773/ 27.03.2008).
- 57.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **PRETIL** (certificat de omologare nr. 769PC/ 23.08.2022).

3e. MODIFICĂRI MAJORE:-

3f. MODIFICĂRI MINORE:

- 58.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **LASER 240 SC/ (NEXSUBA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2155/ 11.10.2002);



- 59.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **DELMETROS 100 SC/ (KORON 100 SC-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 499PC/ 14.03.2019) ;
- 60.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **METKON 100 SL** (certificat de omologare nr. 654PC/ 24.11.2020);
- 61.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **YOU Solutions Germany GmbH, Germania**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **AXCELA** (certificat de omologare nr. 201PC/ 03.06.2016) și **SLIMAX** (certificat de omologare nr. 464PC/ 15.11.2018) ;
- 62.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **BOXER 800 EC/ (DEFY-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2787/ 26.06.2008) ;
- 63.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **ARCADE** (certificat de omologare nr. 022PC/ 11.07.2013) ;
- 64.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **FORCE 20 CS** (certificat de omologare nr. 2278/ 12.08.2004) ;
- 65.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **AUSTRAL PLUS/ (CELEST PLUS -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2828/ 30.04.2009).
- 66.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BAYER SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **DECIS EXPERT 100 EC** (certificat de omologare nr. 123PC/ 22.07.2015).
- 67.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Ciech Sarzyna SA, Polonia**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **TARCZA LAN EXTRA 250 EW** (certificat de omologare nr. 395PC/ 28.02.2018).
- 68.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **UPL Europe Ltd., Marea Britanie**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **OVIPRON TOP/ (VERNOIL -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 167PC/ 16.03.2016).
- 69.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **AXIAL ONE/ (DUOZYM-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2852/ 17.12.2009).
- 70.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS, FRANTA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **INTUITY** (certificat de omologare nr. 480PC/ 14.03.2019).
- 71.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BASF SE, GERMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **SICARIS / (LASONA -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 851PC/ 25.04.2023).
- 72.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BASF SE, GERMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **PRIAXOR EC/ (IMPERIS ULTRA -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 273PC/ 28.02.2017).
- 73.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BASF SE, GERMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **INOVOR/ (MIZONA -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 671PC/ 22.04.2021).
- 74.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BASF SE, GERMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **REVYSTAR XL** (certificat de omologare nr. 637PC/ 24.11.2020).
- 75.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **MODDUS 250 EC** (certificat de omologare nr. 2532/ 22.02.2005).
- 76.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **MODDUS EVO** (certificat de omologare nr. 192PC/ 03.06.2016).
- 77.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **AMISTAR GOLD** (certificat de omologare nr. 424PC/ 05.06.2018).



- 78.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **ORTIVA TOP** (certificat de omologare nr. 068PC/ 21.01.2015).
- 79.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Certis Belchim BV, Olanda**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **TREBON 30 EC** (certificat de omologare nr. 2738/ 19.12.2007).
- 80.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **NISSAN CHEMICAL EUROPE SAS, FRANTA**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **SANMITE 10 SC/ (NEXTER-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 211PC/ 20.10.2016).
- 81.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BASF SE, GERMANIA**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **REVCARE** (certificat de omologare nr. 639PC/ 24.11.2020).
- 82.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA** privind o modificare minoră în compoziția produselor **AMISTAR/ (MIRADOR 250 SC -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 1811/ 04.12.1997).
- 83.CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Diachem S.p.A.**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **FORCE EVO** (certificat de omologare nr. 598PC/ 30.06.2020).

3g. SURSE DE SUBSTANȚE ACTIVE

- 84.La solicitarea companiei **HELM AG, GERMANIA**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **quinalofop-p-etil** aflată în compoziția produsului **DIGATOR/(GHEPARD FORTE –** a doua denumire comercială) (certificat de omologare 664PC/24.11.2020).
- 85.La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **trinexapac-etil** aflată în compoziția produselor **REGULLO 500 EC/ (TREGUS 500 EC -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 546PC/ 12.07.2019).
- 86.La solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **oxyfluorfen** aflată în compoziția produselor **DIPIRIL/ (DEIRA -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 627PC/ 30.06.2020).
- 87.La solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **folpet** și două surse adiționale pentru substanța activă **fosetil de aluminiu** aflate în compoziția produselor **MAGMA TRIPLE/ (AFRASA TRIPLE WP -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 355PC/ 29.11.2017) și **MAGMA TRIPLE WG/ (ALLEATO TRIPLE WG -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 482PC/ 14.03.2019).
- 88.La solicitarea companiei **Ciech Sarzyna SA, Polonia**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **tebuconazol** aflată în compoziția produsului **TARCZA LAN EXTRA 250 EW** (certificat de omologare nr. 395PC/ 28.02.2018).
- 89.La solicitarea companiei **Ciech Sarzyna SA, Polonia**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produsului **AZOKSAR 250 SC** (certificat de omologare nr. 565PC/ 20.11.2019).
- 90.La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produselor **PROTIKON 250 EC/ (VIRID 250EC -** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 789PC/ 23.08.2022).
- 91.La solicitarea companiei **SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS, FRANTA**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **mandestrobin** aflată în compoziția produsului **INTUITY** (certificat de omologare nr. 480PC/ 14.03.2019).
- 92.La solicitarea companiei **SERVALESA S.L.U, SPANIA**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **fosfonati de potasiu** aflată în compoziția produsului **URANSER** (certificat de omologare nr. 849PC/ 25.04.2023).
- 93.La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **proquinazid** aflată în compoziția produselor **VERBEN** (certificat de omologare nr. 723PC/ 07.12.2021), **TALENDO/ (TALIUS -** a doua denumire



comercială) (certificat de omologare nr. 2582/ 14.12.2005) și **TALENDO EXTRA** (certificat de omologare nr. 197PC/ 03.06.2016).

94. La solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **hidroxid de cupru** aflată în compoziția produsului **CYCLO-R LIQUIDO** (certificat de omologare nr. 305PC/ 10.04.2017).

95. La solicitarea companiei **BARCLAY CHEMICALS R&D Ltd., IRLANDA**, CNOPPP a aprobat trei surse adiționale pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produsului **BOLT 250** (certificat de omologare nr. 883PC/ 28.09.2023).

96. La solicitarea companiei **Life Scientific Ltd., Irlanda**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **tebuconazol** aflată în compoziția produsului **LS PROTHIO-TEBUC** (certificat de omologare nr. 767PC/ 23.08.2022).

97. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL, Romania**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **flufenacet** aflată în compoziția produselor **MERKUR** (certificat de omologare nr. 797PC/ 23.08.2022) și **CHROME/ (TROZANO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 863PC/ 25.04.2023).

98. La solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **pirimetanil** aflată în compoziția produsului **PRETIL** (certificat de omologare nr. 769PC/ 23.08.2022).

99. La solicitarea companiei **ISK Biosciences Europe N.V., Belgia**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **ciazofamid** aflată în compoziția produsului **RANMAN TOP/ (KARITSU** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 105PC/ 22.07.2015).

100. La solicitarea companiei **NUFARM GmbH&Co.KG, AUSTRIA**, CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **MCPA din sare de dimetilamină** aflată în compoziția produsului **DICOPUR M** (certificat de omologare nr. 1782/ 13.03.1997).

3h. AMBALAJE ADIȚIONALE:

101. La solicitarea companiei **JT Agro Ltd., CNOPPP** a aprobat ambalaje adiționale, pentru produsele **ALAKAZAM 500 WG/ (VELMERI 500 WG-** a doua denumire comercială) omologat cu certificatul de omologare nr.810 PC/07.12.2022, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
CAPACITATE	MATERIAL	TIP	CAPACITATE	MATERIAL	TIP
250 mL, 500 mL, 1L ,2L ,3L	HDPE, COEX	-	1,5g, 15g, 150g	Folie hartie + Aluminiu + PE	plic

102. La solicitarea companiei **EVERGREEN Garden Care, Polonia**, pentru produsul **ANTIBURUIENI**, omologat cu certificatul de omologare nr.801PC/23.08.2022, CNOPPP a aprobat capace noi pentru ambalajele omologate de 3000 mL, 5000 mL și sisteme de pulverizare adiționale pentru ambalajele omologate de 1000 mL, 1200mL.

103. La solicitarea companiei **CAC CHEMICAL GmbH, GERMANIA**, CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale, pentru produsul **ERA/(PROMINO 300 EC** - a doua denumire comercială) omologat cu certificatul de omologare nr. 721PC/07.12.2021, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,5 L	HDPE/PA	Bottle	0,5 L	F-HDPE	Bottle
1,0 L	HDPE/PA	Bottle	1 L	F-HDPE. COEX/EVOH	Bottle



2,0 L	HDPE/PA	Container	2,0 L	F-HDPE	Container
3,0 L	HDPE/PA	Container	3,0 L	HDPE/F, COEX/EVOH	Container
5,0 L	HDPE/PA	Container	5 L	F-HDPE	Container
10,0 L	HDPE/PA	Container	10 L	F-HDPE	Container
20,0 L	HDPE/PA	Container	20 L	F-HDPE	Container

PREȘEDINTE

Paulina GABOR

