

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 07.12.2022

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ (art.33-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)					
FUNGICIDE					
1.	XILON 1% w/w (min. 1x10 ⁷ cfu/g) <i>Trichoderma asperellum</i> tulpina T34	Kwizda Agro GmbH, Austria CO:595PC/30.06.2020	<u>SMRZ:</u> Republica Cehă	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>RAPITĂ:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 10 kg/ha Se aplică odată cu semănatul (prin încorporarea granulelor) sau pulverizarea soluției pe sol, urmată de încorporare în sol, înaintea semănatului	<u>ATENȚIE</u>
2.	PROPULSE 250 SE 125 g/L fluopiram + 125 g/L protioconazol	Bayer SRL CO:041PC/27.02.2014	<u>SMRZ:</u> Germania	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>CARTOF:</u> <i>Alternaria</i> spp • 0,3-0,5 L/ha Se aplică de la începutul formării tuberculilor până când fructele de pe a 2-a fructificație sunt încă verzi (BBCH 40-89)	<u>ATENȚIE</u>
3.	BRAVE DUO 400 g/L propamocarb - clorhidrat + 50 g/L cimoxanil	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd CO:805PC/07.12.2022	<u>SMRZ:</u> România	<u>CARTOF:</u> <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 L/ha Se aplică de la apariția primului lăstar (> 5 cm) până când 50 % din frunze au culoarea maronie (BBCH 20-95)	<u>ATENȚIE</u>
4.	PICTOR ACTIVE 150 g/L boscalid + 250 g/L piraclostrobin	BASF SE, Germania CO:640PC/24.11.2020	<u>SMRZ:</u> Republica Cehă	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>MAZĂRE BOABE :</u> <i>Ascochyta</i> spp., <i>Erysiphe pisi</i> , <i>Uromyces pisi</i> • 0,6-1,0 L/ha	<u>ATENȚIE</u>



				sau tratament secvențial: 2 x 0,5 L/ha LUPIN, NAUT, LINTE : <i>Ascochyta</i> spp • 0,6-1,0 L/ha sau tratament secvențial: 2 x 0,5 L/ha	
5.	ULTRALEGEND 125 g/L protioconazol + 125 g/L tebuconazol	JT Agro Ltd., Irlanda CO:806PC/07.12.2022	SMRZ: România	GRĂU: <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Helminthosporium</i> spp. • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). <i>Fusarium</i> spp. • 0,9 L/ha Se aplică în timpul înfloririi (BBCH 61-69). ORZ: <i>Erysiphe graminis</i> f. sp. <i>hordei</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Pyrenophora teres</i> (sin. <i>Drechslera teres</i>) <i>Helminthosporium sativum</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). PORUMB: <i>Fusarium</i> spp. • 1,0 L/ha Se aplică în timpul înfloririi (BBCH 61-69).	ATENȚIE
6.	ZORVEC VINABEL 40 g/L oxatiapiprolin + 300 g/L zoxamid	Corteva Agriscience România SRL CO:807PC/07.12.2022	SMRZ: Austria	VITA DE VIE (STRUGURI PENTRU VIN ȘI PENTRU MASĂ): <i>Plasmopara viticola</i> • 0,5-0,6 L/ha Se aplică preventiv din faza de 5 frunze până când majoritatea boabelor sunt formate și se ating între ele (BBCH 15-79).	ATENȚIE
7.	TACHIGAREN LS 440 g/L himexazol	Mitsui Chemical Europe GmbH, Germania	iSMRZ: Finlanda	NU SE OMOLOGHEAZA	
8.	HADES 250 EW 250 g/L tebuconazol	Pestila Sp.z.o.o, Polonia CO:808PC/07.12.2022	SMRZ: România	VITA DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,4 L/ha Se aplică de la faza de trei frunze până la începutul colorării boabelor (BBCH 13 – 81). MĂR: <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Venturia inaequalis</i> • 0,6 L/ha	PERICOL



				Se aplică la avertizare, după scuturarea petalelor până la maturitatea fructelor (BBCH 69-89). CIREȘ: <i>Monilinia spp.</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la deschiderea sealelor până în faza de coacere a fructelor (BBCH 53-85). PRUN: <i>Monilinia spp.</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la deschiderea sealelor până în faza de coacere a fructelor (BBCH 53-85). RAPIȚA DE TOAMNĂ: <i>Erysiphe communis, Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică primăvara, de la alungirea tulpinilor până la înflorit (BBCH 30-55). Creșterea rezistenței plantelor la iernare, Phoma lingam • 0,5 L/ha Se aplică toamna, în faza de 4-6 frunze (BBCH 14-16).	
--	--	--	--	---	--

INSECTICIDE

1.					ATENȚIE
	FANCY 20 CS 200 g/L teflutrin	Sharda Cropchem Espana SL, Spania CO:809PC/07.12.2022	SMRZ: România	GRĂU: <i>Agriotes spp., Zabrus tenebrioides</i> • 1,0 L/t semințe ORZ: <i>Agriotes spp., Zabrus tenebrioides</i> • 1,0 L/t semințe PORUMB: <i>Agriotes spp., Diabrotica virgifera virgifera</i> • 50 mL/50.000 semințe SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Agriotes spp.</i> • 60 mL/100.000 semințe OVĂZ: <i>Delia coarctata, Agriotes spp., Zabrus tenebrioides</i> • 1,0 L/t semințe TRITICALE: <i>Delia coarctata, Agriotes spp., Zabrus tenebrioides</i> • 1,0 L/t semințe GRĂU SPELTĂ: <i>Delia coarctata</i> • 1,0 L/t semințe SECARĂ: <i>Delia coarctata</i>	



				• 1,0 L/t semințe	
2.	DECIS EXPERT 100 EC 100 g/L deltametrin	Bayer SRL CO:123PC/22.07.2015	SMRZ: Republica Cehă	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: MĂR, PĂR: <i>Aphis pomi, Anthonomus pomorum, Cydia pomonella</i> • 75 mL/ha CIREȘ: <i>Myzus cerasi, Rhagoletis cerasi</i> • 75 mL/ha VITA DE VIE (STRUGURI DE VIN ȘI DE MASĂ): <i>Lobesia botrana</i> • 75 mL/ha VINETE: <i>Afide (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae etc)</i> • 75 mL/ha FLOAREA SOARELUI: <i>Afide (Anuraphis helichrysi Aphis fabae)</i> • 75 mL/ha CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis nasturtii</i> • 75 mL/ha PORUMB: <i>Diabrotica virgifera virgifera, Helicoverpa armigera</i> • 75 mL/ha GRAU, SECARA, TRITICALE, GRAU SPELTA: <i>Cecidomyide sp. (Sitodiplosis mosellana, Contarinia tritici), Lema melanopus, Eurygaster integriceps</i> • 75 mL/ha ORZ: <i>Lema melanopus</i> • 75 mL/ha CĂPSUN: <i>Anthonomus rubi, Lepidoptere</i> • 75 mL/ha BROCCOLI: <i>Afide, Pieris brassicae</i> • 75 mL/ha VARZA CHINEZEASCA, GULIE: <i>Afide, Pieris brassicae</i> • 75 mL/ha	PERICOL
3.	ALAKAZAM 500 WG 500 g/kg flonicamid	JT Agro Ltd., Irlanda CO:810PC/07.12.2022	SMRZ: România	MĂR: <i>Dysaphis plantaginea</i> • 0,15 kg/ha Se aplică de la finalul înfloririi până la dezvoltarea fructelor (BBCH 69 - 75). PIERSIC: <i>Myzus persicae</i>	ATENȚIE



				• 0,120 - 0,140 kg/ha Se aplică de la finalul înfloririi până la dezvoltarea fructelor (BBCH 69 - 75), în funcție de gradul de infestare. PRUN: <i>Hyalopterus pruni</i> • 0,120 - 0,140 kg/ha Se aplică de la finalul înfloririi până la dezvoltarea fructelor (BBCH 69 - 75), în funcție de gradul de infestare. ARDEI (CÂMP): <i>Myzus persicae</i> • 0,120 - 0,140 kg/ha Se aplică de la 6-8 frunze până la recoltarea fructelor (BBCH 16/18-99). CARTOF (PRODUCERE SĂMÂNȚĂ): Afide • 0,140 - 0,160 kg/ha Se aplică de la apariția inflorescenței până la maturarea tuberculilor în funcție de gradul de infestare (BBCH 50 - 80). PLANTE ORNAMENTALE DIN PARCURI ȘI GRĂDINI: <i>Macrosiphon rosae</i> • 0,120 - 0,140 kg/ha Se aplică în funcție de gradul de infestare. CAIS: <i>Myzus persicae</i>, <i>Brachycaudus schwartzi</i> • 0,140 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71). CIREȘ: <i>Myzus persicae</i>, <i>Brachycaudus schwartzi</i> • 0,140 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71).	
--	--	--	--	---	--

ERBICIDE

1.	PRINCIPAL FORTE 31,25 g/Kg rimsulfuron + 62,475 g/Kg nicosulfuron + 510,42 g/Kg dicamba + 31,25 g/Kg isoxadifen (safener)	Corteva Agriscience România SRL CO:811PC/07.12.2022	SMRZ: Republica Cehă	PORUMB (BOABE ȘI SILOZ): Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 480 g/ha sau aplicare divizată 50:50 sau 60:40, fără a se depăși totalul maxim de 480 g/ha. Se aplică de la 2 frunze până la 9 frunze (BBCH 12-19).	ATENȚIE
2.	INVESTO 100 EC/JENOT 100 EC- a	INNVIGO Sp.z.o.o, Polonia	SMRZ: România	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:	PERICOL



	doua denumire comercială 100 g/L quizalofop-P-etil	CO:313PC/10.04.2017		SOIA: Buruieni monocotiledonate (ex: <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Setaria glauca</i>), <i>Sorghum halpense</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la formarea celui de-al 5-lea lăstar (BBCH 10 - 25). <i>Elymus repens</i> • 1,2 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la formarea celei de-a 4-a frunze trifoliolate (BBCH 10 -14).	
3.	BUSTER 100 EC/JENOT PLUS 100 EC- a doua denumire comercială 100 g/L quizalofop-P-etil	INNIGO Sp.z.o.o, Polonia CO:387PC/28.02.2018	SMRZ: România	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: SOIA: Buruieni monocotiledonate (ex: <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Setaria glauca</i>), <i>Sorghum halpense</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la formarea celui de-al 5-lea lăstar (BBCH 10 - 25). <i>Elymus repens</i> • 1,2 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la formarea celei de-a 4-a frunze trifoliolate (BBCH 10 -14).	PERICOL
4.	ZAMZAR 50 g/L quizalofop-P-etil	Galenika-Fitofarmacija d.o.o., Slovenia CO:812PC/07.12.2022	SMRZ: România	SFECIĂ DE ZAHĂR: Buruieni anuale monocotiledonate • 1,0-1,5 L/ha (în funcție de gradul de îmburuienare) <i>Agropyron repens</i> • 2,0-2,5 L/ha (în funcție de gradul de îmburuienare) Se aplică de la stadiul de 3 frunze până când frunzele acoperă solul în proporție de 90% (BBCH 13-39). FLOAREA SOARELUI: <i>Cynodon dactylon</i> • 3,0 L/ha <i>Agropyron repens</i> • 2,0-2,5 L/ha <i>Sorghum halepense</i> (din semințe) • 0,7-1,0 L/ha <i>Sorghum halepense</i> (din rizomi) • 2,0-2,5 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 4 frunze până la 6 frunze (BBCH 14-16). RAPITĂ DE TOAMNĂ: Samulastră de cereale • 0,7-1,0 L/ha Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0-1,5 L/ha	PERICOL



				<i>Agropyron repens</i> • 2,0-2,5 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 3 frunze desfăcute până la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 13-39).	
5.	VIBALLA 3 g/L halauxifen-metil	Corteva Agriscience România SRL CO:813PC/07.12.2022	SMRZ: UNGARIA	FLOAREA SOARELUI: Buruieni anuale dicotiledonate (<i>Abuthilon teophrasti</i>, <i>Ambrosia artemisiifolia</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Xanthium strumarium</i>, <i>Solanum nigrum</i>) • 1,0 L/ha Se aplică postemergent din stadiul de 4 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 14-51). Buruieni: în stadii cât mai tinere de creștere și dezvoltare.	<u>PERICOL</u>
6.	KALAMOS 100 g/L propaquizafop	JT Agro Ltd., Irlanda CO:814PC/07.12.2022	SMRZ: România	SFECLĂ DE ZAHĂR: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8-1,0 L/ha <i>Sorghum halepense</i> • 1,0-1,5 L/ha <i>Agropyron repens</i> • 1,5-2,0 L/ha <u>TOMATE (TRANSPLANTATE), ARDEI, FASOLE DE GRADINĂ, CEAPĂ (SEMĂNATĂ DIRECT):</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 L/ha <i>Sorghum halepense</i> • 1,0 L/ha <u>CARTOF:</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 0,7 L/ha Buruieni monocotiledonate perene • 1,5 L/ha <u>SOIA, FASOLE (CAMP), FLOAREA SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 L/ha <i>Sorghum halepense</i> • 1,0-1,5 L/ha <u>IN:</u> <i>Sorghum halepense</i> • 1,0-1,5 L/ha <u>LUCERNĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale, samulastră • 0,5 L/ha <i>Sorghum halepense</i> • 1,0-1,5 L/ha <u>TRIFOL:</u> Buruieni monocotiledonate anuale, samulastră • 0,5 L/ha <i>Elymus repens</i> • 1,5 L/ha	<u>PERICOL</u>



				MAZĂRE: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 L/ha <i>Sorghum halepense</i> • 1,0-1,5 L/ha VITĂ DE VIE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,5 L/ha PEPINIERE ȘI CULTURI SILVICE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,5-2,0 L/ha TUTUN: Buruieni monocotiledonate anuale și perene (inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi) • 1,0 L/ha RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate anuale, inclusiv samulastră – înainte de înfrățire • 0,5 L/ha	
--	--	--	--	---	--

REGULATORI DE CREȘTERE

1.	REGULLO PRO 250 EC 250 g/L trinexapac-etil	INNIGO Sp.z.o.o, Polonia CO:815PC/07.12.2022	SMRZ: România	GRĂU DE TOAMNĂ: Regulator de creștere • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei stindard (BBCH 25-39). ORZ DE TOAMNĂ: Regulator de creștere • 0,5 - 0,6 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei stindard (BBCH 25-39). ORZ DE PRIMĂVARĂ: Regulator de creștere • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei stindard (BBCH 25-39).	ATENȚIE
2.	MOMOS 250 EC 250 g/L trinexapac-etil	Pestila Sp.z.o.o, Polonia CO:816PC/07.12.2022	SMRZ: România	GRĂU DE TOAMNĂ: Regulator de creștere • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei stindard (BBCH 25-39). ORZ DE TOAMNĂ: Regulator de creștere • 0,5 - 0,6 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei stindard (BBCH 25-39). ORZ DE PRIMĂVARĂ: Regulator de creștere	ATENȚIE



				• 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei standard (BBCH 25-39).	
--	--	--	--	--	--

RODENTICIDE

1.	RATRON GW 2,5 % fosfura de zinc	Frunol Delicia GmbH, Germania CO:817PC/07.12.2022	<u>SMRZ:</u> <u>Germania</u>	<u>CULTURI AGRICOLE:</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> • 5 momeli în fiecare galerie <u>ZONE ORNAMENTALE (ÎN CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> • 5 momeli în fiecare galerie <u>LIVEZI:</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> <i>Clethrionomys glareolus</i> • 5 momeli în fiecare galerie <u>LEGUME (ÎN CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> • 5 momeli în fiecare galerie <u>PĂȘUNI:</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> • 5 momeli în fiecare galerie <u>ZONE FORESTIERE:</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> <i>Clethrionomys glareolus</i> • 5 momeli în fiecare galerie <u>ZONE NECULTIVATE:</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> • 5 momeli în fiecare galerie <u>PODGORII:</u> <i>Microtus arvalis</i> <i>Microtus agrestis</i> • 5 momeli în fiecare galerie	<u>ATENȚIE</u>
----	------------------------------------	---	---------------------------------	--	----------------

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 – 42 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

FUNGICIDE

1.	ROMBIPHOS EXTRA 726 g/L fosfonați de potasiu	PLYMAG SL, Spania CO:818PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	<u>VITA DE VIE:</u> <i>Plasmopara viticola</i> • 4,0 L/ha Se aplică de la a 5-a frunză desfăcută până la coacerea fructelor (BBCH 15-89); maxim 6 tratamente/an cu 10 zile între aplicări sau se aplică maxim 5 tratamente cu 20 de zile între aplicări.	-
2.	XILIVERT	ARVENSIS AGRO SA,	AUTORIZARE	<u>VITA DE VIE:</u>	



	726 g/L fosfonați de potasiu	Spania CO:819PC/07.12.2022	DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	<i>Plasmopara viticola</i> • 4,0 L/ha Se aplică de la 5 frunze până la coacerea fructelor (BBCH 15- 89); maxim 6 tratamente/an cu 10 zile între aplicări sau se aplică maxim 5 tratamente cu 20 de zile între aplicări.	
3.	ATAPHOS – K 726 g/L fosfonați de potasiu	ATANOR PRODUCTOS QUIMICOS SA, Spania CO:820PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 1,0 L/ha Se aplică la stadiul de 5 frunze (BBCH 15)- max.400 L apă/ha. • 2,0 L/ha Se aplică la începutul înfloriturii (BBCH 61)- max.400 L apă/ha. • 3,0 L/ha Se aplică la apariția primelor fructe (BBCH 71)- max.1200 L apă/ha. • 4,0 L/ha Se aplică atunci când boabele sunt de mărimea unui bob de mazăre (BBCH 75)- max.1600 L apă/ha. Maxim 6 tratamente/an cu 10-14 zile între aplicări sau se aplică maxim 5 tratamente cu 20-28 de zile între aplicări. (*Cantitatea maximă de produs/sezon 18 L/ha.)	
4.	SHALIMAR 125 g/L protioconazol + 125 g/L tebuconazol	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:821PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	GRÂU DE TOAMNĂ: <i>Puccinia spp., Septoria spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la apariția inflorescenței (BBCH 30-59). <i>Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la apariția spicului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 51-65). ORZ DE TOAMNĂ: <i>Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres/Helminthosporium teres</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la apariția inflorescenței (BBCH 30-59). RĂPIȚĂ DE PRIMĂVARĂ: <i>Leptosphaeria maculans, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicola</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul înfloririi (50% dintre florile de pe racemul principal deschise) până la sfârșitul înfloririi (BBCH 65-69). MUSTĂR: <i>Leptosphaeria maculans, Botrytis</i>	ATENȚIE



				<i>cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicola</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul înfloririi (50% dintre florile de pe racemul principal deschise) până la sfârșitul înfloririi (BBCH 65-69).	
5.	DYNASOL 500 SC 500 g/L dimetomorf	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:822PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 0,4 L/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la înflorire când 50% din inflorescențe au primele flori deschise (BBCH 11-65); maxim 3 tratamente/an.	PERICOL
6.	FOLPAN GOLD 48,5 g/kg metalaxil – M + 400 g/kg folpet	ADAMA Agricultural Solutions SRL, România CO:823PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	HAMEI: <i>Pseudoperonospora humuli</i> • 2,7 kg/ha Se aplică de la apariția primilor lăstari, până când coardele hameiului au atins 70% din înălțime, în 800-1200 L apă/ha (BBCH 21-37); max. 1 tratament/an. • 4,0 kg/ha Se aplică de la momentul în care coardele hameiului au atins 70% din înălțime, până când mugurii inflorescenței s-au mărit în 1200-2200 L apă/ha (BBCH 37-55); max. 1 tratament/an. VITA DE VIE (SOIURI DE VIN): <i>Plasmopara viticola</i> • 2,0 kg/ha Se aplică din faza de inflorescențe vizibile până la mugurii măriți în inflorescență, în 1000 l apă/ha (BBCH 61-79); max. 2 tratamente/an cu min. 10 zile între tratamente.	PERICOL
7.	RELENYA 50 g/L mefentrifluconazol	BASF Agro B.V. Arnhem(NL) Freienbach Branch, Elveția CO:824PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN REPUBLICA CEHĂ	GRÂU DE TOAMNĂ: <i>Tilletia controversa</i> <i>Tilletia tritici</i> • 0,1 L/100 kg semințe Tratament sămânță (BBCH 00).	ATENȚIE
8.	ORONDIS ULTRA 30 g/L oxatiapiproplin + 250 g/L mandipropamid	SYNGENTA AGRO SRL CO:825PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN GRECIA	VITĂ DE VIE (STRUGURI DE VIN ȘI MASĂ): <i>Plasmopara viticola</i> • 0,67 L/ha Se aplică astfel: Cultura: 3 frunze vizibile – Struguri în pârgă(BBCH 13-85). TOMATE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Phytophthora infestans</i> • 0,67 L/ha Se aplică astfel: Cultura: Prima frunză adevărată formată – Coacere deplină (BBCH 11-89).	ATENȚIE



				<u>SALATĂ (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Bremia lactucae</i> • 0,67 L/ha Se aplică astfel: <u>Cultura:</u> Prima frunză adevărată formată - Formarea căpățanii (BBCH 11-49). <u>VINETE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Phytophthora infestans</i> • 0,67 L/ha Se aplică astfel: <u>Cultura:</u> Prima frunză adevărată formată – Coacere deplină (BBCH 11-89).	
--	--	--	--	---	--

INSECTICIDE

1.	NeemAzal- T/S 10 g/L azadiractina A	Trifolio – M GmbH, Germania CO:826PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>OLANDA</u>	<u>ROȘII, ARDEI, ARDEI IUTE, VINETE, CASTRAVETI, DOVLECI, DOVLECEI (SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Afide</i> (ex. <i>Myzus persicae</i>), <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Trialeurodes vaporariorum</i>, <i>Dalia brassicae</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, etc. • 2-3 L/ha (în funcție de înălțimea plantei). Astfel: 2 L/ha (planta < 50 cm) 2,5 L/ha (planta între 50-125 cm) 3 L/ha (planta > 125 cm) Se aplică de la apariția primelor frunze până la coacere (BBCH 10-85); max. 3 tratamente la interval de minim 7 zile. <u>MĂR:</u> <i>Dysaphis plantaginea</i> • 3 L/ha Se aplică de la stadiul de buton roz până la sfârșitul înfloritului (BBCH 57-69); max. 1 tratament. <u>PLANTE ORNAMENTALE, PEPINIERE DE POMI FRUCTIFERI (SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Afide</i> (ex. <i>Myzus persicae</i>), <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Panonychus ulmi</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Dalia brassicae</i>, etc. • 3,75 L/ha Se aplică de la primul semn de apariție a dăunătorului; max. 18 tratamente (6 serii a câte 3 tratamente) la interval de minim 7 zile între tratamente și pauză de 1,5 luni între serii. <u>PLANTE ORNAMENTALE (CÂMP):</u> <i>Afide</i> (ex. <i>Myzus persicae</i>), <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Panonychus ulmi</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Dalia brassicae</i>, etc.	
----	--	---	--	---	--



				• 2,5 L/ha Se aplică de la primul semn de apariție a dăunătorului; max. 4 tratamente (2 serii a câte 2 tratamente) la interval de minim 7 zile între tratamente și pauză de 2,5 luni între serii. PLANTE ORNAMENTALE ERBACEE/PERENE/ NELEMNOASE (CÂMP): Afide (ex. <i>Myzus persicae</i>), <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Panonychus ulmi</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Dalia brassicae</i>, etc. • 2 L/ha Se aplică de la primul semn de apariție a dăunătorului; max. 6 tratamente (3 serii a câte 2 tratamente) la interval de minim 7 zile între tratamente și pauză de 2,5 luni între serii. PEPINIERE DE ARBUȘTI, PEPINIERE DE POMI FRUCTIFERI, COPACI ȘI PEPINIERE FORESTIERE (CÂMP): Afide (ex. <i>Myzus persicae</i>), <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Panonychus ulmi</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Dalia brassicae</i>, etc. • 3 L/ha Se aplică de la primul semn de apariție a dăunătorului; max. 6 tratamente (3 serii a câte 2 tratamente) la interval de minim 7 zile între tratamente și pauză de 2,5 luni între serii. ARBORI ORNAMENTALI: Afide (ex. <i>Myzus persicae</i>), <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Panonychus ulmi</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Dalia brassicae</i>, etc. • 2,5 L/ha Se aplică de la primul semn de apariție a dăunătorului; max. 4 tratamente (2 serii a câte 2 tratamente) la interval de minim 7 zile între tratamente și pauză de 2,5 luni între serii.	
2.	CARNADINE 200 g/L acetamiprid	Nufarm Polska Sp.z.o.o, Polonia CO:827PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	MĂR: <i>Aphis pomi</i> <i>Cydia pomonella</i> • 0,125 L/ha (0,077 L/10000 m² LWA*) • 0,25 L/ha (0,154 L/10000 m² LWA*) Se aplică la începutul dezvoltării fructelor (BBCH 71). (LWA - suprafața peretelui frunzelor)	ATENȚIE



				CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,12 – 0,18 L/ha Se aplică de la apariția a peste 10 frunze—până la sfârșitul fazei de dezvoltare a fructelor, semințele de la primele fructificații sunt încă verzi (BBCH 20-79). RAPITA DE PRIMĂVARĂ, RAPITA DE TOAMNĂ: <i>Ceutorhynchus napi</i> • 0,15 – 0,25 L/ha Se aplică de la primele internoduri vizibile până la 9 sau mai multe internoduri (BBCH 31-39). <i>Ceutorhynchus pollidactylus / quadridens</i> • 0,15 – 0,25 L/ha Se aplică de la primele internoduri vizibile până la faza de „boboc galben” apariția primelor petale vizibile (BBCH 31-59). <i>Ceutorhynchus assimilis</i> <i>Dasineura brassicae</i> • 0,15 – 0,25 L/ha Se aplică de la 10% din flori de pe racemul principal deschise până când 10% păstăi au dimensiunea tipică (BBCH 61-71). <i>Meligethes aeneus</i> • 0,18 – 0,25 L/ha Se aplică atunci când mugurii floralii sunt prezenti, încă închiși de frunze până la primele flori deschise (BBCH 50-60).	
3.	QUICKPHOS Bags 560 g/kg fosfură de aluminiu	UPL HOLDINGS COOPERATIEF UA, OLANDA CO:828PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN AUSTRIA	CEREALE DEPOZITATE IN VRAC (GRĂU, ORZ, OVĂZ, OREZ, SECARĂ, GRĂU SPELTA, TRITICALE): Insecte de depozit (oua, larve, pupe, adulti) • 15 g/m³ (1 pungă x 34 g/2m³) (3 pungi x 10g/2m³) Se aplică în caz de infestare după recoltare. CEREALE DEPOZITATE IN SACI (GRĂU, ORZ, OVĂZ, OREZ, SECARĂ, GRĂU SPELTA, TRITICALE): Insecte de depozit (ouă, larve, pupe, adulți) • 15 g/m³ (1 pungă x 34 g/2m³) (3 pungi x 10g/2m³) Se aplică în caz de infestare după recoltare. SPAȚII DE DEPOZITARE: Insecte de depozit (ouă, larve, pupe,	PERICOL



				adulți) • 15 g/m ³ (1 pungă x 34 g/2m ³) (3 pungi x 10g/2m ³) Se aplică în caz de infestare după recoltare.	
ERBICIDE					
1.	VEXTAMITRON 700 SC 700 g/L metamitron	Vextachem Srl, Italia CO:829PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN AUSTRIA	SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ FURAJERĂ : Buruieni monocotiledonate (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Poa annua</i>) și Buruieni dicotiledonate (<i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Persicaria maculosa</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Veronica hederifolia</i> , <i>Viola arvensis</i>) • 2 L/ha + 1,5 L/ha + 1,5 L/ha 3 aplicări: prima aplicare (2 L/ha), preemergent de la semănat până înainte de răsărire (BBCH 00-09) și 2 aplicări a 1,5 L/ha postemergent, de la răsărire până la stadiul de 8 frunze (BBCH10-18; 7 zile între aplicări sau • 1 L/ha + 2 L/ha + 2 L/ha 3 aplicări postemergent de la răsărire până la stadiul de 8 frunze (BBCH10-18) ; 7 zile între aplicări. sau • 1,5 L/ha + 1,5 L/ha + 2 L/ha 3 aplicări postemergent de la răsărire până la stadiul de 8 frunze (BBCH10-18) ; 7 zile între aplicări.	ATENȚIE
2.	ANIMUS 750 g/kg tribenuron metil	AGRIA S.A, Bulgaria CO:830PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN REPUBLICA CEHĂ	GRÂU DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ, ORZ DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,015 L/ha – 0,025 L/ha Se aplică de la apariția primului internod până la apariția frunzei standard (BBCH 31-39) ; maxim 1 tratament.	ATENȚIE
3.	MODOWN 4 F 480 g/L bifenox	ADAMA Agricultural Solutions SRL, România CO:831PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN BULGARIA, POLONIA	GRÂU, ORZ, SECARĂ, TRITICALE, RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, FLOAREA - SOARELUI: Buruieni dicotiledonate anuale: (<i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Hibiscus trionum</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Lamium amplexicaule</i> , <i>Matricaria spp.</i> , <i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Solanum</i>	ATENȚIE



				<i>nigrum</i>, <i>Veronica spp.</i>, <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Xanthium strumarium</i>) • 1,5 L/ha Se aplică din faza de 3 frunze până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 13-29); maxim 1 tratament. • 0,6 L/ha – 1,5 L/ha Se aplică în faza de 4-9 frunze (BBCH 14-19); maxim 1 tratament. • 1,5 L/ha Se aplică preemergent înainte de răsărire (BBCH 00-09) sau postemergent în faza de 3-5 frunze (BBCH 13-15); maxim 1 tratament.	
4.	PONY 306SE 6,25 g/L florasulam + 300 g/L 2,4-D (452,3g/L 2,4-D 2 EHE	Pestila Sp. z.o.o, Polonia CO:832PC/07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ, SECARĂ: Buruieni dicotiledonate anuale si perene <i>(Centaurea cyanus, Stellaria media, Chenopodium album, Papaver rhoeas, Matricaria inodora, Myosotis spp., Galium aparine, Anthemis spp., Amaranthus retroflexus, Capsella bursa pastoris, Thlaspi arvensis, Fumaria officinalis, Viola tricolor, Veronica hederifolia, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare)</i> • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică postemergent, primăvara, de la faza de înfrățire până la al doilea internod (BBCH 21-32). GRÂU DE PRIMĂVARĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ, OVĂZ: Buruieni dicotiledonate anuale si perene <i>(Centaurea cyanus, Stellaria media, Chenopodium album, Papaver rhoeas, Matricaria inodora, Myosotis spp., Galium aparine, Anthemis spp., Amaranthus retroflexus, Capsella bursa pastoris, Thlaspi arvensis, Fumaria officinalis, Viola tricolor, Veronica hederifolia, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare)</i> • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică postemergent, de la stadiul de 2-3 frunze până la al doilea internod (BBCH 12-32). PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale si perene <i>(Centaurea cyanus, Stellaria media, Chenopodium album, Papaver rhoeas, Matricaria inodora, Myosotis spp., Galium aparine, Anthemis spp., Amaranthus retroflexus, Capsella bursa pastoris, Thlaspi arvensis, Fumaria officinalis, Viola tricolor, Veronica hederifolia, Polygonum</i>	ATENȚIE




				<i>convolvulus, Polygonum aviculare</i>) • 0,6 L/ha Se aplică postemergent, când porumbul este între faza de 2 și 6 frunze (BBCH 12-16). (*In funcție de gradul de îmburuienare)	
--	--	--	--	---	--

EXTINDEREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU UTILIZĂRI MINORE (ART.51 - Reg.(CE) nr.1107/2009)

INSECTICIDE

1.	TAEGRO 130 g/kg <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens tulpina</i> <i>FZB24</i>	Novozymes France S.A.S., Franta CO: 584PC/03.02.2020.	SMRZ: ROMANIA	COACĂZ, ZMEUR, AFIN, MUR, AGRIȘ, LOGANBERRY (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea, Sphaerotheca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaerotheca macularis, Erysiphe sp.</i> • 0,185 - 0,370 kg/ha La avertizare, de la înființarea culturii (semănat /plantat/ transplantat) până la recoltare MĂRAR (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Erysiphe sp., Sclerotinia sp</i> • 0,185 - 0,370 kg/ha La avertizare, de la înființarea culturii (semănat /plantat/ transplantat) până la recoltare PĂTRUNJEL (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Erysiphe sp., Sclerotinia sp</i> • 0,185 - 0,370 kg/ha La avertizare, de la înființarea culturii (semănat /plantat/ transplantat) până la recoltare. ANDIVE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Erysiphe sp., Sclerotinia sp</i> • 0,185 - 0,370 kg/ha La avertizare, de la înființarea culturii (semănat /plantat/ transplantat) până la recoltare. BROCCOLI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Fusarium sp., Botrytis cinerea</i> • 0,185 - 0,370 kg/ha La avertizare, de la înființarea culturii (semănat /plantat/ transplantat) până la recoltare. CONOPIDĂ (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Fusarium sp., Botrytis cinerea</i> • 0,185 - 0,370 kg/ha La avertizare, de la înființarea culturii (semănat /plantat/ transplantat) până la recoltare. PLANTE ORNAMENTALE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Erysiphe sp., Alternaria sp., Sclerotinia sclerotiorum</i>	-
----	---	---	--	---	---



				• 0,185 - 0,370 kg/ha La avertizare, de la înființarea culturii (semănat/plantat/ transplantați) până la recoltare.	
ERBICIDE					
1.	INVESTO 100 EC/JENOT 100 EC- a doua denumire comercială 100 g/L quizalofop-P-etil	INNVIGO Sp.z.o.o, Polonia CO:313PC/10.04.2017	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN REPUBLICA CEHA	<u>SFECLĂ ROȘIE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de 3 frunze până când frunzele acoperă solul în proporție de 90% (BBCH 12-34). <u>IN PENTRU SEMINTE, CÂNEPĂ PENTRU FIBRE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de 1 frunză la 6 frunze (BBCH 10-16). <u>BOB, FASOLE PĂSTĂI, FASOLE VERDE, MAZĂRE VERDE, MAZĂRE FURAJERA, LUPIN ALB, GALBEN, ALBASTRU, LINTE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la apariția a 9 sau mai multor lăstari (BBCH 11-39) sau de la apariția primilor muguri florali până la apariția primelor petale (BBCH 50-59) <u>PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINĂ, PĂSTĂRNAC, NAP SUEDEZ, HREAN, NAP, RIDICHE, SALSIFICĂ, BARBA CAPREI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt complet dezvoltate până când rădăcina atinge dimensiunea și forma tipică (BBCH 10-49). <u>TELINĂ DE RĂDĂCINĂ, NAP, HREAN:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunză până la stadiul de dezvoltare a părților plantei destinate recoltării (BBCH 12-34). <u>MUSTAR, MAC DE GRĂDINĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei perechi de frunze până la faza de creștere a lăstarului principal (BBCH 10-39). PLANTE ORNAMENTALE.	PERICOL



				PEPINIERE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,5 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunze până la faza de creștere a lăstarului principal (BBCH 12-39) sau de la înflorire până la recoltare (BBCH 50-93). • 1,32 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunze până la faza de creștere a lăstarului principal (BBCH 12-39) sau de la înflorire până la recoltare (BBCH 50-93). PEPINIERE FORESTIERE, PLANTAȚII DE ARBORI FORESTIERI DIN SEMINTE, CULTURI ENERGETICE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,32 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a 2 frunze până la sfârșitul vegetației (BBCH 12-50). TUTUN: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de două frunze până la stadiul de nouă frunze (BBCH 12-19).	
2.	BUSTER 100 EC/JENOT PLUS 100 EC- a doua denumire comercială 100 g/L quizalofop-P-etil	INN VIGO Sp.z.o.o, Polonia CO:387PC/28.02.2018	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: SFECLĂ ROȘIE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de 3 frunze până când frunzele acoperă solul în proporție de 90% (BBCH 12-34). IN PENTRU SEMINTE, CÂNEPĂ PENTRU FIBRE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de 1 frunză la 6 frunze (BBCH 10-16). BOB, FASOLE PĂSTĂI, MAZĂRE VERDE, LINTE: Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la apariția a 9 sau mai multor lăstari (BBCH 11-39) sau de la apariția primilor muguri florali până la apariția primelor petale (BBCH 50-59). FASOLE VERDE, MAZĂRE FURAJERĂ, LUPIN ALB, GALBEN, ALBASTRU:	<u>PERICOL</u>



				Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la apariția a 9 sau mai multor lăstari (BBCH 11-39) sau de la apariția primilor muguri florali până la apariția primelor petale (BBCH 50-59). <u>PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINĂ, PĂSTÂRNAC, NAP SUEDEZ, HREAN, NAP, RIDICHE, SALSIFICĂ, BARBA CAPREI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt complet dezvoltate până când rădăcina atinge dimensiunea și forma tipică (BBCH 10-49). <u>TELINĂ DE RĂDĂCINĂ, NAP, HREAN:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunze până la stadiul de dezvoltare a părților plantei destinate recoltării (BBCH 12-34). <u>MUSTAR, MAC DE GRĂDINĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei perechi de frunze până la faza de creștere a lăstarului principal (BBCH 10-39). <u>PLANTE ORNAMENTALE, PEPINIERE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,5 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunze până la faza de creștere a lăstarului principal (BBCH 12-39). • 1,32 L/ha Se aplică de la înflorire până la recoltare (BBCH 50-93). <u>PEPINIERE FORESTIERE, PLANTATII DE ARBORI FORESTIERI DIN SEMINTE, CULTURI ENERGETICE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,32 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a 2 frunze până la sfârșitul vegetației (BBCH 12-50). <u>TUTUN:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de două frunze
--	--	--	--	--

				până la stadiul de nouă frunze (BBCH 12-19).	
--	--	--	--	--	--

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR – (ART.43– Reg.(CE) nr.1107/2009)

INSECTICIDE

1.	HARPUN	Galenika-Fitofarmacija d.o.o.	SMRZ:	TOMATE ȘI CASTAVETI (SOLARII):	PERICOL
	100 g/L piriproxifen	CO:326PC/ 29.06.2017	SLOVENIA	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 75 mL/ 100 L apă Se aplică de la apariția inflorescențelor până la coacere (BBCH 50-89) Prima aplicare: la apariția primilor adulți. MĂR: <i>Cydia pomonella</i> • 1,0 L/ha Se aplică după înflorire, când fructele au 1 cm și până la peste 4 cm diametru (BBCH 71-74) PĂR: <i>Cacopsylla pyricola</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la îmbobocire până când fructele au jumătate din mărimea finală (BBCH 51-75)	

REOMOLOGARE PROCEDURA EUROPEANĂ

FUNGICIDE

1.	PROPLANT 72,2 SL	ARYSTA LIFESCIENCE		ARDEI, VINETE:	ATENȚIE
	722 g/L propamocarb	BENELUX SPRL CO: 1825/19.05.1998		<i>Pythium debaryanum</i> • 0,15 - 0,25% (3-5 L soluție/mp) CASTRAVETI: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 0,15% (1,5 L/ha) TOMATE: <i>Pythium debaryanum</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Phytophthora parasitica</i> • 0,15 - 0,25% (3-5 L soluție/mp) TUTUN (RĂSAD): <i>Pythium debaryanum</i> <i>Chalara sp.</i> <i>Phytophthora parasitica</i> • 0,15-0,2%	

ERBICIDE

1.	GARDOPRIM PLUS	Syngenta Crop		PORUMB:	ATENȚIE
	GOLD 500 SC 187,5 g/L terbutilazină + 312,5 g/L S-metolaclor	Protection AG, Elvetia CO: 2158/11.10.2002		Buruieni monocotiledonate anuale exclusiv buruieni dicotiledonate (<i>Sinapis</i>, <i>Raphanus</i>, <i>Xanthium</i>) • 4 - 4,5 L/ha Se aplică preemergent. Cultură: de la semănat până la răsărirea culturii (BBCH 00-08). PORUMB: Buruieni monocotiledonate anuale	



				inclusiv buruieni dicotiledonate (<i>Xanthium</i>, <i>Solanum</i>, <i>Sinapis</i>, <i>Abutilon</i>) • 4 - 4,5 L/ha Se aplică postemergent. Cultură: în stadiul de 3-4 frunze (BBCH 13-14). Buruieni: în stadiul de 2-4 frunze (BBCH 12-14). FLOAREA SOARELUI: Buruieni anuale (excepție <i>Xanthium</i>, <i>Solanum</i>, <i>Sinapis</i>) • 3,5 - 4 L/ha Se aplică preemergent. Cultură: de la semănat până la răsărirea culturii (BBCH 00-08).	
2.	LUMAX 537,5 SE 125 g/L terbutilazina + 37,5 g/L mezo-triona + 375 g/L S-metolaclo	Syngenta Crop Protection AG, Elvetia CO: 2595/14.12.2005	—	PORUMB: Buruieni anuale (excepție speciile <i>Xanthium</i>, <i>Solanum</i>, <i>Sinapis</i>, <i>Raphanus</i>, <i>Abutilon</i>) • 3,5 - 4,0* L/ha Cultură: se aplică preemergent, după semănat dar înainte de răsărire (BBCH 00-09). *(doza aplicată depinde de speciile de buruieni prezente și de gradul de îmburuienare). PORUMB: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3,0 - 3,5* L/ha Cultură: se aplică postemergent timpuriu în faza de 1-4 frunze (BBCH 10-14) Buruieni: Dicotiledonate: 2-3 frunze Monocotiledonate: înainte de înfrățire *(doza aplicată depinde de speciile de buruieni prezente și de gradul de îmburuienare).	ATENȚIE

B. APROBARE A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALĂ	A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ	NR. CERTIFICAT DE OMOLOGARE/ DATA	DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII
1.	FENCE	OSPNEY	420PC/05.06.2018	Albaugh TKI d.o.o., Slovenia
2.	LUMIPOSA 625 FS	LUMIPOSA Xtra OSR	363PC/29.11.2017	Corteva Agriscience România SRL
3.	LASER 240 SC	NEXSUBA	2155/11.10.2022	Corteva Agriscience România SRL
4.	ITCAN SL 270	CROWN MH	803PC/23.08.2022	Kreglinger Europe NV, Belgia
5.	RIVAL ULTRA	RECORD ULTRA	2675/19.12.2006	S.C. ALCHIMEX S.A.
6.	CASINO ROYALE	PROPIDIN	606PC/30.06.2020	SHARDA Cropchem Espana SL



7.	FOPAZ	TALONIL	787PC/23.08.2022	SHARDA Cropchem Espana SL
8.	ROYALTY 50 WG	SAGARIS	609PC/30.06.2020	SHARDA Cropchem Espana SL
9.	TONALE	CLICK TRIO	620PC/30.06.2020	Sipcam Oxon S.p.A., Italia
10.	PREV-GOLD	SINALA	678PC/22.04.2021	Oro Agri Europe S.A., Portugalia
11.	SHERPA 100 EC	CYPERFOR 100 EC	588PC/03.02.2020	SBM Developpement SAS, Franța
12.	SHERPA DUO	MASSANE	675PC/22.04.2021	SBM Developpement SAS, Franța
13.	DAVAI	SALTUS 80 SL	796PC/23.08.2022	Adama Agricultural Solutions SRL
14.	LAMDEX EXTRA	REXARIS 25 WG	037PC/27.02.2014	Adama Agricultural Solutions SRL

C. APROBARE PERMISE DE COMERȚ PARALEL CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT	NR. PERMIS DE COMERȚ PARALEL (P.C.P.) DENUMIRE COMERCIALĂ PRODUS	CULTURI	AGENȚI DE DĂUNARE	DOZE DE APLICARE
1.	CLORANTRINE 200 200 g/L clorantraniliprol	SC AGILANTE CAPITAL SRL	PCP NR.19/07.12.2022	CARTOF	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	50 mL/ha Se aplică la avertizare, la eclozarea ouălor, de la începutul acoperirii pământului cu frunzele plantei (BBCH 31-48).
				MĂR	<i>Cydia pomonella</i> <i>Phyllonorychter blancardella</i> <i>Leucoptera scitella</i>	150 mL/ha Se aplică la avertizare, de la stadiul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 70-87).
					<i>Phyllonorycter corylifoliella</i> <i>Pandemis ssp.</i> <i>Adoxophyes orana</i> <i>Argyrotaenia pulchellana</i>	160-175 mL/ha (în funcție de gradul de atac) Se aplică la avertizare, de la stadiul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 70-87).
				PĂR	<i>Cydia pomonella</i> <i>Phyllonorychter blancardella</i> <i>Leucoptera scitella</i> <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> <i>Pandemis ssp.</i> <i>Adoxophyes orana</i> <i>Argyrotaenia pulchellana</i>	160-175 mL/ha (în funcție de gradul de atac) Se aplică la avertizare, de la stadiul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 70-87).
				PRUN	<i>Cydia funebrana</i>	100 mL/ha Se aplică la avertizare, de la stadiul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 70-87).



				TOMATE	<i>Helicoverpa armigera</i> <i>Tuta absoluta</i>	175 mL/ha Se aplică de la apariția primelor ouă, înainte de eclozare (BBCH 51-89).
				VIȚA DE VIE	<i>Lobesia botrana</i>	150-175 mL/ha (în funcție de gradul de atac) Se aplică la avertizare, de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85).
					<i>Eupoecilia ambiguella</i>	150-175 mL/ha (în funcție de gradul de atac) Se aplică la avertizare, de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85).
				CAIS, PIERȘIC, NECTARIN	<i>Cydia molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i>	175 mL/ha Se aplică la avertizare, de la stadiul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 70-87).
				VINETE	<i>Helicoverpa armigera</i> <i>Tuta absoluta</i>	175 mL/ha Se aplică de la apariția primelor ouă, înainte de eclozare (BBCH 51-89).
				MORCOV, ȚELINĂ	<i>Psila rosae</i>	175 mL/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 15-89).
				CONOPIDĂ, BROCOLI, VARZĂ	<i>Mamestra brassicae</i> <i>Plutella xylostella</i> <i>Pieris brassicae</i>	125 mL/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la recoltare, la apariția primelor ouă, înainte de eclozare (BBCH 12-49).
				PORUMB, PORUMB DULCE	<i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Helicoverpa armigera</i>	125 mL/ha Se aplică de la stadiul de 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87).

2.	DIFENNI 25 250 g/L difenoconazol	SC AGILANTE CAPITAL SRL	PCP NR.20/07.12.2022	TOMATE	<i>Alternaria solani</i>	0,5 L/ha
				SFECLA DE ZAHĂR	<i>Cercospora beticola</i> <i>Erysiphe betae</i>	0,3 L/ha
				VIȘIN	<i>Monilia laxa</i>	0,15 L/ha
				CAIS	<i>Monilia laxa</i>	0,15 L/ha



				CĂPSUN	<i>Mychosphaella fragarie</i>	0,3 L/ha
				PIERSIC	<i>Taphrina deformans</i> <i>Coryneum beijerinckii</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> <i>Monilia</i> spp.	0,2 L/ha
					<i>Monilia laxa</i>	0,15 L/ha
				CIREȘ	<i>Blumeriella jaapi</i> <i>Monilia</i> spp.	0,2 L/ha
				MĂR	<i>Venturia inaequalis</i> <i>Podosphaera leucotricha</i>	0,2 L/ha
				RAPIȚA PENTRU ULEI	<i>Phoma lingam</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Erysiphe communis</i>	0,5 L/ha
3.	METOLLAC 960 g/L metolacior	960 S- SC AGILANTE CAPITAL SRL	PCP NR.21/07.12.2022	PORUMB	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i>)	1,0 - 1,5 L/ha Se aplică preemergent, imediat după semănat în condiții de umiditate.
					Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i> , <i>Hibiscus</i>)	1,0 - 1,5 L/ha 3 - 4 cm ppi
				FLOAREA SOARELUI	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i>)	1,0 - 1,5 L/ha Se aplică preemergent (imediat după semănat în condiții de umiditate).



					Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>)	1,0 - 1,5 L/ha 3 - 4 cm ppi; 3 cm ppi (zone secetoase)
				TOMATE ÎN CÂMP (cultura înființată prin răsad)	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale (<i>Setaria, Galinsoga</i>)	1,0 L/ha Se aplică preemergent.
				TOMATE SEMĂNATE DIRECT ÎN CÂMP	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale (<i>Setaria, Galinsoga</i>)	1,0 L/ha Se aplică preemergent.
				CEAPĂ DIN ARPAGIC	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale (<i>Setaria, Galinsoga</i>)	1,0 L/ha Se aplică preemergent.
				CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT ÎN CÂMP	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	0,8 - 1,0 L/ha Se aplică preemergent.
				FASOLE VERDE	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale (<i>Setaria, Galinsoga</i>)	1,0 L/ha Se aplică preemergent.
				FASOLE BOABE	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa, Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus</i>)	1,0 - 1,5 L/ha Se aplică preemergent în condiții de umiditate sau 3 cm ppi, în condiții de secetă.
				PRODUCERE RĂSAD TOMATE	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	0,25 mL/m² Se aplică preemergent.
				ARDEI GRAS, VARZĂ, CONOPIDĂ DE TOAMNĂ	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	1,2 L/ha Se aplică preemergent.
				VINETE	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	1,2 L/ha Se aplică preemergent.
				MORCOVI, PEPENI VERZI	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	0,8 - 1,0 L/ha Se aplică preemergent.



				CARTOF	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 - 1,5 L/ha Se aplică preemergent.
				SORG (Semințe de Sorg tratate cu Concept III)	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i>)	1,0 - 1,5 L/ha (doza maximă la solurile de tip cernoziom). Se aplică preemergent.
				SFECLĂ DE ZAHĂR	Buruieni monocotiledonate anuale	1,2 L/ha Se aplică preemergent.
					Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale	1,2 - 1,5 L/ha; ppi (cu încorporare superficială)
						1,5 L/ha Se aplică preemergent.
				SOIA	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i> , <i>Hibiscus</i>)	1,0 - 1,5 L/ha; 3 - 4 cm ppi;
				RAPIȚĂ	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i>)	1,0 - 1,5 L/ha Se aplică preemergent (depinde de tipul de sol; doza maximă la solurile de tip cernoziom).
				TUTUN	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale	1,0 L/ha Se aplică preemergent.
				IN DE FIBRĂ SAU ULEI	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i>) și unele dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i> , <i>Hibiscus</i>)	1,0 - 1,5 L/ha Se aplică preemergent, în condiții de umiditate sau 3 cm ppi, în condiții de secetă.



				CĂPȘUN (fructe și stoloni)	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale	1,2 L/ha Se aplică preemergent.
				ARBUSTI FRUCTIFERI (zmeur, mur, afin, coacaz negru)	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale	1,2 L/ha Se aplică preemergent.
4.	TOPAGON 10 100 g/L penconazol	SC AGILANTE CAPITAL SRL	PCP NR.22/07.12.2022	ARDEI (CÂMP, SERĂ, SOLAR)	<i>Leveillula taurica</i>	0,35-0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/an.
				CASTRAVEȚI (SERĂ)	<i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,25-0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
				CASTRAVEȚI (CÂMP, SERĂ, SOLAR)	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0,5 L/ha Se aplica maxim 3 tratamente/an la castraveti (camp) si maxim 4 tratamente/an la castraveti (sera si solar).
				CASTRAVEȚI (CÂMP)	<i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim tratamente/ an.
				ARBUȘTI FRUCTIFERI : CO ACĂZ NEGRU + AGRIȘE (CÂMP)	<i>Sphaeroteca mors- uvae</i> <i>Cronartium ribicola</i>	0,25-0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/an.
				MUR, ZMEUR	<i>Podosphaera aphanis</i>	0,4 L/ha Se aplică maxim 1 tratament/an.
				VIȚA DE VIE	<i>Uncinula necator</i>	0,3 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
					<i>Guignardia spp.</i>	0,3 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
				MĂR	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0,3-0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
				TRANDAFIR	<i>Sphaeroteca pannosa</i> var. <i>rosae</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/an.
				PEPENE GALBEN (CÂMP, SERĂ, SOLAR)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an la pepene galben (câmp) și maxim 4 tratamente/an la pepene galben (seră și solar).



				PEPENE VERDE (CÂMP, SERĂ, SOLAR)	<i>Erysiphe cichoracearum Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
				DOVLEAC (CÂMP, SERĂ, SOLAR)	<i>Erysiphe cichoracearum Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
				CĂPȘUN (CÂMP, SERĂ, SOLAR)	<i>Sphaeroteca macularis</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/an la căpșun (câmp) și maxim 4 tratamente/an la căpșun (seră și solar).
				TOMATE (CÂMP, SERĂ, SOLAR)	<i>Leveillula taurica</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.

5.	CICLOXY SPECIALE 100 g/L cicloxidim	SC AGILANTE CAPITAL SRL	PCP NR.23/07.12.2022	SFECLĂ DE ZAHĂR SI SFECLĂ FURAJERĂ	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39).
				FASOLE DE CÂMP	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39).
				TOMATE	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-29).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-29).



				LUCERNA PENTRU PRODUCȚIA DE SEMINȚE	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-51).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-51).
				SOIA, FLOAREA SOARELUI	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19).
				RAPIȚA PENTRU ULEI (toamnă, primăvară)	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-32).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-32).
				PORUMB (hibridi rezistenți tip CTM)	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19).
				CARTOF	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39).



					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39).
				POMI FRUCTIFERI	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică în perioada de vegetație.
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică în perioada de vegetație.
				CĂPȘUN	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2 L/ha (singur) sau 1 L/ha + 1 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-16).
					Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2 L/ha + 2 L/ha adjuvant (DASH HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-16).

6.	PENDI APA 445 455 pendimetalin	g/L	SC AGILANTE CAPITAL SRL	PCP NR.24/07.12.2022	FLOAREA SOARELUI	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum halepense</i> din samanta) si unele dicotiledonate anuale	2,0 - 4,0 L/ha Se aplică preemergent.
					PORUMB	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	2,0 - 4,0 L/ha Se aplică preemergent.
					SOIA	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	2,0 - 4,0 L/ha Se aplică preemergent.
					GRÂU, ORZ, SECARĂ	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	2,0 – 2,9 L/ha Se aplică preemergent.
					CARTOF	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	2,0 - 4,0 L/ha Se aplică preemergent.



				CEAPĂ DIN ARPAGIC: CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT (CULTURI IRIGATE)	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	1,5 - 4,0 L/ha Se aplică preemergent.
				USTUROI	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2,0 - 4,0 L/ha Preemergent
				TOMATE	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	1,0 - 3,0 l/ha Se aplică înaintea transplantării.
				VINETE	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2,0 - 3,0 L/ha Înaintea transplantării
				ARDEI	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	1,5 - 3,0 L/ha Înaintea transplantării
				VIȚĂ DE VIE, LIVEZI PE ROD	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2,0 - 4,0 L/ha În perioada de repaus, la preemergența buruienilor
				TUTUN	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2,0 - 3,0 L/ha Înaintea transplantării

7.	DEFIK 500 diflufenican	g/L	SC AGROVENA SRL	PCP NR.25/07.12.2022	CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, ORZ, SECARĂ, TRITICALE, ALAC)	<i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Lamium purpureum</i> <i>Stellaria media</i> <i>Veronica persica</i> <i>Anagallis arvensis</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Atriplex patula</i> <i>Matricaria spp.</i> <i>Poa annua</i> , <i>Solanum nigrum</i> <i>Polygonum aviculare</i>	0,375 L/ha Se aplică preemergent. CULTURA: imediat după semănat până la răsărire (BBCH 01-09). BURUIENI: tinere mai puțin de 4 frunze sau Se aplică postemergent. CULTURA: de la răsărire până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29). BURUIENI: tinere mai puțin de 4 frunze
					ORZ DE PRIMĂ VARĂ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Lamium purpureum</i> <i>Stellaria media</i> <i>Veronica persica</i> <i>Anagallis arvensis</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Atriplex patula</i> <i>Matricaria spp.</i> <i>Poa annua</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Polygonum aviculare</i>	0,375 L/ha Se aplică postemergent. CULTURA: faza de înfrățire maximă până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 26-29). BURUIENI: tinere mai puțin de 4 frunze



8.	GLYPHOCOVER 360 360 g/L glifosat acid	AGRICOVER DISTRIBUTION S.A.	PCP NR.26/07.12.2022	LIVEZI DE SEMINȚOASE (MĂR, PĂR)*	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate	1,5 – 2,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Malva</i> sp., <i>Urtica</i> sp., <i>Polygonum</i> sp., <i>Portulaca oleracea</i>	4,0 – 6,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Cynodon dactylon</i>	7,5 – 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15- 30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Sorghum halepense</i> <i>Pteridium aquilinum</i>	5,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15- 30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Convolvulus arvensis</i>	10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15- 30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Cyperus</i> sp.	6,0 L/ha Primul tratament se aplică la înflorirea buruienilor.
						5,0 L/ha Al doilea tratament se aplică la reinfestare.
				LIVEZI DE SÂMBUROASE (CAIS, PIERȘIC, NECTARIN, CIRES)*	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate	1,5 – 2,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Malva</i> sp., <i>Urtica</i> sp., <i>Polygonum</i> sp., <i>Portulaca oleracea</i>	4,0 – 6,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.



					<i>Cynodon dactylon</i>	7,5 – 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Sorghum halepense</i> <i>Pteridium aquilinum</i>	5,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Convolvulus arvensis</i>	10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Cyperus</i> sp.	6,0 L/ha Primul tratament se aplică la înflorirea buruienilor. 5,0 L/ha Al doilea tratament se aplică la reinfestare.
				VIȚĂ DE VIE (STRUGURI DE MASĂ ȘI DE VIN)*	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate	1,5 – 2,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Malva</i> sp., <i>Urtica</i> sp., <i>Polygonum</i> sp., <i>Portulaca oleracea</i>	4,0 – 6,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Cynodon dactylon</i>	7,5 – 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.



					<i>Sorghum halepense</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>	5,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Convolvulus arvensis</i>	10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Cyperus</i> sp.	6,0 L/ha Primul tratament se aplică la înflorirea buruienilor. 5,0 L/ha Al doilea tratament se aplică la reinfestare.
				TERENURI AGRICOLE (după recoltarea culturilor sau înainte de pregătirea terenului pentru semănat)	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate	1,5 – 2,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Malva</i> sp., <i>Urtica</i> sp., <i>Polygonum</i> sp., <i>Portulaca oleracea</i>	4,0 – 6,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Cynodon dactylon</i>	7,5 – 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Sorghum halepense</i> <i>Pteridium aquilinum</i>	5,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.



					<i>Convolvulus arvensis</i> 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Cyperus sp.</i> 6,0 L/ha Primul tratament se aplică la înflorirea buruienilor.
					5,0 L/ha Al doilea tratament se aplică la reinfestare.
				TERENURI NECULTIVATE	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate 1,5 – 2,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Malva sp., Urtica sp., Polygonum sp., Portulaca oleracea</i> 4,0 – 6,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de creștere intensivă a buruienilor.
					<i>Cynodon dactylon</i> 7,5 – 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Sorghum halepense Pteridium aquilinum</i> 5,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Convolvulus arvensis</i> 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit, în timpul înfloritului și imediat după înflorit; <i>Cynodon dactylon</i> are 15-30 cm; Feriga: la deschiderea completă a frunzelor.
					<i>Cyperus sp.</i> 6,0 L/ha Primul tratament se aplică la înflorirea buruienilor.



						5,0 L/ha Al doilea tratament se aplică la reînfestare.
					Arbuști lemnoși, arbori, arbuști cu spini, <i>Rubus sp.</i>	5,0 – 10,0 L/ha Se aplică în faza de creștere intensivă.
				MARGINEA CANALELOR DE IRIGAȚII ȘI DRENAJ	Buruieni higrofile	8,0 – 10,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruienile: sunt aproape de înflorit sau la înflorire.
				* nu se aplică în plantații pomicole și viticole mai tinere de 3 ani.		

2.REGULAMENTE PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA 17.08.2022-16.11.2022

1. Regulamentul (UE) 2022/1346 al Comisiei din 1 august 2022 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru 1,4-dimetilnaftalină, 8-hidroxichinolină, pinoxaden și valifenalat din sau de pe anumite produse;

2. Regulamentul (UE) 2022/1406 al Comisiei din 3 august 2022 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru metoxifenozyd, propoxur, spinosad și tiram din sau de pe anumite produse;

3. Regulamentul (UE) 2022/1435 al Comisiei din 26 august 2022 de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor carbonat de calciu, dioxid de carbon, ciprodinil și hidrogenocarbonat de potasiu din sau de pe anumite produse;

4. Regulamentul (UE) 2022/1438 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile specifice de aprobare a substanțelor active constând în microorganisme;

5. Regulamentul (UE) 2022/1439 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 283/2013 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate pentru substanțele active și cerințele specifice în materie de date aplicabile microorganismelor;

6. Regulamentul (UE) 2022/1440 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 284/2013 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate pentru produsele de protecție a plantelor și cerințele specifice în materie de date pentru produsele de protecție a plantelor care conțin microorganisme;

7. Regulamentul (UE) 2022/1441 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește principiile uniforme specifice de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin microorganisme;

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1443 al Comisiei din 31 august 2022 privind neaprobarea propionatului de calciu ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare;

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1444 al Comisiei din 31 august 2022 privind neaprobarea săpunului negru E470a ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE)



nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare;

10.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1468 al Comisiei din 5 septembrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active penflufen și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/185;

11.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1474 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de reînnoire a aprobării substanței active cu risc mic grăsime de oaie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

12.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1480 al Comisiei din 7 septembrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanțelor active 2-fenilfenol (inclusiv sărurile sale, de exemplu sarea de sodiu), 8-hidroxichinolină, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezin, clomazon, daminozid, deltametrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerat, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamină, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazat, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, uleiuri parafinice, ulei de parafină, penconazol, picloram, prohexadion, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etil, quizalofop-P-tefuril, 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu, p-nitrofenolat de sodiu, sulf, tebufenpirad, tetraconazol, trialat, triflurosulfuron și tritosulfuron;

3. DIVERSE

1. CNOPPP a luat notă de solicitarea **UPL Agricultural Solutions Romania** în ceea ce privește acționarea României ca Stat Membru Raportor Zonal pentru reînnoirea, conform art.43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, a produsului de protecție a plantelor **Ovipron Top** (certificat de omologare nr. 167PC/16.03.2016) după reînnoirea substanței active ulei de parafină.

2. CNOPPP a luat notă de solicitarea **BAYER Crop Science**, privind reînnoirea autorizațiilor produselor **ROUNDUP ENERGY, ROUNDUP CLASSIC PRO/(ROUNDUP EXTRA** - a doua denumire comercială), conform art. 43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 și a stabilit următoarele:

- Pentru produsul de protecție a plantelor **ROUNDUP ENERGY (450 g/L glifosat)**, doza maximă de aplicare pentru **TERENURI NECULTIVATE, PAIȘTI** este de 4 L/ha (echivalent a 1,8 kg glifosat/ha, iar pentru **RAPIȘĂ** este de 2,4 L/ha (echivalent 1,08 kg glifosat/ha).

- Pentru produsele de protecție a plantelor **ROUNDUP CLASSIC PRO/(ROUNDUP EXTRA** - a doua denumire comercială) (360 g/L glifosat), doza maximă de aplicare pentru **TERENURI CULTIVATE, LIVEZI (MĂR, PĂR, CIREȘ, PRUN** - va fi tratată doar fâșia de-a lungul liniei copacilor - aproximativ 33% din suprafața cultivată) și pentru **TERENURI NECULTIVATE, MIRIȘTE, TERENURI FĂRĂ DESTINAȚIE AGRICOLĂ, VEGETAȚIE DE AGREMENT** este de 5 L/ha (echivalent a 1,8 kg glifosat/ha), pentru **PEPINIERĂ FORESTIERĂ, PĂDURE** doza maximă de aplicare este de 10 L/ha, 33% din suprafață (echivalent a 3,6 kg glifosat/ha), iar pentru **PĂȘUNI** înainte de însămânțare, doza maximă este de 6 L/ha (echivalent 2,16 kg glifosat/ha).

3. Ca urmare a aplicării prevederilor **REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1468** de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active penflufen și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/185 de la data de **26.03.2023 se retrage certificatul de omologare nr.563PC/20.11.2019** al produsului de protecție a plantelor **EMESTO SILVER 118 FS**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul modificării/retragerii omologării o



perioadă de grație de 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 26.06.2023), la care se adaugă o perioadă de grație de 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 26.09.2023).

4. CNOPPP a luat notă procedura de lucru actualizată privind autorizarea zonală a produselor de protecție a plantelor în România conform art.33-39 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009.

5. CNOPPP a aprobat recertificarea BPE a companiilor 4DSEARCH AGRISCIENCE SERVICES, SC AgResearch GEP Trial Service SRL și SC AgroProspect SRL.

6. CNOPPP a luat notă de informarea companiei Corteva Agriscience România SRL privind corectarea adresei de corespondență a sediului de producție Uffholz.

7. CNOPPP a luat notă de informarea companiei Nufarm România SRL privind modificarea adresei de corespondență a companiei.

8. CNOPPP a luat notă de informarea companiei IQV privind desemnarea companiei Mifalchim Group SRL ca distribuitor al produsului de protecție al plantelor MEVAXIL COBRE.

3a. SCHIMBARE DENUMIRI COMERCIALE

9. La solicitarea companiei IQV, Spania, denumirea comercială a produsului MANOXIN COMBI (- a doua denumire comercială a produsului de protecție a plantelor ARMETIL COBRE) (certificat de omologare nr. 2077/19.12.2000) a fost schimbată în MEVAXIL COBRE.

10. La solicitarea companiei M2I BIOCONTROL SAS, Franța, denumirea comercială a produsului ENRAPTA TUTA PRESS (certificat de omologare nr. 777PC/23.08.2022) a fost schimbată în TUTA PRO PRESS.

11. La solicitarea companiei HELM AG, Germania, denumirea comercială a produsului ALEKTO(- a doua denumire comercială a produsului de protecție a plantelor HELOSATE 450 TF) (certificat de omologare nr. 390PC/28.02.2018) a fost schimbată în GLYPHOCOVER 450.

12. La solicitarea companiei UPL Agricultural Solutions SRL, denumirea comercială a produsului FASTER 500(- a doua denumire comercială a produsului de protecție a plantelor CYPERGUARD MAX) (certificat de omologare nr. 571PC/20.11.2019) a fost schimbată în FASTER MAGNUM.

3b. SCRISORI DE REPREZENTARE

13. Domnul Marc Pascal Huot va reprezenta compania SBM Developpement S.A.S., Franța în procesul de omologare și comunicarea cu autoritățile române implicate.

3c. NOTIFICĂRI TRANSFER PRODUSE

14. La notificarea companiei UPL Agricultural Solutions Romania produsul de protecție a plantelor KALIMBA / (ASSAULT - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 283PC/28.02.2017) a fost transferat către compania Gharda Chemicals Europe Limited.

15. La notificarea companiei Nufarm România SRL produsul de protecție a plantelor DARBY (certificat de omologare nr.799PC/23.08.2022) a fost transferat către compania Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irlanda.

3d. NOTIFICĂRI LOCAȚII DE FORMULARE

16. La solicitarea companiei Sharda Cropchem Espana SL, Spania a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul BUZZIN (certificat de omologare nr. 145PC/ 16.03.2016).

17. La solicitarea companiei BASF SE au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul



STRATOS ULTRA/ (FOCUS - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 1372/ 21.12.1992).

18. La solicitarea companiei **CAC Chemical GmbH, Germania** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **ERA/ (PROMINO 300 EC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 721PC/ 07.12.2021).

19. La solicitarea companiei **SAN Agrow Holding GmbH, Austria** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **BOTECTOR** (certificat de omologare nr. 651PC/ 24.11.2020).

20. La solicitarea companiei **SAN Agrow Holding GmbH, Austria** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **BLOSSOM PROTECT** (certificat de omologare nr. 652PC/ 24.11.2020).

21. La solicitarea companiei **HELM AG, GERMANIA** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **DIGATOR/ (GHEPARD FORTE** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 664PC/ 24.11.2020).

22. La solicitarea companiei **HELM AG, GERMANIA** au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **HELMSTAR 75 WG / (TRIMEO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2596/ 14.12.2005).

23. La solicitarea companiei **GLOBACHEM NV, Belgia** au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **DIFEND EXTRA** (certificat de omologare nr. 228PC/ 20.10.2016).

24. La solicitarea companiei **GLOBACHEM NV, Belgia** au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **SIRENA** (certificat de omologare nr. 195PC/ 03.06.2016).

25. La solicitarea companiei **Rotam Agrochemical Europe Limited, Anglia** au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsele **TOLEDO / (BOUNTY** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2823/ 09.03.2009) și **STARPRO 430 SC/ (MATIZ EXTRA 430 SC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 162PC/ 16.03.2016).

26. La solicitarea companiei **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **BARRACUDA / (CUTER** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 267PC/ 19.12.2016).

27. La solicitarea companiei **Rotam Agrochemical Europe Limited, Anglia** au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **SAFRAN 1.8 EC/ (VARGAS 1.8 EC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2824/ 09.03.2009).

28. La solicitarea companiei **Rotam Agrochemical Europe Limited, Anglia** au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **SAVVY/ (RICORSO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 085PC/ 21.01.2015).

29. La solicitarea companiei **Nufarm Romania SRL** au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **DARBY** (certificat de omologare nr. 799PC/ 23.08.2022).

30. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **ELATUS ERA/ (INDAVIUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 342PC/ 29.11.2017).

31. La solicitarea companiei **SINON EU GMBH, GERMANIA** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsele **SINSTAR/ (AZOXIPRO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 198PC/ 03.06.2016) și **CALIZI/ (SINPRO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 351PC/ 29.11.2017).

32. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL, Romania** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **SUNBRIGHT** (certificat de omologare nr. 795PC/ 23.08.2022).

33. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **ELANZA** (certificat de omologare nr. 786PC/ 23.08.2022).



34. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **KILLER SUPER 5 EC/ (QUICK 5 EC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2272/ 27.05.2004).

35. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **ELEGANT 05 EC/ (GHEPARD 5 EC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2804/ 15.10.2008).

36. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **RESET 5 CE/ (ELEMENT 5 CE** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2318/ 13.02.2004).

37. La solicitarea companiei **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **CLOMATE/ (CLEMATI** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 171PC/ 16.03.2016).

3e. MODIFICĂRI MAJORE

38. La solicitarea companiei **ADAMA AGRICULTURAL SOLUTION SRL, Romania** a fost aprobată modificarea majoră în compoziția produsului **DAVAI** (certificat de omologare nr. 796PC/ 23.08.2022).

39. La solicitarea companiei **ADAMA AGRICULTURAL SOLUTION SRL, Romania** a fost aprobată modificarea majoră în compoziția produsului **PHOENIX/ (STAVENTO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 650PC/ 24.11.2020).

40. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o., Polonia** a fost aprobată modificarea majoră în compoziția produsului **INVISTER 300 SL / (MEPIK 300 SL** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 416PC/ 28.02.2018).

41. La solicitarea companiei **SINON EU GMBH, GERMANIA** a fost aprobată modificarea majoră în compoziția produselor **SINSTAR / (AZOXIPRO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 198PC/ 03.06.2016) și **CALIZI/ (SINPRO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 351PC/ 29.11.2017).

3f. MODIFICĂRI MINORE

42. La solicitarea companiei **Biofa GmbH, Germania** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **VitiSan** (certificat de omologare nr. 729PC/ 07/12/2021).

43. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o., Polonia** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **FLUTRIX 050 FS** (certificat de omologare nr. 727PC/ 07.12.2021).

44. La solicitarea companiei **Evergreen Care Poland Sp. z.o.o., Polonia** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **ANTIBURUIENI FORTE** (certificat de omologare nr. 802PC/ 23.08.2022).

45. La solicitarea companiei **Evergreen Care Poland Sp. z.o.o., Polonia** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **ANTIBURUIENI** (certificat de omologare nr. 801PC/ 23.08.2022).

46. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o., Polonia** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **SKAUT 75 SG** (certificat de omologare nr. 765PC/ 24.03.2022).

47. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o., Polonia** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **NIXON 50 SG/ (HENIK 50 SG** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 272PC/ 19.12.2016).

48. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o., Polonia** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **TRIGOF 050 FS/ (MADRON 050 FS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 497PC/ 14.03.2019).



49. La solicitarea companiei **BAYER SRL, ROMANIA** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **BETANAL TANDEM 390 SC** (certificat de omologare nr. 235PC/ 20.10.2016).
50. La solicitarea companiei **NISSAN CHEMICAL EUROPE SAS, FRANTA** a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **LEIMAY/ (GACHINKO - a doua denumire comercială)** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 344PC/ 29.11.2017).

3g. SURSE DE SUBSTANȚE ACTIVE

51. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA** au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă **terbutilazina** aflată în compoziția produselor **LUMAX 537,5 SE/ (LUMISTO - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2595/ 14.12.2005), **CALARIS PRO/ (CLICK PRO - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 336PC/ 28.08.2017), **LUMAX H** (certificat de omologare nr. 293PC/ 28.02.2017) și **GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC/ (SILBA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2158/ 11.10.2002).
52. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia** au fost aprobate trei surse adiționale pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produselor **MAKLER 250 SE/ (BOLID 250 SE - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 425PC/ 05.06.2018) și **KIER 450 SC/ (MOLLIS 450 SC - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 496PC/ 14.03.2019).
53. La solicitarea companiei **CAC Chemical GmbH, Germania** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produsului **ERA/ (PROMINO 300 EC - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 721PC/ 07.12.2021).
54. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA** au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produsului **ELATUS ERA/ (INDAVIUS - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 342PC/ 29.11.2017).
55. La solicitarea companiei **GLOBACHEM NV, Belgia** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă **metconazol** aflată în compoziția produsului **SIRENA** (certificat de omologare nr. 195PC/ 03.06.2016).
56. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produsului **PROTIKON 250 EC** (certificat de omologare nr. 789PC/ 23.08.2022).
57. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă **captan** aflată în compoziția produsului **LEKARO 80 WG/ (KOLLIN 80 WG - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 487PC/ 14.03.2019).
58. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL, Romania** au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă **imazamox** aflată în compoziția produsului **DAVAI** (certificat de omologare nr. 796PC/23.08.2022) și o sursă adițională pentru produsul **SUNBRIGHT** (certificat de omologare nr. 795PC/ 23.08.2022).
59. La solicitarea companiei **BAYER SRL, ROMANIA** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produselor **NATIVO PRO 325 SC/ (DELARO 325 SC - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 056PC/ 29.09.2014) și **INPUT 460 EC** (certificat de omologare nr. 353PC/ 29.11.2017).

3h. AMBALAJE ADIȚIONALE

60. La solicitarea companiei **ADAMA Agricultural Solutions SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale, pentru produsele **SURDONE, LEBRON 0,5 G, FOLPAN 80 WDG/ (FLOVINE – a doua denumire comercială), LEOPARD 5EC/ (ERBISTAR- a doua denumire comercială) și SULTAN 50 SC / (MAGISTRAL 50 SC – a doua denumire comercială)**, conform tabelului de mai jos:



Nr. crt.	PRODUS	CERTIFICAT DE OMOLOGARE NR.	AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
			Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1.	SURDONE	2109/ 11.04.2001	500g; 1kg; 5kg	LDPE/alumi nium foil/LDPE	pungă	100g	Folie Aluminizată Triplu Stratificată	pungă
						100g	folie PET + Aluminiu +PE	pungă
						100g	TRIPLEX PET/Al/PE	pungă
						100g	Folie multistrat PET/BOPP MET/LDPE	pungă
						250g	folie PET + Aluminiu +PE	pungă
						20g	Folie Aluminizată Triplu Stratificată	pungă
						20g	TRIPLEX PET/Al/PE	pungă
2.	LEBRON 0,5G	568PC/ 20.11.2019	5kg; 10 kg	HDPE	pungă	100g	OPET met 12 / PE70	pungă
			5kg; 10 kg	ALPE/ALU/ PE/ Hartie	pungă	500g	OPET met 12 / PE70	pungă
			50g; 200g	Folie PET tr. dublu laminat cu bop met și Polietilena tr.	pungă			
			50g; 150g; 450g; 1kg	OPET met / LDPE, laminated, film metal	pungă			
3.	FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE- a doua denumire comercială)	1566/ 30.01.1995	10kg ; 20kg	(single layer)- Polyethylene	pungă	500g	OPET met 12 / PE70	pungă
			5kg	(triple layer, no handle)- PET 12/BONIL 15/PE 75	pungă			
			5kg	(triple layer, with handle)- PET12/PA1 5/PE80	pungă			
			1kg	(triple layer)- PET 12/Alu 8/PE 80	pungă			
			1kg	(double layer)-PET 12/PE 90	pungă			
			150g	PET/PE (folieduplex)	pungă			



			15g	(HARTIE/ALUMINIU/PE) - folie triplex	pungă			
4.	LEOPARD 5 EC / (ERBISTAR- a doua denumire comercială)	1874 / 15.12.1998	1L; 5L; 10L; 20L	HDPE	bidon	100mL	COEX (HDPE/PA)	flacon
			1L; 5L; 10L; 20L	HDPE/PA și HDPE/EVO H	bidon			
5.	SULTAN 50 SC / (MAGISTRA L 50 SC- a doua denumire comercială)	2159/ 11.10.2002	1L; 5L	HDPE	bidon	500mL	HDPE	flacon
			10L; 20L	HMW HDPE	bidon			

61. La solicitarea companiei **SYNGENTA AGRO SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsele **ACTELIC 50 EC**, **DUAL GOLD 960 EC**, **MINECTO ALPHA**, **SCORE 250 EC**, **TOPAS 100 EC** și **UNIVERSALIS 593 SC**, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	PRODUS	CERTIFICAT DE OMOLOGARE NR.	AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
			Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1.	ACTELIC 50 EC	403/ 03.07.1975	50 mL	PET	Bidon	10 mL	COEX HDPE/PA	Flacon
			100 mL	PET	Canistră			
			100 mL	COEX HDPE/PA	Canistră			
			200 mL	PET	Canistră			
			200 mL	COEX HDPE/PA	Canistră			
			1 L	PET	Canistră			
			1 L	COEX HDPE/PA	Canistră			
			5 L	f-HDPE	Canistră			
			5 L	COEX HDPE/PA	Canistră			
			20 L	f-HDPE	Canistră			
			200 L	Butoi din otel cu interior emailat	Butoi			
2.	DUAL GOLD 960 EC	1854/ 29.09.1998	100 mL	COEX HDPE/PA	Canistră	1 L	COEX HDPE/PA	Canistră
			100 mL	HDPE	Bidon			
			500 mL	COEX HDPE/PA	Canistră			
			1 L	PET	Canistră			



			5 L	HDPE	Canistră			
			10 L	HDPE	Canistră			
			20 L	HDPE	Canistră			
			1000 L	HDPE cu cadru din otel galvanizat	Container RIBC			
3.	MINECTO ALPHA	500PC/ 14.03.2019	250 mL	HDPE	Canistră	10 mL	HDPE	Flacon
			250 mL	PET	Canistră			
			500 mL	HDPE	Canistră			
			500 mL	PET	Canistră			
			1 L	HDPE	Canistră			
			1 L	PET	Canistră			
			5 L	HDPE	Canistră			
			5 L	PET	Canistră			
			10 L	HDPE	Canistră			
			10 L	PET	Canistră			
			20 L	HDPE	Canistră			
			20 L	PET	Canistră			
4.	SCORE 250 EC	1165/ 19.12.1989	250 mL	HDPE/PA	Flacon	50 mL	COEX HDPE/PA	Flacon
			250 mL	f-HDPE	Flacon			
			500 mL	HDPE/PA	Flacon			
			500 mL	f-HDPE	Flacon			
			1 L	HDPE/PA	Flacon			
			1 L	f-HDPE	Flacon			
			5 L	HDPE/PA	Flacon			
			5 L	f-HDPE	Flacon			
			10 L	f-HDPE	Flacon			
			20 L	f-HDPE	Flacon			
5.	TOPAS 100 EC	1056/ 29.02.1984	250 mL	HDPE/PA	Canistra	3 mL	PET laminat cu bariera PE	Canistra
			250 mL	PET	Canistra			
			500 mL	HDPE/PA	Canistra			
			500 mL	PET	Canistra			
			1 L	HDPE/PA	Canistra			
			1 L	PET	Canistra			
			5 L	f-HDPE	Canistra			



6.	UNIVERSALIS 593 SC	2612/ 02.03.2006	1 L	HDPE	Flacon	25 mL	HDPE	Flacon
			5 L	HDPE	Flacon	250 mL	HDPE	Flacon
			10 L	HDPE	Flacon			
			20 L	HDPE	Flacon			

62. La solicitarea companiei **Sinon Corporation**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul **CLEAN UP** (fost **AGRO-GLYFO**, conform ședinței CNOPPP din 23.08.2022), omologat cu certificatul de omologare nr. 366PC/29.11.2017, conform tabelului de mai jos:

Ambalaje aprobate			Ambalaje adiționale		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L	HDPE	Sticlă	100 mL	HDPE	Sticlă
5L	HDPE	Canistră	250 mL	HDPE	Sticlă
10 L	HDPE	Canistră	500 mL	HDPE	Sticlă
20 L	HDPE	Canistră	1L	HDPE	Sticlă
200 L	HDPE	Tambur	5L	HDPE	Canistră
1000 L	HDPE	Tambur	20 L	HDPE	Canistră

63. La solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA, S.A. SPANIA**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul **MAGMA TRIPLE WG/(ALLEATO TRIPLE WG-- a doua denumire comercială)**, omologat cu certificatul de omologare nr.482 PC/14.03.2019, conform tabelului de mai jos:

Ambalaje omologate			Ambalaje adiționale		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
40g; 100g; 250g ; 500g; 1kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 5kg	Poliester/Al/PE	plic, sac	30 g 300 g	Poliester/Al/PE	plic

64. La solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA, S.A. SPANIA**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul **ALFIL WG/(ALLEATO WG- a doua denumire comercială)**, omologat cu certificatul de omologare nr.113PC/22.07.2015, conform tabelului de mai jos:

Ambalaje omologate			Ambalaje adiționale		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
100g ; 250g ; 500g; 1kg; 5kg	Poliester/Al/PE	plic, sac	30 g 300 g	Poliester/Al/PE	plic

65. La solicitarea companiei **UPL Agricultural Solutions România SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul **SYLLIT 400SC**, omologat cu certificatul de omologare nr.2154/11.10.2002, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE		AMBALAJE ADIȚIONALE		AMBALATOR
Capacitate	Material	Capacitate	Material	
1L, 5L	HDPE	20mL, 100mL	HDPE	Solarex, AGRIL, Glissando, Chemark, Enochemie



66. La solicitarea companiei **GALENKA FITOFARMACIJA**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul **PROMESA**, omologat cu certificatul de omologare nr.774PC/23.08.2022, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	PRODUS	Certificat de omologare	Ambalaje omologate			Ambalaje aditionale		
			Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1.	PROMESA	774PC/ 23.08.2022	1 L	HDPE/PA	bidon	500 mL	HDPE/PA	flacon
			5 L	HDPE/PA	canistră			
			10 L	HDPE/COEX	canistră			
			20 L	HDPE	canistră			

/ PREȘEDINTE

Paulina GABOR

Mariana Mihalcea Udrea - vicepresedinte

