

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



**1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA
DIN DATA DE 14.03.2019**

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL	TESTE PROPUSE PENTRU OMOLOGARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ					
FUNGICIDE					
1.	DIMIX 500 SC 500 g/L dimetomorf	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Belgia CO: 479PC/14.03.2019	SMRZ: Olanda	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 0,3 L/ ha Se aplică în tank mix doar cu produsele care contin mancozeb 1340 g substanță activă • 0,36 L/ ha Se aplică în tank mix doar cu produsele care contin mancozeb 1200 g substanță activă	ATENȚIE
2.	INTUITY 250 g/L mandestrobin	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Franța CO: 480PC/14.03.2019	SMRZ: Austria	RAPIDĂ DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,8 L/ha Se aplică în timpul înfloritului (BBCH 60-69)	ATENȚIE
3.	COMRADE 200 g/L azoxistrobin + 80 g/L ciproconazol	Sharda Cropchem Limited, India CO: 204 PC/20.10.2016	SMRZ: Republica Cehă	CEREALE PĂIOASE (GRÂU, ORZ, OVĂZ, SECARĂ, TRITICALE): <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis tritici</i> <i>Mycosphaerella graminicola</i> (sin. <i>Septoria tritici</i>) • 0,75 L/ha	ATENȚIE



				ORZ: <i>Rhynchosporium</i> spp. <i>Helminthosporium</i> spp. <i>Pyrenophora teres</i> • 0,75 L/ha	
4.	KINTO PLUS 33,3 g/L fluxapiraxad + 33,3 g/L triticonazol + 33,3 g/L fludioxonil	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)- Freienbach Branch, Elveția CO: 481PC/14.03.2019	SMRZ: Italia	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ, GRÂU DURUM, GRÂU SPELT, GRÂU MONOCOCUM ȘI DICOCUM: <i>Microdochium nivale</i> (<i>Monographella nivalis</i>), <i>Fusarium</i> sp, <i>Tilletia caries</i> • 0,120- 0,150 L/100 kg semințe ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Microdochium nivale</i> (<i>Monographella nivalis</i>), <i>Fusarium</i> sp, <i>Ustilago nuda</i> , <i>Ustilago hordei</i> , <i>Pyrenophora graminea</i> , <i>Typhula incarnate</i> • 0,120- 0,150 L/100 kg semințe SECARĂ: <i>Microdochium nivale</i> (<i>Monographella nivalis</i>), <i>Fusarium</i> sp, <i>Ustilago nuda tritici</i> , <i>Urocystis occulta</i> • 0,120- 0,150 L/100 kg semințe TRITICALE: <i>Microdochium nivale</i> (<i>Monographella nivalis</i>), <i>Fusarium</i> sp, <i>Ustilago nuda fsp. tritici</i> • 0,120- 0,150 L/100 kg semințe OVĂZ: <i>Microdochium nivale</i> (<i>Monographella nivalis</i>), <i>Fusarium</i> sp, <i>Ustilago avenae</i> • 0,120- 0,150 L/100 kg semințe	ATENȚIE
5.	CANTUS 500 g/kg boscalid	BASF SE, Germania CO: 2760/27.03.2008	SMRZ: Polonia	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE LA URMATOARELE CULTURI: RAPIȚA DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ: <i>Plenodomus lingam</i> • 0, 2-0, 5* kg/ha (*în funcție de presiunea de atac) Se aplică de la faza de 3 frunze până la faza de	-



				inflorescență dezvoltată complet (BBCH 13-57) <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Alternaria spp.</i> • 0, 2-0, 5 kg/ha (*în funcție de presiunea de atac) Se aplică de la faza de inflorescență dezvoltată complet până când 10% din silicve au ajuns la mărimea finală (BBCH 57-71)	
6.	MAGMA TRIPLE 500 g/kg fosetil-Al + 250 g/kg folpet + 40 g/kg cimoxanil	INDUSTRIAS AFRASA SA, SPANIA CO: 482PC/14.03.2019	SMRZ: Republica Cehă	VITA DE VIE <i>Plasmopara viticola</i> • 2-3 kg/ha Se aplică de la începutul înfloririi până la compactarea ciorchinului (BBCH 61-75)	ATENȚIE

ERBICIDE

1.	BASAR 960 g/L s-metolaclor	Galenika Fitofarmacija d.o.o., Slovenia CO: 483PC/14.03.2019	SMRZ: Austria	PORUMB: Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate • 1,0-1,5 L/ha Se aplica preemergent sau postemergent timpuriu, până la faza de 3 frunze ale culturii (BBCH 00-13)	ATENȚIE
2.	ARNOLD 400 g/L flufenacet + 200 g/L diflufenican	Sharda Cropchem Limited, India CO: 484PC/14.03.2019	SMRZ: Republica Cehă	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ: Buruieni monocotiledonate: (<i>Apera spica-venti</i> , <i>Juncus bufonius</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i>) Buruieni dicotiledonate: <i>Stellaria media</i> , <i>Veronica spp.</i> , <i>Viola arvensis</i> , <i>Geranium spp.</i> , <i>Laminum spp.</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Brassica spp.</i>) • 0,6 L/ha Se aplică preemergent toamna de la semănat până la răsărire (BBCH 00-09) sau postemergent timpuriu primăvara devreme, de la apariția primei frunze până la	PERICOL



				faza de 2 frați vizibili (BBCH 11-22).	
3.	FLUENT 500 SC 500 g/L flufenacet	Sharda Cropchem Espana SL, Spania CO: 485PC/14.03.2019	SMRZ: Republica Cehă	CEREALE PĂIOASE (GRÂU, ORZ, TRITICALE, SECARĂ, ALAC): Buruieni monocotiledonate (<i>Apera spica-venti</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i>) • 0,4 L/ha Se aplică preemergent până la răsărire (BBCH 00-09) sau postemergent timpuriu de la răsărire până la apariția primelor frunze (BBCH 10-16) iar buruienile sunt nerăsărite sau se află în primele faze de vegetație	PERICOL

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ

FUNGICIDE

1.	AZUMO WG 800 g/kg sulf	AFEPASA, Spania CO: 486PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>FRANTA</u>	VITA DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 4,0 kg/ha ROSII, VINETE: <i>Leveillula sp.</i> • 4,0 kg/ha POMI FRUCTIFERI (specii samburoase: piersic, cais, nectarin): <i>Sphaerotheca pannosa</i> • 7,5 kg/ha POMI FRUCTIFERI (specii semintoase: mar, par, gutui, par asiatic, mosmon, mar paduret): <i>Podosphaera leucotricha</i> • 7,5 kg/ha SFECLA DE ZAHAR INDUSTRIALA SI FURAJERA: <i>Erysiphe betae</i>	-----
2.	LEKARO 80 WG 800 g/kg captan	INNVIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 487PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	MAR: <i>Venturia inequalis</i> • 1,9 kg/ha	PERICOL
3.	TRUNFO 250 g/L azoxistrobin	ASCENZA AGRO SA, PORTUGALIA CO: 488PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>FRANTA</u>	GRAU: <i>Puccinia spp</i> • 1,0 L/ha ORZ : <i>Helminthosporium sativum,</i>	PERICOL



				<i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Ramularia collo-cygni</i>, <i>Puccinia hordei</i> • 1,0 L/ha <u>CUCURBITACEE CU COAJA COMESTIBILA, IN SPATII PROTEJATE (CASTRAVETI, DOVLECEI SI ALTE CUCURBITACEE):</u> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> • 0,8 L/ha <u>CUCURBITACEE CU COAJA NECOMESTIBILA IN SPATII PROTEJATE (PEPENE GALBEN, PEPENE VERDE, DOVLEAC SI ALTE CUCURBITACEE CU COAJA NECOMESTIBILA):</u> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> • 0,8 L/ha <u>TOMATE (PROTEJATE):</u> <i>Leveillula solanacearum</i> • 0,8 L/ha	
4.	MOLINA 100 g/L tetraconazol	ISAGRO S.p.A, Italia CO: 489PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	MAR: <i>Venturia inaequalis</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,4 L/ha <u>CAPSUN (PLANTATII DE ROD):</u> <i>Sphaerotheca macularis</i> <i>Mycosphaerella fragariae</i> • 0,6 L/ha <u>CAPSUN (PLANTATII MAMA):</u> <i>Mycosphaerella fragariae</i> • 0,6 L/ha <u>TRANDAFIRI (AER LIBER):</u> <i>Sphaerotheca pannosa</i> • 0,05% (50 mL in 100 L apa) <u>TRANDAFIRI (SPATII PROTEJATE):</u> <i>Diplocarpon rosae</i> • 0,05% (50 mL in 100 L apa) <u>CRIZANTEME (SPATII PROTEJATE):</u> <i>Myrothecium roridum</i> • 0,05% (50 mL in 100 L apa)	<u>PERICOL</u>
5.	SPYRIT PRO 90 g/L dimetomorf + 500 g/L propamocarb	ASCENZA AGRO SA, PORTUGALIA CO: 490PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>PORTUGALIA</u>	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 2,0 L/ha <u>SALATA:</u> <i>Bremia lactucae</i>	-----



				• 2,0 L/ha	
6.	ZORVEC ENICADE 100 g/L oxatiapiprolin	DUPONT ROMANIA SRL CO: 491PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>IRLANDA</u>	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 0,15 L/ha SALATA: <i>Bremia lactucae</i> • 0,15 L/ha CEAPA, USTUROI: <i>Peronospora destructor</i> • 0,2 L/ha	<u>ATENTIE</u>
7.	ZORVEC ZELAVIN 100 g/L oxatiapiprolin	DUPONT ROMANIA SRL CO: 492PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>ITALIA</u>	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 0,2-0.6 L/ha	<u>ATENTIE</u>
8.	BARITON SUPER 97,5 FS 10 g/L tebuconazol + 37,5 g/L fludioxonil + 50 g/L prothioconazol	BAYER AG, GERMANIA CO: 493PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>SLOVACIA</u>	GRAU DE TOAMNA SI DE PRIMAVARA: <i>Tilletia tritici</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Ustilago nuda f.sp. tritici</i> • 1 L/tona de samanta ORZ DE TOAMNA SI DE PRIMAVARA: <i>Fusarium sp.</i> , <i>Monographella nivalis</i> <i>Pyrenophora graminea</i> <i>Pyrenophora teres</i> <i>Ustilago nuda f. sp. hordei</i> <i>Cochliobolus sativus</i> • 1 L/tona de samanta OVAZ: <i>Fusarium sp.</i> , <i>Pyrenophora avenae</i> <i>Ustilago avenae</i> • 1 L/tona de samanta SECARA: <i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i> , <i>Urocystis occulta</i> • 1 L/tona de samanta TRITICALE: <i>Fusarium sp.</i> , <i>Monographella nivalis</i> • 1 L/tona de samanta Tratament samanta.	<u>ATENTIE</u>
9.	FORTUNA GOLD 40 g/kg cimoxanil + 400 g/kg mancozeb	AGRIA SA, BULGARIA CO: 494PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>REPUBLICA CEHA</u>	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 3,0 kg/ha VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 1,5 kg/ha Se aplica de la aparitia inflorescentelor pana la inceputul infloririi (BBCH 55-61).	<u>ATENTIE</u>



				• 3,0 kg/ha Se aplica dupa inceputul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 61-80).	
10.	FORTUNA GLOBE 750 g/kg mancozeb	AGRIA SA, BULGARIA CO: 401PC/28.02.2018	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>MAREA</u> <u>BRITANIE</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI</u> <u>DE UTILIZARE LA</u> <u>URMATOARELE CULTURI:</u> <u>CARTOF:</u> <i>Phytophthora infestans</i> • 2,0 kg/ha	<u>ATENTIE</u>
11.	FORTUNA 800 g/kg mancozeb	AGRIA SA, BULGARIA CO: 400PC/28.02.2018	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>MAREA</u> <u>BRITANIE</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI</u> <u>DE UTILIZARE LA</u> <u>URMATOARELE CULTURI:</u> <u>CARTOF:</u> <i>Phytophthora infestans</i> • 2,0 kg/ha	<u>ATENTIE</u>
12.	ZIZAN 500 SC 500 g/L tebuconazol	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 286PC/28.02.2017	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI</u> <u>DE UTILIZARE LA</u> <u>URMATOARELE CULTURI:</u> - <u>revenire la sedinta din</u> <u>15.11.2018:</u> <u>RAPITA DE TOAMNA:</u> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Pyrenopeziza brassicae</i> • 0,5 L/ha Se aplica primavara.	<u>ATENTIE</u>
13.	ANTERO 500 EC 500 g/L procloraz	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 495PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>GRAU DE TOAMNA:</u> <i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i> <i>Mycosphaerella graminicola</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,9 L/ha <u>TRITICALE DE TOAMNA:</u> <i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i> <i>Mycosphaerella graminicola</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,9 L/ha <u>RAPITA DE TOAMNA:</u> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,9 L/ha	<u>PERICOL</u>
14.	KIER 450SC 125 g/L tebuconazol + 200 g/L azoxistrobin + 125 g/L difenoconazol	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 496PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>GRAU DE TOAMNA:</u> <i>Mycosphaerella graminicola</i> , <i>Phaeosphaeria nodorum</i> , <i>Puccinia recondite</i> , <i>Blumeria graminis</i> • 0,9-1,0 L/ha <u>TRITICALE DE TOAMNA:</u> <i>Phaeosphaeria nodorum</i> , <i>Puccinia recondite</i> , <i>Blumeria graminis</i>	<u>ATENTIE</u>



				• 0,9-1,0 L/ha SECARA DE TOAMNA: <i>Blumeria graminis</i> , <i>Puccinia recondite</i> • 0,9-1,0 L/ha ORZ DE PRIMAVARA: <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Puccinia hordei</i> , <i>Blumeria graminis</i> • 0,9-1,0 L/ha RAPITA DE TOAMNA: <i>Botryotinia fuckeliana</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,9-1,0 L/ha	
15.	TRIGOF 50 FS 50 g/L fludioxonil	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 497PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	GRAU DE TOAMNA: <i>Tilletia caries</i> <i>Tilletia foetida</i> <i>Fusarium</i> spp. <i>Microdochium majus</i> • 100 mL/100kg seminte cu 700 mL apa TRITICALE DE TOAMNA: SECARA DE TOAMNA: <i>Fusarium</i> spp. <i>Microdochium majus</i> • 100 mL/100kg seminte cu 700 mL apa Tratament samanta.	ATENTIE
INSECTICIDE					
1.	CENTURIO 10 g/kg clorpirifos	ADAMA ITALIA S.r.l CO: 498PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>ITALIA</u>	CARTOF: <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> • 10-20 kg/ha PORUMB: <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> • 10-20 kg/ha SFECLA DE ZAHAR: <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> • 10-20 kg/ha TOMATE, ARDEI, VINETE: <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> • 10-20 kg/ha POMI FRUCTIFERI: <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> • 10-20 kg/ha PLANTE ORNAMENTALE: <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> • 10-20 kg/ha	ATENTIE
2.	BACTOSPEINE DF 540 g/kg <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , tulpina (ABTS -	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE, FRANTA	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>ITALIA</u>	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE LA URMATOARELE CULTURI:	-----



351)		CO: 061PC/29.09.2014		<u>POMI FRUCTIFERI</u> <u>(specii samburoase):</u> <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 0,75 – 1,50 kg/ha <u>VITA DE VIE:</u> <i>Lobesia botrana</i> • 0,50 – 1,00 kg/ha <u>CAPSUNI:</u> <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Pandemis cerasana</i> <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 0,55 – 0,60 kg/ha <u>CARTOF:</u> <i>Phthorimaea operculella</i> <i>Hyphantria cunea</i> • 0,60 – 1,00 kg/ha <u>PORUMB:</u> <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Hyphantria cunea</i> • 0,60 – 1,00 kg/ha <u>SOIA:</u> <i>Cynthia cardui</i> <i>Hyphantria cunea</i> • 0,60 – 1,00 kg/ha <u>FLOAREA SOARELUI:</u> <i>Hyphantria cunea</i> • 0,60 – 1,00 kg/ha <u>SFECLA ROSIE, SFECLA DE ZAHAR:</u> <i>Hyphantria cunea</i>, <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Scrobipalpa ocellatella</i> • 0,60 – 1,00 kg/ha <u>OREZ:</u> <i>Mythima unipunctata</i>, <i>Spodoptera spp.</i> • 0,75 – 1,00 kg/ha <u>TOMATE, FASOLE, ARDEI, CASTRAVETI, VINETE (SERE):</u> <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Mamestra oleracea</i>, <i>Chrysodeixis chalcites</i>, <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,50 – 1,00 kg/ha <u>PELUZE, PEPINIERE:</u> <i>Hyphantria cunea</i> • 0,60 – 1,00 kg/ha	
3.	DELMETROS 100SC 100 g/L deltametrin	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 499PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	<u>GRAU DE TOAMNA:</u> <i>Oulema melanopus</i> • 0,05 L/ha <u>ORZ DE PRIMAVARA:</u> <i>Oulema melanopus</i> • 0,05 L/ha	<u>ATENTIE</u>



				CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,05 L/ha RAPITA DE TOAMNA: <i>Psylliodes chrysocephala</i> <i>Delia radicum</i> <i>Meligethes aeneus</i> • 0,05 L/ha	
4.	MINECTO ALPHA 12,5 g/L acibenzolar –S-metil + 100 g/L deltametrin	SYNGENTA AGRO SRL CO: 500PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>SPANIA</u>	SALATA (CAMP, SPATII PROTEJATE): <i>Frankliniella occidentalis</i> • 1,0-1,25 L/ha (1,0 L/ha- irigare prin picurare sau 1,25 L/ha-pulverizare foliara) <i>Spodoptera spp.</i> • 0,75-1,00 L/ha (0,75L/ha- irigare prin picurare sau 1,00 L/ha-pulverizare foliara) ARDEI (SPATII PROTEJATE): <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Spodoptera spp.</i> <i>Heliothis armigera</i> <i>Liriomyza spp.</i> • 1,0 L/ha (irigare prin picurare) TOMATE (SPATII PROTEJATE): <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Spodoptera litoralis</i> <i>Heliothis armigera</i> <i>Tuta absoluta</i> <i>Liriomyza spp.</i> • 1,0-1,25 L/ha (1,0 L/ha -irigare prin picurare sau 1,25 L/ha-pulverizare foliara)	ATENTIE
5.	BENEVIA 100 g/L ciantraniliprol	FMC Agro Operational CO: 501PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>REPUBLICA CEHA</u>	CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,125 L/ha CEAPA, USTUROI: <i>Delia antique</i> • 0,75 L/ha MORCOV, PATRUNJEL, PASTARNAC, TELINA, RIDICHE: <i>Psila rosae</i> • 0,75 L/ha Omizi • 0,6 L/ha	ATENTIE



				VARZA, BROCCOLI, VARZA DE BRUXELLES, CONOPIDA: <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Hyphantria cunea</i> , <i>Autographa gamma</i> • 0,4-0,5 L/ha <i>Aleyrodes proletella</i> <i>Delia radicum</i> • 0,75 L/ha CAPSUN: <i>Spodoptera exigua</i> <i>Anthonomus rubi</i> • 0,75 L/ha	
ERBICIDE					
1.	BENFLUNOVA 600 600 g/L benfluralin	FINCHIMICA S.p.A., ITALIA CO: 502PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>SPANIA</u>	FLOAREA –SOARELUI, BUMBAC : Buruieni anuale monocotiledonate (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Panicum miliaceum</i>) Buruieni anuale dicotiledonate (<i>Chenopodium album</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Chrysanthemum coronarium</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Polygonum persicaria</i>) • 2,5 kg/ha Se aplica inainte de semanat cu incorporare.	ATENTIE
2.	FAWORYT 300 SL 300 g/L clopiralid	CIECH SARZYNA S.A., POLONIA CO: 503PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	RAPITA DE TOAMNA: Buruieni dicotiledonate (<i>Centaurea cyanus</i> , <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Polygonum persicaria</i> , <i>Anthemis arvensis</i> , <i>Senecio vulgaris</i>) • 0,3-0,4 L/ha Se aplica postemergent. CULTURA: de la pornirea in vegetatie pana la aparitia butonilor florali (BBCH 10-50). BURUIENI: cat mai tinere de la stadiul de cotiledoane pana in faza de rozeta GRAU DE TOAMNA: Buruieni dicotiledonate	ATENTIE



				(<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Polygonum persicaria</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Senecio vulgaris</i>) • 0,3-0,4 L/ha Se aplica postemergent, in perioada de infratire. <u>CULTURA</u>: inceputul-sfarsitul infratitului (BBCH 21-29). <u>BURUIENI</u>: cat mai tinere de la stadiul de cotiledoane pana in faza de rozeta. SFECLA DE ZAHAR: Buruieni dicotiledonate (<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Polygonum persicaria</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Senecio vulgaris</i>) • 0,3 L/ha Se aplica postemergent <u>CULTURA</u>: 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>BURUIENI</u>: cat mai tinere de la stadiul de cotiledoane pana in faza de rozeta.	
3.	KINARA 500 g/L diflufenican	UPL EUROPE LTD CO: 504PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN BELGIA	CEREALE DE TOAMNA (GRAU, ORZ, SECARA, TRITICALE, ALAC): <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Veronica persica</i> , <i>Anagallis arvensis</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> , <i>Atriplex patula</i> , <i>Matricaria</i> spp., <i>Poa annua</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Polygonum aviculare</i> • 0,375 L/ha Se aplica preemergent <u>CULTURA</u>: imediat dupa semanat pana la rasarire (BBCH 01-09) <u>BURUIENI</u>: tinere mai putin de 4 frunze. sau Se aplica postemergent <u>CULTURA</u>: de la rasarire pana la sfarsitul fazei de	ATENTIE



				infratire (BBCH 10-29). <u>BURUIENI</u>:tinere mai putin de 4 frunze. ORZ DE PRIMAVARA: • 0,125 L/ha Se aplica postemergent <u>CULTURA</u>:faza de infratire maxima pana la sfarsitul infratrii (BBCH 26-29). <u>BURUIENI</u>:tinere mai putin de 4 frunze.	
4.	MINSTREL 200 g/L fluroxipir	UPL EUROPE LTD CO: 505PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN MAREA BRITANIE	GRAU DE PRIMAVARA, ORZ DE PRIMAVARA: <i>Fallopia convolvulus</i> <i>Galium aparine</i> <i>Stellaria media</i> <i>Myosotis arvensis</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> <i>Polygonum aviculare</i> • 0,75 L/ha Se aplica postemergent. <u>CULTURA</u>: 2 frunze- dezvoltarea completa a frunzei stindard (BBCH 12-39). <u>BURUIENI</u>: <i>Fallopia convolvulus</i>: 4 frunze,<i>Galium aparine</i>: 10 cm,<i>Stellaria media</i>: 10 cm,<i>Myosotis arvensis</i>: 5 cm,<i>Galeopsis tetrahit</i>: 10 cm,<i>Polygonum aviculare</i>: 2 frunze GRAU DE TOAMNA, ORZ DE TOAMNA: <i>Galium aparine</i> <i>Stellaria media</i> • 0,75 L/ha Se aplica postemergent. <u>CULTURA</u>: 2 frunze-sfarsitul fazei de infratire (BBCH 12-29). <u>BURUIENI</u>: 5 cm <i>Fallopia convolvulus</i>: 6 frunze <i>Galium aparine</i>: la înflorire <i>Stellaria media</i>: la înflorire <i>Myosotis arvensis</i>: la înflorire <i>Galeopsis tetrahit</i>: la înflorire <i>Polygonum aviculare</i>: 2 frunze,<i>Lamium purpureum</i>: 4 frunze • 1,0 L/ha Se aplica postemergent, dupa data de 1 martie. <u>CULTURA</u>: 2 frunze-	PERICOL



				dezvoltarea completa a frunzei standard (BBCH 12-39). <u>BURUIENI:</u> <i>Fallopia convolvulus</i>: 6 frunze, <i>Galium aparine</i>: la înflorire, <i>Stellaria media</i>: la înflorire, <i>Myosotis arvensis</i>: la înflorire, <i>Galeopsis tetrahit</i>: la înflorire, <i>Polygonum aviculare</i>: 2 frunze, <i>Lamium purpureum</i>: 4 frunze <u>SECARA DE TOAMNA,</u> <u>OVAZ DE TOAMNA,</u> <u>TRITICALE :</u> <i>Fallopia convolvulus</i> <i>Galium aparine</i> <i>Stellaria media</i> <i>Myosotis arvensis</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Lamium purpureum</i> • 1,0 L/ha Se aplica postemergent, după data de 1 martie. <u>CULTURA:</u> 2 frunze-inainte ca al 2-lea nod sa fie detectabil (BBCH 13-32). <u>BURUIENI :</u> <i>Fallopia convolvulus</i>: 6 frunze <i>Galium aparine</i>: la înflorire, <i>Stellaria media</i>: la înflorire <i>Myosotis arvensis</i>: la înflorire <i>Galeopsis tetrahit</i>: la înflorire <i>Polygonum aviculare</i>: 2 frunze, <i>Lamium purpureum</i>: 4 frunze <u>OVAZ DE PRIMAVARA :</u> <i>Fallopia convolvulus</i> <i>Galium aparine</i> <i>Stellaria media</i> <i>Myosotis arvensis</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> <i>Polygonum aviculare</i> • 0,75 L/ha Se aplica postemergent, <u>CULTURA:</u> 2 frunze-inainte ca al 2-lea nod sa fie detectabil (BBCH 13-32). <u>BURUIENI :</u> <i>Fallopia convolvulus</i>: 4 frunze <i>Galium aparine</i>: 10 cm, <i>Stellaria media</i>: 10 cm <i>Myosotis arvensis</i>: 5 cm <i>Galeopsis tetrahit</i>: 10 cm	
--	--	--	--	--	--



				<i>Polygonum aviculare</i>: 2frunze <u>PORUMB FURAJER:</u> <i>Fallopia convolvulus</i> <i>Galium aparine</i> <i>Stellaria media</i> <i>Myosotis arvensis</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Solanum nigrum</i> • 1,0 L/ha Se aplica postemergent, <u>CULTURA:</u> 3-6 frunze inainte de inceperea dezvoltarii radacinii firoase (BBCH 13-16). <u>BURUIENI:</u> <i>Fallopia convolvulus</i>: 4 frunze <i>Galium aparine</i>: 10 cm <i>Stellaria media</i>: 10 cm <i>Myosotis arvensis</i>: 5 cm <i>Galeopsis tetrahit</i>: 10 cm <i>Polygonum aviculare</i>: 2 frunze <i>Solanum nigrum</i>: 4 frunze <u>PAJISTI NOU INFIINTATE :</u> Buruieni anuale :<i>Stellaria media</i> • 0,75 L/ha Se aplica toamna sau primavara cand buruienile au cel putin 3 frunze. <u>PAJISTI ÎNFIINTATE (PERMANENTE SAU PRIN ROTATIE):</u> Specii de <i>Rumex</i> • 2,0 L/ha (30mL la 10 L apa in tratamente aplicate direct pe vetrele de buruieni) <i>Rumex</i> :faza de rozeta inainte de inflorire. Se pulverizeaza buruienile aparute la 2-3 saptamani dupa taiere.	
5.	EVOREL EXPRESS 125 g/kg tifensulfuron - metil + 375 g/kg tribenuron - metil	FMC International Switzerland Sarl, Elvetia CO: 506PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>ITALIA</u>	<u>HIBRIZI DE FLOAREA SOARELUI rezistenti la tifensulfuron metil si tribenuron metil</u> Buruieni dicotiledonate anuale si perene:<i>Amarantus retroflexus</i>,<i>Ambrosia artemisiifolia</i>,<i>Atriplex</i> spp. <i>Chenopodium</i> spp.,<i>Cirsium arvense</i>,<i>Convolvulus arvensis</i> <i>Galeopsis tetrahit</i>,<i>Galinsoga</i>	<u>ATENTIE</u>



				<i>parviflora</i>, <i>Galium aparine</i> Samulastra de floarea – soarelui, <i>Hibiscus trionum</i> <i>Polygonum</i> spp., <i>Portulaca</i> <i>oleracea</i>, <i>Sinapis arvensis</i> <i>Solanum nigrum</i>, <i>Sonchus</i> <i>oleraceus</i>, <i>Thlaspi arvense</i> <i>Veronica</i> spp., <i>Xanthium</i> spp.) • 48-60 g/ha* + 250 mL/ha (0,1% V/V) TREND 90** (* in functie de gradul de imburuienare. Doza minima pentru buruienile aflate in primele stadii de dezvoltare (< 4 frunze), iar doza maxima pentru buruienile bine dezvoltate si in cazul infestarilor predominante cu <i>Xanthium</i> spp. si samulastra de floarea soarelui ** sensibilitatea buruienilor este influentata de utilizarea adjuvantului TREND 90) Se aplica postemergent <u>CULTURA</u>: intre 2 -8 frunze (BBCH 12-18) <u>BURUIENI ANUALE</u>: <4 frunze <u>BURUIENI PERENE</u>: faza de rozeta • Aplicare fractionata: 30 g/ha + 30 g/ha +250 mL/ha (0,1% V/V) TREND 90 Se aplica postemergent. <u>CULTURA</u>: Prima aplicare intre 2-8 frunze (BBCH 12- 18), a doua aplicare intre 6-8 frunze (BBCH 16-18). <u>BURUIENI ANUALE</u>: <4 frunze <u>BURUIENI PERENE</u>: faza de rozeta	
6.	MITRON 700 SC 700 g/L metamiltron	CERTIPLANT NV, BELGIA CO: 507PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	SFECLA DE ZAHAR: Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Viola arvensis</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Amaranthus</i> <i>retroflexus</i>, <i>Capsella bursa-</i> <i>pastoris</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>Inodora</i>, <i>Chenopodium</i> <i>album</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>	ATENTIE



				• Doza de aplicare este de maxim 5 L/ha, se aplica la insamantarea sfeclei pana la sfarsitul fazei cand frunzele acopera 90% din suprafata solului(BBCH 00-39) si este divizata astfel: Primul tratament: 1,0 L/ha Se aplica inainte de rasarirea sfeclei cand buruienile sunt in faza de cotiledon. Al doilea tratament: 2,0L/ha Se aplica in faza timpurie de crestere a buruienilor. Al treilea tratament : 2,0L/ha Se aplica in faza timpurie de crestere a buruienilor.	
7.	CONVISO ONE 80 OD 30 g/L tiencarbazon-metil + 50 g/L foramsulfuron	BAYER AG, Germania CO: 508PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>FRANTA</u>	SFECCLA DE ZAHAR: Buruieni monocotiledonate anuale: <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Lolium</i> spp., <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Panicum miliaceum</i> și dicotiledonate anuale: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium</i> spp., <i>Cuscuta campestris</i> , <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Polygonum</i> spp., <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Viola arvensis</i> , <i>Thlaspi arvense</i> • 1,0L/ha Se aplica postemergent. CULTURA:primavara, 1-8 frunze (BBCH 10-18). BURUIENI:2-4 frunze Doza se poate fractiona in 2 aplicari a cate 0,5L/ha.	<u>PERICOL</u>
8.	LONTREL 600 600g/L clopiralid	DOW AGROSCIENCES EXPORT SAS CO: 509PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>MAREA BRITANIE</u>	RAPITA: Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Chrysanthemum segetum</i> , <i>Cirsium arvense</i> din seminte, <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Matricaria</i> spp., <i>Sonchus oleraceus</i> , <i>Fallopia convolvulus</i>) și dicotiledonate perene: <i>Cirsium arvense</i> , <i>Taraxacum</i> spp., <i>Cirsium vulgare</i> , <i>Sonchus arvensis</i> , <i>Trifolium repens</i> • 0,33-0,50* L/ha (* in functie de gradul	<u>ATENIE</u>



				de infestare si speciile de buruieni) Se aplica astfel: <u>CULTURA</u>:de la stadiul de 2 frunze la stadiul de buton floral(BBCH 12-50). <u>SFECLA DE ZAHAR, SFECLA ROSIE, SFECLA FURAJERA, MANGEL, NAP SUEDEZ, NAP:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Chrysanthemum segetum</i>, <i>Cirsium arvense</i> din seminte, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>) și dicotiledonate perene: <i>Cirsium arvense</i>, <i>Taraxacum</i> spp., <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Trifolium repens</i> • 0,33-0,50* L/ha (* in functie de gradul de infestare si speciile de buruieni) Se aplica astfel: <u>CULTURA</u>: cand randurile se intalnesc deasupra solului (BBCH 39). <u>BURUIENI</u>:stadiul de crestere activa <u>PORUMB FURAJ:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Chrysanthemum segetum</i>, <i>Cirsium arvense</i> din seminte, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>) și dicotiledonate perene: <i>Cirsium arvense</i>, <i>Taraxacum</i> spp., <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Trifolium repens</i> • 0,17 L/ha Se aplica astfel: <u>CULTURA</u>:de la rasarire pana la stadiul de 9 frunze (BBCH 10-19) <u>BURUIENI</u>:stadiul de crestere activa	
--	--	--	--	---	--



			<u>GRAU, ORZ, OVAZ:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Chrysanthemum segetum</i>, <i>Cirsium arvense</i> din seminte, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>) și dicotiledonate perene: <i>Cirsium arvense</i>, <i>Taraxacum</i> spp., <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Trifolium repens</i> • 0,12 L/ha Se aplica astfel: <u>CULTURA:</u>pana la aparitia celui de-al 3 lea nod (BBCH 32). <u>BURUIENI:</u>stadiul de crestere activa <u>PASUNI:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Chrysanthemum segetum</i>, <i>Cirsium arvense</i> din seminte, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>) și dicotiledonate perene: <i>Cirsium arvense</i>, <i>Taraxacum</i> spp., <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Trifolium repens</i> • 0,33 L/ha Se aplica astfel: <u>CULTURA:</u>cu 7 zile inainte de recoltare sau cosire <u>BURUIENI:</u>stadiul de crestere activa <u>PLANTE ORNAMENTALE:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Chrysanthemum segetum</i>, <i>Cirsium arvense</i> din seminte, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Fallopia convolvulus</i>) și dicotiledonate perene: <i>Cirsium arvense</i>, <i>Taraxacum</i> spp., <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Sonchus arvensis</i>, <i>Trifolium</i>	
--	--	--	---	--



				<i>repens</i> • 0,33 L/ha Se aplica in stadiul de crestere activa a buruienilor	
9.	SOLIDER 150 g/L triflusaluron - metil	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 510PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>SFECLA DE ZAHAR:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Viola arvensis, Galium aparine, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Matricaria inodora, Stellaria media, Brassica napus, Capsella bursa pastoris</i> • 0,13 L/ha Se aplica postemergent, astfel: <u>CULTURA:</u> de la prima frunza vizibila pana cand randurile sunt acoperite complet (BBCH 10-39) <u>BURUIENI:</u> faza intensiva de crestere pana la 2 frunze Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Viola arvensis, Stellaria media, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Matricaria inodora, Galium aparine, Brassica napus</i> • 0,1 L/ha+0,1 L/ha adjuvant (Asystent) Se aplica postemergent, astfel: <u>CULTURA:</u> de la prima frunza vizibila pana cand randurile sunt acoperite complet (BBCH 10-39) <u>BURUIENI:</u> faza intensiva de crestere pana la 2 frunze	<u>PERICOL</u>
10.	MONOGRA 700 SC 700 g/L metamitron	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 511PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>SFECLA DE ZAHAR (pentru productie sau producere de seminte):</u> Buruieni dicotiledonate <i>Stellaria media, Viola arvensis, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Polygonum persicaria, Anthemis arvensis, Samulastra de rapiță - Brassica napus, Amaranthus retroflexus,</i>	<u>ATENTIE</u>



				<i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Veronica persica</i> <i>Fallopia convolvulus</i> • 1,5L/ha (3 tratamente) Se aplica postemergent. CULTURA: Primul tratament dupa rasarire, pana la 4 frunze (BBCH 10-14), al doilea tratament in stadiul de 5-6 frunze (BBCH 15-16), iar al treilea tratament in stadiul de 7-9 frunze (BBCH 17-19). BURUIENI: faza de cotiledoane Intervalul dintre tratamente este de 7-12 zile.	
11.	SYNERGY GENERICS METAMITRON 700 g/L metamidon	SYNERGY GENERICS LIMITED CO: 512PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>MAREA BRITANIE</u>	<u>SFECLA DE ZAHAR, SFECLA ROSIE, SFECLA FURAJERA, MANGOLD:</u> Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate • 1,65 L/ha (preemergent) + 2 x 1,65 L/ha+ adjuvant (postemergent) sau 2,00 L/ha (preemergent) + 2 x 1,5 L/ha+ adjuvant (postemergent) Se aplica preemergent urmat de postemergent la nivelul de cotiledon al buruienii.	<u>ATENTIE</u>
12.	EXPERT 75 WG 750 g/kg tribenuron- metil	ASCENZA AGRO SA, PORTUGALIA CO: 513PC/14.03.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>PORTUGALIA</u>	<u>GRAU, GRAU DUR, ORZ, OVAZ:</u> Buruieni dicotiledonate • 15-20* g/ha (* in functie de nivelul infestarii) Se aplica postemergent. CULTURA: incepand cu 3 frunze pana la mijlocul perioadei de vegetatie; BURUIENI: perioada cresterii active (2-6 frunze)	<u>ATENTIE</u>
REGULATORI DE CRESTERE					
1.	ATONIK 1 g/L 5 nitroguaiacolat de sodiu +	ASAHI CHEMICAL EUROPE S.R.O. PRAGA, REPUBLICA	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE LA URMATOARELE CULTURI:</u>	



2 g/L ortonitrofenolat de sodiu + 3 g/L paranitrofenolat de sodiu	CEHA CO: 827/15.12.1977	<u>RAPITA DE TOAMNA:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la inceputul alungirii tulpinii pana la sfarsitul fazei de inflorire(BBCH 31-45). <u>GRAU DE TOAMNA:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la inceputul fazei de infratire pana in faza tarzie de burduf cand teaca frunzei stindard este umflata (BBCH 21-45). <u>PORUMB:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la 4 frunze pana la inflorirea completa (BBCH 14-65). <u>MORCOV:</u> • 0,5 L/ha Se aplica de la 2 frunze pana cand radacina a ajuns la 50% din diametrul final (BBCH 12-45). <u>MAR:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la aparitia mugurilor floralii pana cand fructele au ajuns la 60% din dimensiunea finala (BBCH 55-75). <u>VISIN:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la deschidere primelor flori pana cand fructele au ajuns la 60% din dimensiunea finala (BBCH 60-79). <u>COACAZ NEGRU:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la aparitia primelor frunze pana cand 50% din fructe sunt formate (BBCH 11-75). <u>ZMEUR:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la primele petale vizibile pana cand 50% din fructe sunt formate (BBCH 59-75). <u>CAPSUN:</u> • 0,6 L/ha Se aplica de la 2 frunze , pana cand semintele sunt vizibile pe tesutul receptaculului (BBCH 12-73).	
--	--	---	--



REOMOLOGARE

FUNGICIDE

1.	MACCANI 120 g/kg ditianon + 40 g/kg piraclostrobin	BASF SE, GERMANIA CO: 2731/19.12.2017	SMRZ: Slovenia	POMI FRUCTIFERI (MAR, PAR): <i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pirina</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> • 2,5 kg/ha	ATENTIE
2.	MYSTIC PRO 300 g/L procloraz + 200 g/L tebuconazol	NUFARM GmbH&Co. KG, Austria CO: 2734/19.12.2007	—	GRAU: Boli foliare si ale spicului <i>Erysiphe graminis</i> <i>Septoria spp.</i> <i>Puccinia spp.</i> • 1,0 L/ha <i>Fusarium spp.</i> • 1,25 L/ha ORZ: Boli foliare si ale spicului <i>Erysiphe graminis</i> <i>Pyrenophora teres</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Helminthosporium sativum</i> • 1,25 L/ha RAPITA: <i>Phoma lingam</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Erysiphe communis</i> • 0,625 L/ha Se aplica 1 tratament toamna. RAPITA: <i>Phoma lingam</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Erysiphe communis</i> • 1,25 L/ha Se aplica 1-2 tratamente primavara-vara, la avertizare.	ATENTIE
3.	ROVER 500 SC 500 g/L clorotalonil	Sipcam Oxon SpA CO: 2196/27.03.2003	—	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 0,2% CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> <i>Alternaria spp.</i> • 2,0 L/ha GRAU: <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis</i>	PERICOL



				<i>Erysiphe graminis</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Helminthosporium tritici repens</i> • 1,5 L/ha CASTRAVETI: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 0,25% (2,5 L/ha)	
4.	FANTIC M 40 g/kg benalaxil-M + 650 g/kg mancozeb	ISAGRO S.P.A., ITALIA CO: 2844/06.11.2009	—	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 2,5 kg/ha CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 kg/ha TOMATE: <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 kg/ha CEAPA: <i>Peronospora destructor</i> <i>Phytophthora porri</i> • 2,5 kg/ha	ATENTIE
5.	TENAZOL 60 FS 60 g/L tebuconazol	NUFARM GmbH&Co. KG, Austria CO: 2736/19.12.2007	—	GRAU: <i>Tilletia spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> • 0,5 L/t samanta ORZ: <i>Ustilago nuda</i> <i>Pyrenophora graminea</i> • 0,5 L/t samanta	ATENTIE
6.	MYSTIC COMBI 700 g/kg sulf + 45 g/kg tebuconazol	NUFARM GmbH&Co. KG, Austria CO: 2849/17.12.2009	—	VITA DE VIE: <i>Ucinula necator</i> • 2,0 kg/ha	ATENTIE
7.	EYETAK 450 BARCLAY 450 g/L procloraz	BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING Ltd, IRLANDA CO: 2222/15.12.2003	SMRZ: Marea Britanie	GRAU: <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Mycosphaerella graminicola</i> <i>Septoria nodorum</i> <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> <i>Fusarium nivale</i> <i>Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha	ATENTIE
8.	REVUS 250 SC 250 g/L madipropamid	SYNGENTA AGRO SRL, ROMANIA CO: 2718/25.10.2007	SMRZ: AUSTRIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE LA URMATOARELE CULTURI: HAMEI: <i>Pseudoperonospora humuli</i> • 1,6 L/ha VINETE (SPATII PORTEJATE): <i>Phytophthora infestans</i> • 0,4-0,6 L/ha	ATENTIE



				DOVLECEI (SPATII PROTEJATE): <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 0,6 L/ha DOVLEAC (SPATII PORTEJATE): <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 0,6 L/ha TOMATE (CAMP): <i>Phytophthora infestans</i> • 0,6 L/ha ANDIVE, CICOARE, MUSTAR ROSU (CAMP SI SPATII PORTEJATE): <i>Bremia lactucae</i>, <i>Peronospora parasitica</i> • 0,6 L/ha PATRUNJEL (CAMP SI SPATII PORTEJATE): <i>Plasmopara crustosa</i>, <i>Peronospora spp.</i> • 0,6 L/ha VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 0,6 L/ha	
9.	KING 250 EW 250 g/L tebuconazol	Sharda Cropchem Ltd., India CO: 2298/16.12.2004	—	GRÂU Boli foliare si ale spicului (<i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia spp.</i>, <i>Septoria spp.</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Helminthosporium sp.</i>) • 0,5 L/ha RAPITĂ <i>Phoma lingam</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Erysiphae comunis</i>, <i>Alternaria brassicae</i> • 1,0 L/ha MĂR <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,05% (0,75 L/ha) VITA DE VIE <i>Uncinula necator</i> • 0,4 L/ha	PERICOL
ERBICIDE					
1.	POINTER ULTRA 143 g/kg metsulfuron-metil + 143 g/kg tribenuron-metil	DUPONT International Operations SaRL (DIOSA), Elvetia CO: 2675/19.12.2006	—	GRAU: Buruieni dicotiledonate anuale si perene • 35 g/ha Se aplica 1 tratament foliar in 200-400 L/ha apa, postemergent cand plantele de grau sunt in faza de 2 frunze pana la aparitia frunzei standard (BBCH 12-39) si	ATENIE



				buruienile anuale sunt in faza de 2-6 frunze iar cele perene sunt in faza de rozeta.	
2.	DEVIRINOL 45 F 450 g/L napropamid	UNITED PHOSPHORUS LTD CO: 1563/30.01.1995	—	<u>RAPITA PENTRU ULEI:</u> Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate • 2,2 - 2,8 L/ha Se aplica inainte de semanat cu incorporare. <u>TOMATE SEMANATE DIRECT:</u> Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate • 3,0 - 4,0 L/ha Se aplica inainte de semanat cu incorporare. <u>ARDEI VERDE LUNG:</u> Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate • 3,0 - 4,0 L/ha Se aplica inainte de semanat cu incorporare.	<u>ATENTIE</u>
3.	ELEGANT 05 EC 50 g/L quizalofop-P-etil	SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt.Ltd., INDIA CO: 2804/15.10.2008	—	<u>RAPITA</u> Buruieni monocotiledonate anuale inclusiv samulastra de cereale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent, în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. Buruieni monocotiledonate perene inclusiv costrei din rizomi • 1,50 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. <u>SOIA</u> Buruieni monocotiledonate anuale	<u>PERICOL</u>



			• 0,75 L/ha Se aplică postemergent, în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. Buruieni monocotiledonate perene inclusiv costrei din rizomi • 1,50-2,0 L/ha Se aplică postemergent, în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. <u>FLOAREA SOARELUI</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. Buruieni monocotiledonate perene inclusiv costrei din rizomi • 1,50-1,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm.	
--	--	--	---	--



				<u>CARTOF</u> Buruieni monocotiledonate anuale(4-6 frunze) • 0,70-1,0 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. Buruieni monocotiledonate perene inclusiv costrei din rizomi și pir • 1,50-2,0 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. <u>SFECLĂ DE ZAHĂR</u> Buruieni monocotiledonate anuale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm. Buruieni monocotiledonate perene inclusiv costrei din rizomi • 2,0 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor. Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în	
--	--	--	--	--	--



				faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm.	
4.	TIGER P 150 g/L fluazifop-P-butil	SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt.Ltd., INDIA CO: 2708/11.06.2007	—	FLOAREA SOARELUI Buruieni monocotiledonate anuale inclusiv sorg din sămânță • 0,8 L/ha Se aplica postemergent, la infestare. <u>Cultura:</u> la aparitia a 4-8 frunze (BBCH 14-18) <u>Buruieni:</u> în stadiul de creștere activă, la aparitia a 3-6 frunze (5-25 cm) Buruieni monocotiledonate perene inclusiv sorg din rizomi • 1,0-1,3* L/ha (*Doza de 1,3 L/ha este pentru <i>Sorghum</i> spp.) Se aplica postemergent, la infestare. <u>Cultura:</u> la aparitia a 4-8 frunze (BBCH 14-18) <u>Buruieni:</u> în stadiul de creștere activă, la aparitia a 3-6 frunze (5-25 cm) SOIA Buruieni monocotiledonate anuale inclusiv sorg din sămânță • 0,8 L/ha Se aplica postemergent, la infestare. <u>Cultura:</u> la aparitia a 4 frunze până la al-3-lea rând de lăstari (BBCH 14-23) <u>Buruieni:</u> în stadiul de creștere activă, la aparitia a 3-6 frunze (5-25 cm). Buruieni monocotiledonate perene inclusiv sorg din rizomi • 1,0-1,3* L/ha (*Doza de 1,3 L/ha este pentru <i>Sorghum</i> spp.) Se aplica postemergent, la infestare. <u>Cultura:</u> la aparitia a 4 frunze până la al-3-lea rând de lăstari (BBCH 14-23) <u>Buruieni:</u> în stadiul de creștere activă, la aparitia a 3-6 frunze (5-25 cm).	ATENȚIE



INSECTICIDE

1.	SIGNAL 300 ES 300 g/L cipermetrin	ARYSTA LIFESCIENCES GREAT BRITAIN LTD CO: 2198/27.03.2003	—	PORUMB: <i>Agriotes spp.</i> • 2,0 L/t de samanta FLOAREA SOARELUI: <i>Agriotes spp.</i> • 2,0 L/t samanta GRAU: <i>Agriotes spp.</i> • 2,5 L/t samanta ORZ: <i>Agriotes spp.</i> • 2,5 L/t samanta	ATENTIE
2.	K'OBIOL 25 EC 225 g/L piperonil butoxid (agent sinergic) + 25 g/L deltametrin	BAYER ENVIRONMENTA L SCIENCE SAS, FRANTA CO: 1075/08.11.1984	—	PRODUSE AGRICOLE DEPOZITATE: <i>Daunatori de depozit</i> (Ex: <i>Sitophilus spp.</i> , <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Oryzaephilus surinamensis</i> , <i>Rhizoperta dominica</i> , <i>Acanthoscelides obtectus</i> , <i>Sitotroga spp.</i> , <i>Plodia interpunctella</i>) • 1% (10 ml/t de samanta pentru 6 luni de protectie si 20 ml/t de samanta pentru 12 luni de protectie) CEAPA, CARTOFI (depozitati): <i>Daunatori de depozit</i> (<i>Drosophila melanogaster</i>) • 1% (50 ml/100m ²) DEZINSECTIA SPATIILOR DE DEPOZITARE: <i>Daunatori de depozit</i> (Ex: <i>Sitophilus spp.</i> , <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Oryzaephilus surinamensis</i> , <i>Rhizoperta dominica</i> , <i>Acanthoscelides obtectus</i> , <i>Sitotroga spp.</i> , <i>Plodia interpunctella</i>) • 1% (50 ml solutie/100m ²) (50 ml K'OBIOL 25 EC + 4950 ml apa = 5 L solutie)	PERICOL
3.	SUMI ALPHA 5 EC 5% esfenvalerat	SUMITOMO, JAPONIA CO: 1526/11.03.1994	—	GRAU: <i>Eurygaster integriceps</i> <i>Lema melanopa</i> • 0,2 L/ha	PERICOL



				VARZA: <i>Mamestra brassicae</i> • 0,15 L/ha MAR: <i>Cydia pomonella</i> <i>Phyllonorycter blancardella</i> <i>Leucoptera scitella</i> • 0,02% (0,3 L/ha) VITA DE VIE: <i>Lobesia botrana</i> • 0,2 L/ha in 1000 L apa RAPITA: <i>Brevicoryne brassicae</i> • 0,2 L/ha <i>Ceuthorrhynchus napi</i> <i>Meligethes aeneus</i> • 0,25 L/ha	
4.	KARATE ZEON 50 g/L lambda-cihalotrin	SYNGENTA AGRO SRL, ROMANIA CO: 1812/04.12.1997	—	GRAU: <i>Eurygaster integriceps</i> • 0,15 L/ha CEREALE PAIOASE (GRAU, OR, OVAZ): <i>Lema melanopa</i> • 0,15 L/ha CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,20 L/ha VITA DE VIE: <i>Lobesia botrana</i> • 0,15 L/ha in 1000 L solutie/ha (0,015 %) CIRES: <i>Rhagoletis cerasi</i> • 0,015 % PRUN: <i>Cydia funebrana</i> • 0,015 % <i>Eurytoma schreineri</i> <i>Hoplocampa spp.</i> • 0,015 % (0,15 L/ha in 1000 L apa) MAR: <i>Cydia pomonella</i> , Afide • 0,015 % Insecte minatoare (<i>Stigmella malella</i> , <i>Leucoptera malifoliella</i> , <i>Phyllonorycter blancardella</i>) • 0,015 % (0,225 L/ha in 1500 L apa) PIERSIC: <i>Myzodes persicae</i> , <i>Cydia molesta</i> • 0,015 % (0,150 L/ha) PAR: <i>Psylla spp.</i>	ATENTIE



				• 0,015 % (0,150 L/ha) SFECLA DE ZAHAR: <i>Bothynoderes punctiventris</i> • 0,15 L/ha (tratament in vegetatie complementar tratamentului semintelor) MOLID: <i>Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus</i> • 0,5 % (300 MI solutie/mp scoarta-arbori doborati) VINETE (CAMP): <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,02 % (0,2 L/ha) VARZA: <i>Pieris brassicae, Brevicoryne brassicae</i> • 0,015 % (0,09 L/ha) VARZA CAMP: <i>Mamestra brassicae,</i> • 0,015 % (0,075 L/ha) LUCERNA SAMANTA: <i>Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis</i> • 0,015 L/ha POMI FRUCTIFERI: <i>Hyphantria cunea</i> • 0,015 % (0,225 L/ha-mar; 0,150 L/ha-restul speciilor pomicole) CEAPA: <i>Thrips tabaci</i> • 0,02 % (0,16 L/ha) TUTUN: <i>Myzus persicae, Chloridea armigera</i> • 0,2 L/ha (in 600 L apa) ARBORI IZOLATI SI DE ALINIAMENTE: <i>Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea</i> • 0,015 % RAPITA: <i>Meligethes aeneus, Ceuthorrhynchus napi</i> • 0,15 L/ha PORUMB: <i>Rhopalosiphum maidis</i> • 0,15 L/ha <i>Diabrotica virgifera</i> • 0,25 L/ha	
--	--	--	--	--	--



				(1-2 tratamente) FLOAREA SOARELUI: <i>Aphis fabae</i>, <i>Brachycaudus helichrysi</i> • 0,15 L/ha PORUMB: <i>Tanymericus dilaticollis</i>, <i>Oscinella frit</i> • 0,15 L/ha FLOAREA SOARELUI: <i>Tanymericus dilaticollis</i>, <i>Oscinella frit</i> • 0,15 L/ha RAPITA: <i>Dasineura brassicae</i>, <i>Psylliodes crysocephala</i>, <i>Athalia rosae</i>, <i>Pieris brassicae</i>, <i>Mamestra brassicae</i> • 0,15 L/ha GRAU, ORZ: <i>Aphids spp.</i>, <i>Haplothrips tritici</i>, <i>Haplodiplosis marginata</i>, <i>Oscinella frit</i> • 0,15 L/ha	
5.	MIDASH 200 SL 200 g/L imidacloprid	SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt.Ltd., INDIA CO: 2705/11.06.2007	—	TOMATE (SPATII PROTEJATE) <i>Liriomyza trifolii</i> • 0,075 % (0,75 L/ha) Se aplică la avertizare CASTRAVETI (SPATII PROTEJATE) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 0,075 % (0,75 L/ha) Se aplică la avertizare	<u>ATENȚIE</u>
6.	MIDASH FORTE 700 g/kg imidacloprid	SHARDA EUROPE B.V.B.A., BELGIA CO: 2635/29.06.2006	—	CASTRAVETI (solarii) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 0,02% (0,2 kg/ha) Se aplică la avertizare	<u>ATENȚIE</u>
7.	ALFAMETRIN 10 EC 100g/L alfa-cipermetrin	SHARDA EUROPE B.V.B.A., BELGIA CO: 2301/12.03.2003	<u>SMRZ:</u> Republica Cehă	GRÂU <i>Eurygaster integriceps</i> • 0,10 L/ha Se aplică la avertizare CEREALE PĂIOASE (GRÂU, ORZ, OVĂZ) <i>Lema spp.</i> • 0,10 L/ha Se aplică la avertizare CEREALE PĂIOASE: <i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Schizaphis graminum</i> • 0,10 L/ha	<u>PERICOL</u>



				Se aplică la avertizare <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Schizaphis graminum</i> • 0,15 L/ha Se aplică la avertizare <u>RAPITĂ</u> <i>Psylloides</i> sp., <i>Meligethes</i> <i>aeneus</i>, <i>Ceutorhynchus</i> sp. • 0,10 L/ha Se aplică la avertizare <u>CARTOF</u> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,10 L/ha Se aplică la avertizare <u>MAZĂRE, FASOLE</u> Afide • 0,10 L/ha Se aplică la avertizare <u>PORUMB</u> <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,15 L/ha Se aplică la avertizare	
--	--	--	--	---	--

REGULATORI DE CREȘTERE

1.	STABILAN 400 g/L cloromequat clorura	NUFARM GmbH&Co. KG, Austria CO: 375/27.12.1974		<u>GRAU:</u> Regulator de creștere • 1,8 - 2 L/ha Se aplica in functie de vigoarea plantei de la inceputul infratirii pana la aparitia frunzei stindard (BBCH 21-37). <u>RAPITA:</u> Regulator de creștere • 2 - 3,75 L/ha Se aplica in functie de vigoarea plantei astfel: -toamna la aparitia a 4-6 frunze (BBCH 14-16) sau -primavara de la inceputul alungirii tulpinii pana la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 30-39).	<u>ATENȚIE</u>
----	---	---	--	--	-----------------------



B. A FOST APROBATĂ A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ

Nr. crt	PRIMA DENUMIRE COMERCIALA	A DOUA DENUMIRE COMERCIALA	Nr. C.O./DATA	DETINATORUL OMOLOGARII
1.	SCATTO	DEMETRINA 25 EC	263PC/19.12.2016	Isagro SPA, Italia
2.	DELTAGRI	FASTER DELTA	439PC/15.11.2018	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Belgia
3.	CYCLONE	FASTER GOLD 50 EC	200PC/03.06.2016	Sparta Research LTD, Irlanda
4.	OMIX DUO	EDEGAL DUO	453PC/15.11.2018	Agria SA, Bulgaria
5.	COPFORCE EXTRA	CUPMAN	456PC/15.11.2018	Agria SA, Bulgaria
6.	TREPACH	DARIUM	473PC/15.11.2018	Agria SA, Bulgaria
7.	SARACEN	FRAGMA	132PC/22.07.2015	Nufarm România SRL
8.	DITHANE NEOTEC 75 WG	AVTAR 75 NT	1322/13.03.1922	Indofil Industries BV, Olanda
9.	WISH TOP	QUICK FORTE	432PC/05.06.2018	Sharda Europe b.v.b.a., Belgia
10.	LEGADO	DIAGONAL	394PC/28.02.2018	Industrias Afrasa SA, Spania
11.	KANTIK 450 EC	SUPREME	277PC/28.02.2017	Adama Agricultural Solutions SRL, România
12.	SULTAN COMPLET	BENGALA	378PC/29.11.2017	Adama Agricultural Solutions SRL, România
13.	TOMIGAN 250 EC	TOMAHAWK	2010/26.08.1999	Adama Agricultural Solutions SRL, România
14.	TOMIGAN XL 102.5 SE	TOMAHAWK XL 102.5SE	108PC/22.07.2015	Adama Agricultural Solutions SRL, România
15.	LEOPARD 5 EC	ERBISTAR	1874/15.12.1998	Adama Agricultural Solutions SRL, România
16.	TRIMMER 50 WG	TRIBERON	215PC/20.10.2016	Adama Agricultural Solutions SRL, România
17.	CONCORDIA 306	DICOTON	388PC/28.02.2018	Adama Agricultural Solutions SRL, România
18.	TRICORN PLUS	PROMAIZE TRIO	372PC/29.11.2017	Sharda Europe b.v.b.a., Belgia
19.	CONFUCIUS	TONGA	448PC/15.11.2018	Rotam Agrochemical Europe Ltd., Anglia

2. REGULAMENTE PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA 12.10.2018 – 07.03.2019

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1796 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos-metil, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxistrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, piraclostrobin, piriproxifen și tritosulfuron;



2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1865 al Comisiei din 28 noiembrie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active propiconazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1913 al Comisiei din 6 decembrie 2018 de reînnoire a aprobării substanței active tribenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1914 al Comisiei din 6 decembrie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active quinoxifen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1915 al Comisiei din 6 decembrie 2018 de aprobare a substanței active *Metschnikowia fructicola* tulpina NRRL Y-27328 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1916 al Comisiei din 6 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanței active bispiribac;
7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1917 al Comisiei din 6 decembrie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active flurtamon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1981 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de reînnoire a aprobării substanțelor active compuși de cupru, ca substanțe susceptibile de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
9. Regulamentul (UE) 2019/38 al Comisiei din 10 ian. 2019 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru iprodion din sau de pe anumite produse;
10. Regulamentul (UE) 2019/50 AL COM din 11 ian. 2019 de modificare a anexelor II, III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al PE și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorantniliprol, clomazon, ciclaniliprol, fenazaquin, fencicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepiquat, ulei de ceapă, tiacloprid și valifenalat din sau de pe anumite produse;
11. Regulamentul (UE) 2019/58 AL COM din 14 ian. 2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru linuron din sau de pe anumite produse;
12. Regulamentul (UE) 2019/88 al Comisiei din 18 ianuarie 2019 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse;
13. Regulamentul (UE) 2019/89 al Comisiei din 18 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bromadiolonă, etofenprox, paclobutrazol și penconazol din sau de pe anumite produse;
14. Regulamentul (UE) 2019/90 al Comisiei din 18 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bromuconazol, carboxin, oxid de fenbutatin, fenpirazamină și piridaben din sau de pe anumite produse;
15. Regulamentul (UE) 2019/91 al Comisiei din 18 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, picoxistrobină și tepraloxidim din sau de pe anumite produse;
16. Reg. de punere în aplicare (UE) 2019/139 al Comisiei din 29 ian. 2019 de aprobare a substanței active *Beauveria bassiana* tulpina IMI389521, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;



17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/158 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de reînnoire a aprobării substanței active metoxifenoimid, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/158 al Comisiei din 31 ian. 2019 de reînnoire a aprobării substanței active metoxifenoimid, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al PE și al Cons privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

19. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/168 AL COMISIEI din 31 ian. 2019 de modificare a Reg. de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectin, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) tulpina QST 713, *Bacillus thuringiensis* subsp. Aizawai, *Bacillus thuringiensis* subsp. israeliensis, *Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki, *Beauveria bassiana*, benfluralin, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximat, fluazinam, flutolanil, fosetil, *Lecanicillium muscarium*, mepanipirim, mepiquat, *Metarhizium anisopliae* var. *Anisopliae*, metconazol, metrafenonă, *Phlebiopsis gigantea*, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* tulpina: MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum*, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61, tiacloprid, tolclofos-metil, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triclopir, trinexapac, triticonazol, *Verticillium albo-atrum* și ziram;

20. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/291 AL COM din 19 febr. 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-naftilacetamidă, acid 1-naftilacetic, acrinatrin, azoxistrobin, fluazifop-P, fluroxipir, imazalil, kresoxim-metil, oxifluorfen, procloraz, prohexadion, spiroxamină, teflutrin și terbutilazină;

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/324 al Comisiei din 25 februarie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active bifentrin, carboxin, FEN 560 (denumit, de asemenea, schinduf sau pudră din semințe de schinduf), pulbere reziduală de piper supus extracției și silicat de aluminiu și sodiu;

22. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/336 AL COMISIEI din 27 febr. 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1141/2010 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 în ceea ce privește statul membru raportor pentru evaluarea substanțelor 1-metilciclopropenă, famoxadon, mancozeb, metiocarb, metoxifenoimid, pirimicarb, pirimifos-metil și tiacloprid

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/337 al Com din 27 febr. 2019 de aprobare a substanței active mefenftruconazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al PE și al Cons privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

3. DIVERSE

1. Domnul **Prof. Univ. Dr. Ioan ROȘCA**, director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, a fost desemnat vicepreședinte CNOPPP de către Academia de Științe Agricole și Silvicultură "Gheorghe Ionescu Șişești".
2. CNOPPP a fost informată despre stadiul evaluării substanței active **benalaxil** pentru care România este stat membru raportor.
3. CNOPPP a stabilit ca până la definitivarea condițiilor privind Brexitul, să nu se mai primească la secretariatul CNOPPP noi aplicații privind omologarea produselor de protecție a plantelor având ca stat membru raportor zonal sau stat membru de referință Marea Britanie.
4. A fost respinsă solicitarea **Regiei Naționale a Pădurilor (ROMSILVA)** privind acordarea unei autorizații temporare pentru produsul de protecție a plantelor **Bactospeine DF**.
5. Au fost respinse solicitările **UNCSV** și Cooperativei Agricole **Argeș Biosud** (membru UNCSV).
6. A fost respinsă solicitarea **PFA Matei Caius Stefan** privind autorizarea pentru situații de urgență a produsului **LITHOS CORNPROTECT**, deoarece conform art.53 al Regulamentului (CE) 1107/2009, nu se justifică situația de urgență.



7. Ca urmare a nesușinerii la nivelul UE a substanței active **cloridazon** de către notificator, compania **BASF**, certificatul de omologare nr. 1839/19.05.1998 al produsului **PYRAMIN TURBO** se retrage de la data de **31.12.2018** și se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **30.06.2019**) și de 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de **30.06.2020**).

8. Ca urmare a aplicării prevederilor Reg. (UE) nr. 1865/2018, privind nereînnoirea aprobării substanței active **propiconazol**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, pentru produsele pe bază de **propiconazol**:

- **ARCHER TURBO** (certificat de omologare nr. 151PC/16.03.2016)
- **ARTEA 330 EC/(CHEFARA-a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2026/17.02.2000)
- **BARCLAY PROPIZOLE EC** (certificat de omologare nr. 074PC/21.01.2015)
- **BUMPER 250 CE** (certificat de omologare nr. 1967/11.04.2001)
- **BUMPER 250 EC** (certificat de omologare nr. 1396/17.05.1993)
- **BUMPER SUPER 490 EC** (certificat de omologare nr. 1564/30.01.1995)
- **MENARA 410 EC** (certificat de omologare nr. 2751/27.03.2008)
- **PROPI 25 EC** (certificat de omologare nr. 153PC/16.03.2016)
- **PROPICO 250 EC/(WETO 250 EC-a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 152PC/16.03.2016)
- **QUILT XCEL** (certificat de omologare nr. 088PC/21.01.2015)
- **RIAS 300 EC** (certificat de omologare nr. 1523/11.03.1994)
- **TILT 250 EC/(BOLT XL-a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 994/19.02.1982),

certIFICATELE de omologare se retrag la data de 19.06.2019 și se acordă o perioadă de grație până la **19.03.2020**. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data **19.09.2019**) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data **19.03.2020**).

9. Certificatul de omologare al produsului **PRIMSTAR SUPER** (certificat de omologare nr. 2249/13.02.2004) se retrage de la data de **14.03.2019** deoarece nu a fost depus dosarul de reînnoire a autorizației conform art. 43 din Reg. (CE) nr. 1107/2009.

10. Compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta compania **Helm AG, Germania** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor în România și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.

11. Pentru produsul **SUMI ALPHA 5 EC/(WIZARD – a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 1526/11.03.1994), compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta compania **Sumitomo Chemical** în procesul de omologare și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.

12. Compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta compania **W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal, Germania** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor în România și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.



13. Compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta companiile **Albaugh Europe SARL** și **Barclay Chemical** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor în România și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
14. Compania **Shartec SRL, România** va reprezenta compania **Globachem NV, Belgia** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
15. Compania **Novagris SRL** va reprezenta compania **Sharda Cropchem Limited, India** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
16. Domnul **Sorin Alexandru STAICU** va reprezenta compania **SBM Developpement SAS Franța** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate, pentru următoarele produse: **SHERPA 100 EW / (CYPERFOR 100 EW**-a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 129PC/22.07.2015), **BELEM 0.8 MG / (PICADOR 0.8 MG** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 095PC/ 21.01.2015), **SHERPA 100 EC** (aflat în procedură de omologare), **COLUMBO 0.8 MG** (aflat în procedură de omologare), **PICADOR 1.6 MG** (aflat în procedură de omologare) și **SHERPA DUO** (aflat în procedură de omologare).
17. Compania **Antaripa PPP SRL, România** va reprezenta compania **SBM Developpement SAS, Franța** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
18. Producătorul produsului **KARATE ZEON/(NINJA** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 1812/04.12.1997) a fost schimbat din **Syngenta Limited Anglia** în **Syngenta Crop Protection AG**.
19. Produsul **KARATE ZEON/(NINJA** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 1812/04.12.1997) a fost transferat de la **Syngenta Limited Anglia** la **Syngenta Agro SRL, România**.
20. Compania **SF Chem** și-a schimbat denumirea în **CABB AG**.
21. Compania **CHEMARK KFT** și-a schimbat denumirea în **CHEMARK ZRT**.
22. Compania **Sipcam SpA** a fost încorporată în compania **Oxon Italia SpA**, noua denumire a companiei fiind **Sipcam Oxon SpA**.
23. Compania **SBM Developement** a schimbat adresa sediului.
24. Denumirea adresei sediului producătorului **AgroFresh INC, SUA** a fost schimbată.
25. Denumirea adresei unității de producție **DORMAGEN** a fost schimbată.
26. A fost schimbată denumirea locației de formulare a produsului **CALARIS PRO/(CLICK PRO** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 336PC/28.08.2017).
27. Denumirea comercială a produsului **CLINIC TF** (certificat de omologare nr. 445PC/15.11.2018) a fost schimbată în **CREDIT 360 SL**.
28. Denumirea comercială a produsului **FOLICUR 25 SE** (certificat de omologare nr. 196PC/03.06.2016) a fost schimbată în **MAGNICUR FUMIGANT**.
29. Denumirea comercială a produsului **CALLISTO TURBO** (certificat de omologare nr. 188PC/03.06.2016) a fost schimbată în **NIKITA**.
30. Denumirea comercială a produsului **MAXIM 025 FS FORMULA M** (certificat de omologare nr. 045PC/29.09.2014) a fost schimbată în **MAXIM 025 FS**.
31. Denumirea comercială a produsului **ALLY 20 SG** (certificat de omologare nr. 374PC/29.11.2017) a fost schimbată în **RIVAL TOP 20 SG**.



32. La solicitarea companiei **Adama**, a fost aprobată o locație adițională pentru formularea produsului **KANTIK 450 EC** (certificat de omologare nr. 277PC/28.02.2017).
33. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL**, a fost aprobată o locație adițională pentru formularea produselor **GOLTIX 700 SC** (certificat de omologare nr. 212PC/20.10.2016) și **GOLTIX GOLD** (aflat în procedură de omologare).
34. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL**, a fost aprobată o locație adițională pentru formularea produsului **GOLTIX TITAN** (certificat de omologare nr. 409PC/28.02.2018).
35. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** au fost aprobate două locații adiționale pentru formularea a 6 produse al căror deținător de omologare este compania Adama.
36. La solicitarea companiei **Summit Agro România SRL** a fost aprobată o locație adițională pentru formularea produsului **KANEMITE SC** (certificat de omologare nr. 170PC/16.03.2016).
37. La solicitarea companiei **Certiplant NV, Belgia** a fost aprobată schimbarea locației de formulare a produsului **ABRINGO** (certificat de omologare nr. 392PC/28.02.2018).
38. La solicitarea companiei **Belchim**, a fost aprobată o locație adițională pentru formularea produsului **CYMCO SUPER/ (PROFILUX** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 140PC/16.03.2016).
39. La solicitarea companiei **Nufarm România SRL** au fost aprobate două locații adiționale de formulare și reambalare a următoarelor produse: **ACCURATE** (certificat de omologare nr. 130PC/22.07.2015), **ACCURATE EXTRA / (RACING EXTRA** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 099PC/21.01.2015), **NUANCE 75 WG / (PRIMMA STAR** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 066PC/29.09.2014), **PELICAN DELTA 606 WG** (certificat de omologare nr. 2775/27.03.2008), **SARACEN** (certificat de omologare nr. 132PC/22.07.2015), **SARACEN MAX / (LECTOR MAX** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 218PC/20.10.2016).
40. La solicitarea companiei **Nufarm România SRL** a fost aprobată o locație adițională pentru formularea și reambalarea produsului **ZAMIR 40 EW / (AMPERA** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 2144/18.04.2002).
41. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem, India** au fost aprobate două locații alternative pentru formularea produsului **SHARPEN 33 EC / (SHIP 33 EC** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 104PC/21.01.2015).
42. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem, India** au fost aprobate trei locații alternative pentru formularea produsului **TRIBE 75 WG / (FIGHTER** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 217PC/20.10.2016).
43. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem, India** a fost aprobată o locație alternativă pentru formularea produsului **SHARPEN 40 SC / (PENDISOL 40 SC** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 329PC/29.06.2017).
44. La solicitarea companiei **UPL Europe LTD** a fost aprobată o fabrică adițională pentru formularea următoarelor produse: **FINY** (certificat de omologare nr. 102PC/21.01.2015), **MANZATE 75 DF** (certificat de omologare nr. 2211/20.08.2003), **NAUTILE** (certificat de omologare nr. 230PC/20.10.2016), **PLANET 72 WP** (certificat de omologare nr. 2068/02.11.2000), **SACRON WG** (certificat de omologare nr. 119PC/22.07.2015), **VONDOZEB 75DG** (certificat de omologare nr. 1399/17.05.1993).
45. La solicitarea companiei **Alchimex**, a fost aprobată o locație alternativă pentru formularea produsului **RIVAL TOP 20 SG** (certificat de omologare nr. 374PC/29.11.2017).



46. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** a fost aprobată o locație adițională pentru formularea produsului **GOLTIX TITAN** (certificat de omologare nr. 409PC/28.02.2018).
47. La solicitarea companiei **Belchim Crop Protection**, au fost aprobate două locații adiționale pentru formularea produsului **FAXER** (certificat de omologare nr. 361PC/ 29.11.2017).
48. La solicitarea companiei **Innvigo Sp.z.o.o.**, Polonia au fost aprobate noi locații adiționale de formulare pentru produsul **RINCON 25 SG / (EGZECUTOR 25 SG – a doua denumire comerciala)** (certificat de omologare nr. 147PC/16.03.2016) și un ambalaj adițional de **30g** din același material cu ambalajele omologate.
49. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *dicamba*.
50. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *clorotalonil*.
51. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *lambda-cihalotrin*.
52. La solicitarea companiei **BASF SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *dimetomorf*.
53. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *captan*.
54. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *fenmedifam*.
55. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *desmedifam*.
56. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *procloraz*.
57. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *fluazinam*.
58. La solicitarea companiei **Biocontrol Technologies SL** au fost aprobate două surse noi pentru substanța activă *Trichoderma asperellum*.
59. La solicitarea companiei **Bayer AG, Germania** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *diflufenican*.
60. La solicitarea companiei **Rotam Agrochemical** au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă *tebuconazol*.
61. La solicitarea companiei **Nufarm România SRL** a fost aprobată o nouă sursă pentru substanța activă *procloraz*.
62. La solicitarea companiei **ISK Biosciences Europe** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *flonicamid*.
63. La solicitarea companiei **Arysta Lifescience** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *clorpirifos-metil*.
64. La solicitarea companiei **Innvigo Sp.z.o.o.**, Polonia a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *metazaclor*.
65. La solicitarea companiei **Innvigo Sp.z.o.o.**, Polonia a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *picloram*.
66. La solicitarea companiei **Dow Agrosciences** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *clopiralid*.
67. La solicitarea companiei **Bayer AG, Germania** a fost aprobată o nouă sursă pentru safenerul *ciprosulfamida*.



68. La solicitarea companiei **ISK Biosciences**, au fost aprobate ambalaje adiționale de 15L din material HDPE și de 1L, 5L, 10L și 15L din material COEX (PE/PA) pentru produsul **MILDICUT / (YSAYO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2515/22.05.2005).
69. La solicitarea companiei **ISK Biosciences**, au fost aprobate ambalaje adiționale de 1L, 5L și 10L din material COEX (PE/PA) pentru produsul **VIDERYO F** (certificat de omologare nr. 208PC/20.10.2010).
70. La solicitarea companiei **Gowan Crop Protection**, au fost aprobate ambalaje adiționale de 15g, 100g, 250g, 500g, 1000g, din același material cu cel omologat, pentru produsul **ELECTIS 75 WG** (certificat de omologare nr. 2102/11.04.2001).
71. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL, România** au fost aprobate ambalaje adiționale de 0,5L și 1,0L, din același material cu cel omologat, pentru produsul **AMINO 600 SL** (certificat de omologare nr. 2530/22.02.2005).
72. La solicitarea companiei **Belchim Crop Protection** au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul **MILBEKNOCK EC**, după cum urmează: 100 mL material HDPE/PA, 500 mL HDPE/EVOH, HDPE/PA, HPDE/, 1L HDPE/PA, PET, HDPE/EVOH, 5L PEHD/EVOH sau PEHD/PA și 10L HDPE/PA.
73. La solicitarea companiei **Syngenta** a fost aprobată modificarea minoră din compoziția formulărilor pe bază de apă notificate la CNOPPP.
74. La solicitarea companiei **Monsanto România SRL**, au fost aprobate modificările minore din compoziția produselor **ROUNDUP GEL MAX** (certificat de omologare nr. 298PC/28.02.2017) și **ROUNDUP GEL** (certificat de omologare nr. 131PC/22.07.2015).
75. La solicitarea companiei **Monsanto România SRL**, a fost aprobată modificarea minoră din compoziția produselor **ROUNDUP CLASSIC PRO** (certificat de omologare nr. 136PC/22.07.2015) și **ROUNDUP ENERGY** (certificat de omologare nr. 009PC/28.05.2012).
76. Începând cu data de **14.03.2019**, se retrage a doua denumire comercială „**FASTER GOLD 50 EC**” a produsului **LAMDEX 5 EC** (certificat de omologare nr. 2243/13.12.2004).
77. Începând cu data de **14.03.2019**, se retrage produsul **MOLTOVIN** (certificat de omologare nr. 2842/06.11.2009), deoarece deținătorul de omologare, compania **Nufarm România SRL**, nu mai susține acest produs în cadrul etapei a II-a a procesului de reomologare.
78. Erată la ședința CNOPPP din **15.11.2018**, lit. A - RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ, secțiunea **MOLUSCOCIDE**, numărul curent 1: produsul de protecție a plantelor **SLIMAX** a fost aprobat a fi utilizat și la “plante ornamentale – limacși - 7 kg/ha (0,7 g/m²)”.
79. Erată la ședința CNOPPP din **15.11.2018**, lit. A - RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ, secțiunea **INSECTICIDE**, numărul curent 3: pentru produsul de protecție a plantelor **PIRIGRAIN 50**, doza corectă de aplicare este de **6-8 L/100 tone de cereale**.
80. Revenim la documentul “**LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA 15.11.2018**, lit. C, pct. 2 - aprobare permis de comerț paralel, cu precizarea că domeniul de utilizare pentru **AZOXAN 250**, este următorul:



Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT	NR.PERMIS DE COMERT PARALEL (P.C.P.) DENUMIRE COMERCIALA PRODUS	CULTURA	ORGANISMUL DĂUNĂTOR	DOZA
2.	AZOXAN 250 250 g/L azoxistrobin	SC AGROVENA SRL	P.C.P. NR.3/15.11.2018	GRÂU DE TOAMNĂ	<i>Blumeria graminis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> <i>Fusarium spp.</i>	0,8 L/ha
				ORZ DE TOAMNĂ	<i>Pyrenophora teres</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Fusarium spp.</i>	0,8 L/ha
				ORZ DE PRIMAVARA	<i>Pyrenophora teres</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Fusarium spp.</i>	0,8 L/ha
				RAPITA PENTRU ULEI	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Alternaria brassicae</i>	1,0 L/ha
				CARTOF	<i>Alternaria spp.</i>	0,5 L/ha

81. Revenim la documentul "LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN SEDINȚA DIN DATA 15.11.2018, secțiunea DIVERSE, punctul nr. 24, cu următoarea precizare: „activitatea companiei TSGE d.o.o., Slovenia a fost preluată de către compania TSG Consulting Limited, Marea Britanie” și nu de către compania Artemisa d.o.o., Slovenia.

PREȘEDINTE,

Paulina GABOR

