

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
 A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR

**1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA
 DIN DATA DE 24.03.2022**

A. OMOLOGARE

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ (art.33-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)					
FUNGICIDE					
1.	FULIAL 250 g/L azoxistrobin	AGRIA S.A., Bulgaria CO:724PC/24.03.2022	SMRZ: Romania	CASTRAVETI (CÂMP, SPATII PROTEJATE): <i>Erysiphe</i> spp. <i>Oidiopsis</i> spp. <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) TOMATE (CÂMP, SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria</i> spp. <i>Leveillula taurica</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Cladosporium</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) ARDEI (CÂMP, SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria capsici annui</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) CEAPĂ, ARPAGIC PENTRU FRUNZE (CÂMP): <i>Alternaria porri</i> <i>Peronospora destructor</i> <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Puccinia allii</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție)	ATENȚIE

				<u>CEAPĂ VERDE (CÂMP):</u> <i>Alternaria porri</i> <i>Peronospora destructor</i> <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Puccinia allii</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>MORCOV (CÂMP):</u> <i>Alternaria dauci</i> <i>Erysiphe spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>CARTOF (CÂMP):</u> <i>Alternaria spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>CARTOF (APLICARE PE RÂND):</u> <i>Rhizoctonia solani</i> • 3,0 L/ha <u>BROCCOLI:</u> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>ZUCCHINI, DOVLEAC (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Colletotrichum lagenarium</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Cladosporium cucumerinum</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>CĂPSUN (SPATII PROTEJATE):</u> <i>Sphaerotheca macularis</i> <i>Colletotrichum acutatum</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>CONOPIDĂ (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Albugo candida</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>GRÂU:</u> <i>Alternaria spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Erysiphe graminis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>FASOLE (CÂMP):</u> <i>Ascochyta spp.</i> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
--	--	--	--	---



			<i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>MAZĂRE (CÂMP):</u> <i>Ascochyta pisi</i> <i>Peronospora viciae</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Mycosphaerella pinodes</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>ORZ:</u> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Erysiphe graminis</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Pyrenophora teres</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>PEPENE GALBEN, PEPENE VERDE:</u> <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Spaerotheca fuliginea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>PORUMB (INSILOZARE ȘI PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ):</u> <i>Helminthosporium spp.</i> <i>Puccinia sorghi</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>RAPITĂ:</u> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Leptosphaeria maculans</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>PLANTE ORNAMENTALE (CÂMP ȘI SPĂȚII PROTEJATE):</u> <i>Podosphaera xanthii</i> <i>Puccinia horiana</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Albugo candida</i> <i>Alternaria spp.</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Peronospora spp.</i> <i>Phoma spp.</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Septoria spp.</i> <i>Pythium spp.</i> • 0,8-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>PLANTE ORNAMENTALE(CÂMP ȘI SPĂȚII PROTEJATE):</u> <i>Rhizoctonia spp.</i> • 3,0 L/ha (aplicare prin încorporare în sol) <u>PRAZ (CÂMP):</u> <i>Alternaria porri</i>	
--	--	--	--	--



				<i>Phytophthora porri</i> <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Puccinia allii</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>SALATĂ (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Erysiphe spp.</i> <i>Bremia lactucae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Rhizoctonia solani</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>SECARĂ:</u> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Puccinia recondita</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>TRITICALE:</u> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Erysiphe graminis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>VINETE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria solani</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Phytophthora infestans</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>VARZĂ (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria brassicicola</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>VARZĂ DE BRUXELLES (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție)	
2.	BOTREFIN 375 g/kg ciprodinil + 250 g/kg fludioxonil	Finchimica S.p.A., Italia CO:744PC/24.03.2022	SMRZ: România	<u>AFIN:</u> <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia spp.</i> • 1,0 kg/ha <u>AGRIS:</u> <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Monilia spp.</i> • 1,0 kg/ha <u>COACĂZ:</u> <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Monilia spp.</i> • 1,0 kg/ha	ATENȚIE



				ARDEI: <i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia spp.</i> • 0,8-1,0 kg/ha CĂPȘUN: <i>Botrytis spp.</i> <i>Colletotrichum spp.</i> • 1,0 kg/ha PLANTE ORNAMENTALE (SPATII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea</i> <i>Monilia spp.</i> • 0,8 kg/ha CAIS: <i>Monilia spp.</i> • 0,8-1,0 kg/ha CIRES: <i>Monilia spp.</i> • 1,0 kg/ha PIERSIC, NECTARIN, PRUN: <i>Monilia spp.</i> • 0,8-1,0 kg/ha CASTRAVETI: <i>Sclerotinia spp.</i> <i>Botrytis spp.</i> • 0,8-1,0 kg/ha CEAPĂ, USTUROI: <i>Sclerotinia spp.</i>, <i>Botrytis spp.</i> • 1,0 kg/ha FASOLE: <i>Botrytis spp.</i>, <i>Sclerotinia spp.</i>, <i>Colletotrichum spp.</i> • 1,0 kg/ha GUTUI, PAR : <i>Monilia spp.</i> <i>Gloeosporium spp.</i> <i>Venturia spp.</i> • 0,8-1,0 kg/ha MĂR : <i>Monilia spp.</i> • 0,8-1,0 kg/ha MAZĂRE: <i>Botrytis spp.</i> <i>Sclerotinia spp.</i> <i>Colletotrichum spp.</i> • 1,0 kg/ha MORCOV: <i>Sclerotinia spp.</i> • 1,0 kg/ha <i>Alternaria spp.</i> • 0,8 kg/ha	
--	--	--	--	--	--



				SALATĂ: <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia</i> spp. • 0,8 kg/ha TELINĂ: <i>Sclerotinia</i> spp. • 0,8 kg/ha TOMATE, VINETE: <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8-1,0 kg/ha VITĂ DE VIE: <i>Aspergillus</i> spp. • 0,8-1,0 kg/ha VITĂ DE VIE (STRUGURI DE MASA SI DE VIN): <i>Botrytis cinerea</i> • 0,6-1,0 kg/ha MUR, ZMEUR: <i>Botrytis</i> spp., <i>Didimella</i> spp. • 1,0 kg/ha	
3.	LS-AZOXY 250 g/L azoxistrobin	Life Scientific Ltd., Irlanda CO:745PC/24.03.2022	SMRZ: România	CASTRAVETI (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Erysiphe</i> spp. <i>Oidiopsis</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) TOMATE (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE): <i>Phytophthora infestans</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Alternaria</i> spp. <i>Cladosporium</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) ARDEI (CÂMP, SPAȚII PROTEJATE): <i>Leveillula taurica</i> <i>Alternaria capsici annui</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) CEAPĂ (CÂMP): <i>Alternaria porii</i> <i>Peronospora destructor</i> <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Puccinia allii</i> <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) CEAPĂ VERDE (CÂMP): <i>Alternaria porri</i> <i>Peronospora destructor</i> <i>Cladosporium allii-porri</i>	ATENȚIE



			<i>Puccinia allii</i> <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) ARPAGIC PENTRU FRUNZE (CÂMP): <i>Alternaria porri</i> <i>Peronospora destructor</i> <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Puccinia allii</i> <i>Sclerotium cepivorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) MORCOV (CÂMP): <i>Erysiphe spp.</i> <i>Alternaria dauci</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) CARTOF (CÂMP): <i>Alternaria spp.</i> • 0,5-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) CARTOF (APLICARE PE RÂND): <i>Rhizoctonia solani</i> • 3,0 L/ha BROCCOLI: <i>Alternaria brassicae</i> <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) ZUCCHINI, DOVLEAC (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Cladosporium cucumerinum</i> <i>Colletotrichum lagenarium</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Peronospora spp.</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) CÂPSUN (SPATII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca macularis</i> <i>Colletotrichum acutatum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) CONOPIDĂ (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria brassicae</i> <i>Albugo candida</i> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i> <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> <i>Fusarium spp.</i>	
--	--	--	--	--



				<i>Alternaria</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>FASOLE (CÂMP):</u> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Uromyces viciaefabae</i> <i>Ascochyta</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>MAZĂRE (CÂMP):</u> <i>Ascochyta pisi</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Mycosphaerella pinodes</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Peronospora viciae</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>ORZ:</u> <i>Erysiphe graminis</i> <i>Pyrenophora teres</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Fusarium</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>PEPENE GALBEN, PEPENE VERDE:</u> <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Spaerotheca fuliginea</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>PORUMB (ÎNSILOZARE ȘI PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ):</u> <i>Helminthosporium</i> spp. <i>Puccinia sorghi</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>RAPITĂ:</u> <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (in funcție de gradul de infecție) <u>PLANTE ORNAMENTALE(CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Microsphaera</i> spp. <i>Podosphaera xanthii</i> <i>Puccinia horiana</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Albugo candida</i> <i>Alternaria</i> spp. <i>Ascochyta</i> spp. <i>Botrytis</i> spp. <i>Cladosporium</i> spp. <i>Colletotrichum</i> spp. <i>Glomerella cingulata</i> <i>Peronospora</i> spp.	
--	--	--	--	--	--



			<i>Phoma</i> spp. <i>Phytophthora infestans</i> <i>Plasmopara</i> spp. <i>Pythium</i> spp. <i>Septoria</i> spp. <i>Stemphylium</i> spp. • 0,8-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>PLANTE ORNAMENTALE (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Rhizoctonia</i> spp. • 3,0 L/ha (aplicare prin încorporare în sol) <u>PEPINIERE FORESTIERE:</u> <i>Melampsora capraearum</i> <i>Colletotrichum trifolii</i> <i>Glomerella cingulata</i> <i>Phoma</i> spp. <i>Septoria</i> spp. <i>Lophodermella concolor</i> <i>Lophodermium pinastri</i> • 0,8-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>PAZ (CÂMP):</u> <i>Cladosporium allii-porri</i> <i>Alternaria porri</i> <i>Phytophthora porri</i> <i>Puccinia allii</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>SALATĂ (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Bremia lactucae</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Erysiphe</i> spp. <i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>SECARĂ:</u> <i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>TRITICALE:</u> <i>Erysiphe graminis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> <i>Fusarium</i> spp. • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) <u>VINETE (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE):</u> <i>Alternaria solani</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Phytophthora infestans</i> • 0,75-1,0 L/ha	
--	--	--	---	--



				(în funcție de gradul de infecție) VARZĂ (CÂMP SI SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria brassicicola</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Albugo candida</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) VARZĂ DE BRUXELLES (CÂMP SI SPATII PROTEJATE): <i>Alternaria brassicae</i> <i>Albugo candida</i> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție)	
4.	RESSIVI 375 g/L acibenzolar-S-metil	Syngenta Agro SRL CO:746PC/24.03.2022	SMRZ: Spania	FLOAREA SOARELUI: <i>Plasmopara halstedii</i> • 10 mL/150 000 de semințe Tratament sămânță.	ATENȚIE
5.	LUMISENA 200 FS 200 g/L oxatiapiprolin	Corteva Agriscience România SRL CO:747PC/24.03.2022	SMRZ: Spania	FLOAREA SOARELUI: <i>Plasmopara halstedii</i> • 6,1 mL/ha/ 65000 semințe echivalent cu (93,75 μg/sămânță) Tratament sămânță.	ATENȚIE
6.	REYONA 75 g/L mefentrifluconazol	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch CO:748PC/24.03.2022	SMRZ: Austria	MĂR, PĂR: <i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> <i>Stemphylium</i> sp. • 1,3 L / 10.000 m² suprafața foliară tratată CIRES, PRUN, PIERSIC, CAIS, NECTARIN: <i>Monilinia</i> spp. • 1,0 L / 10.000 m² suprafața foliară tratată VITĂ DE VIE (STRUGURI DE MASĂ SI PENTRU VIN): <i>Erysiphe necator</i> <i>Guignardia bidwellii</i> • 1,0 L / 10.000 m² suprafața foliară tratată	ATENȚIE
7.	REYVIT 75 g/L mefentrifluconazol	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch CO:749PC/24.03.2022	SMRZ: Austria	RAPITĂ DE TOAMNĂ, RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ: <i>Plenodomus lingam</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Alternaria</i> spp. <i>Hyaloperonospora parasitica</i> <i>Verticillium</i> sp. <i>Pyrenopeziza brassicae</i> • 0,75-1,5 L/ha Se aplică în stadiul de 3-8 frunze (BBCH 13 – 18). La aplicarea în toamnă se pot face 2 tratamente secvențiale (0,75 L/ha +0,75 L/ha), la un interval de 7-14 zile între tratamente. • 0,75-1,5 L/ha Se aplică de la primul internod până la apariția butonilor florari (BBCH 31-55). • 1,0-2,0 L/ha Se aplică în timpul înfloririi (BBCH 31-41).	ATENȚIE



			55). Se aplică maxim 2 tratamente, alegând 2 variante din cele 3 recomandate. FLOAREA SOARELUI: <i>Diaporthe helianthin</i> <i>Plenodomus lindquistii</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Alternaria helianthin</i> • 1,0-1,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente. SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola</i> <i>Erysiphe betae</i> <i>Uromyces betae</i> <i>Ramularia beticola</i> • 0,7-1,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente. PORUMB BOABE ȘI PORUMB PENTRU SILOZ: <i>Setosphaeria turcica</i> <i>Kabatiella zeae</i> <i>Fusarium</i> spp. <i>Puccinia sorghi</i> • 0,75-1,25 L/ha Se aplică maxim 1 tratament. PORUMB DULCE: <i>Setosphaeria turcica</i> <i>Kabatiella zeae</i> <i>Fusarium</i> spp. <i>Puccinia sorghi</i> • 0,75-1,25 L/ha Se aplică maxim 1 tratament.	
--	--	--	---	--

ERBICIDE

1.	AXIAL ONE 5 g/L florasulam + 45 g/L pinoxaden + 11,25 g/L cloquintocet-mexil (safener)	Syngenta Agro SRL CO: 2852/17.12.2009	SMRZ: Marea Britanie	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: GRÂU, ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ, ORZ, SECARĂ, TRITICALE: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Apera spica venti</i>, <i>Avena</i> sp., <i>Lolium</i> sp., <i>Alopecurus myosuroides</i>) Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Samulastra de rapiță-Brassica napus</i>, <i>Abutilon theophrasti</i>, <i>Adonis vernalis</i>, <i>Ambrosia artemisiifolia</i>, <i>Anagallis arvensis</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Centaurea cyanus</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Descurainia sophia</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Galium aparine</i>, samulastra de floarea soarelui- <i>Helianthus annuus</i>, <i>Lithospermum arvense</i>, <i>Matricaria</i> sp., <i>Myosotis arvensis</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Polygonum</i> sp., <i>Raphanus sativus</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Sisymbrium officinale</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Viola arvensis</i>) • 0,75 - 1,0* L/ha (în funcție de gradul de	ATENȚIE



				îmburuienare) Se aplică postemergent, de la prima frunză desfășurată până la apariția frunzei standard (BBCH 11-39), iar buruienile se află în stadiul activ de creștere și dezvoltare.	
2.	BASAR 960 g/L S-metolacior	Galenika-Fitofarmacija d.o.o., Slovenia CO: 483PC/14.03.2019	SMRZ: România	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: FLOAREA SOARELUI: Buruieni anuale monocotiledonate și unele dicotiledonate • 1,0 - 1,5 L/ha Se aplică preemergent de la semănat până înainte de răsărirea culturii (BBCH 00 – 08)	ATENȚIE
3.	ASUNAC 300 g/L sulcotrionă	Adama Agricultural Solutions SRL, România CO:750PC/24.03.2022	SMRZ: România	PORUMB: Buruieni anuale dicotiledonate • 1,5 L/ha Se aplică postemergent, în stadiul de 2 - 8 frunze ale culturii (BBCH 12-18) iar buruienile se află în fenofaza de 2 - 4 frunze.	ATENȚIE
4.	CLERAVO FLEX 4 g/L aminopirialid + 12,5 g/L imazamox 125 g/L quinmerac	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch, Puerto Rico CO:751PC/24.03.2022	SMRZ: Polonia	RAPITĂ DE TOAMNĂ (HIBRIZI CLEARFIELD) – APLICARE ÎN TOAMNĂ: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate: (ex: <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Sisymbrium officinale</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Anthemis arvensis</i> , <i>Apera spica-venti</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i>) • 1,4 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de cotiledonae complet dezvoltate până la apariția a 8 frunze (BBCH 10-18). RAPITĂ DE TOAMNĂ (HIBRIZI CLEARFIELD) – APLICARE ÎN PRIMĂVARĂ: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate: (ex: <i>Galium aparine</i> , <i>Hibiscus trionum</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Descurania sophia</i> , <i>Thlaspi arvense</i>) • 1,4 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent de la începutul alungirii tulpinii până în stadiul de 3 internoduri vizibile (BBCH 30-33).	ATENȚIE
5.	ELTIVIS 250 g/L fluroxipir	AGRIA S.A., Bulgaria CO:752PC/24.03.2022	SMRZ: România	GRĂU ȘI ORZ DE TOAMNĂ Buruieni dicotiledonate anuale și perene: (ex: <i>Ambrosia artemisiifolia</i> , <i>Consolida regalis</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Galeopsis tetrahit</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Rubus</i> sp., <i>Stellaria media</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Veronica hederifolia</i> , etc.))	PERICOL



				• 0,6-0,8 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până în stadiul de frunză standard (BBCH 12-39), iar buruienile se află în fenofaza de 2-4 frunze.	
--	--	--	--	---	--

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 - 42 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

FUNGICIDE

1.	AZOKSAR 250 SC 250 g/L azoxistrobin	CIECH Sarzyna S.A., Polonia CO: 565PC/20.11.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: RAPITA DE TOAMNĂ <i>Alternaria brassicae,</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,8-1,0 L/ha Se aplică la începutul înfloritului până la 10% silicve mature (BBCH 60-71).	ATENȚIE
2.	METOMORF 113 g/kg dimetomorf + 600 g/kg folpet	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:753P C/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 1,5 kg/ha Se aplică din faza de 5 frunze desfăcute până la intrarea în pârgă (strugurii încep să prezinte culoarea specifică soiului BBCH 15-81); 3 tratamente.	ATENȚIE
3.	METSO 60 EC 60 g/L metconazol	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:754PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRĂU DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ: <i>Puccinia spp., Fusarium spp.,</i> <i>Septoria spp.</i> • 1,5 L/ha Se aplică de la formarea primului nod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59). Pentru <i>Fusarium spp.</i>, tratamentul se aplică la apariția urechiușei (BBCH 51- 59). ORZ DE TOAMNĂ: <i>Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis</i> • 1,5 L/ha Se aplică de la formarea primului nod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59).	PERICOL
4.	KAPLAN 80 WG 800 g/kg captan	Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia CO:755PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	MAR: <i>Venturia inaequalis</i> • 1,9 kg/ha Se aplică de la stadiul de muguri verzi până la stadiul de coacere (BBCH 56-85). PĂR: <i>Venturia pirina, Monilinia fructigena</i> • 1,8 kg/ha Se aplică de la stadiul de umflare a mugurilor până la stadiul de coacere a fructelor (BBCH 51-81). VISIN, CIRES: <i>Glomerella cingulate, Blumeriella jaapii</i>	PERICOL



				• 1,9 kg/ha Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la stadiul de coacere a fructelor (BBCH 69-87). ZMEUR: <i>Botrytis cinerea, Elsinoë veneta</i> • 1,9 kg/ha Se aplică de la începutul înfloririi până la stadiul de coacere a fructelor (BBCH 60-87). COACĂZ NEGRU, COACĂZ ROȘU: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,9 kg/ha Se aplică de la începutul înfloririi până la stadiul de coacere a fructelor (BBCH 60-87). AFIN: <i>Botrytis cinerea, Colletotrichum gloeosporioides</i> • 1,9 kg/ha Se aplică de la începutul înfloririi până la stadiul de coacere a fructelor (BBCH 60-87). AGRIȘ: <i>Botrytis cinerea, Drepanopeziza ribis (syn. pseudopeziza ribis)</i> • 1,8 kg/ha Se aplică de la începutul înfloririi până la stadiul de coacere a fructelor (BBCH 60-87). CĂPSUN: <i>Botrytis cinerea, Colletotrichum acutatum</i> • 1,9 kg/ha Se aplică înainte de înflorire (BBCH 53-59). PLANTE ORNAMENTALE (PRIN PULVERIZARE/ PRIN ÎNMUIEREA BULBILOR): <i>Botrytis cinerea, Septoria spp., Stromatinia gladioli Colletotrichum acutatum, Exobasidium vaccinii, Phytophthora cinnamomic, Pseudomonas syringae pv. Syringae Colletotrichum destructivum Coniothyrium versendorffiae Coniothyrium fuckelli Sclerotinia sclerotiorum Penicillium carymbiferum, Fusarium spp</i> • 1,2 - 1,9 kg/ha Se aplică pe parcursul întregului sezon de vegetație (BBCH 10-79).	
5.	AFRODYTA 250SC 250 g/L azoxistrobin	Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: GRĂU DE PRIMĂVARĂ: <i>Blumeria graminis, Septoria</i>	ATENȚIE



		CO:583PC/03.02.2020		<i>tritici/Mycosphaerella graminicola, Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la formarea primului internod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59). TRITICALE DE TOAMNĂ: <i>Blumeria graminis, Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la formarea primului internod până la apariția frunzei stindard (BBCH 31-39). TRITICALE DE PRIMĂVARĂ: <i>Blumeria graminis, Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la formarea primului internod până la apariția frunzei stindard (BBCH 31-39). SECARĂ DE TOAMNĂ: <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la formarea primului internod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59). RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis spp., Alternaria brassicae</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul înfloririi până la sfârșitul înfloririi (BBCH 60-69).	
6.	PESMUS 60 g/kg cimoxanil + 461 g/kg hidroxid de cupru	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd, Bulgaria CO:756PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN BULGARIA	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 2,0 kg/ha Se aplică la apariția primelor simptome, de la formarea lăstarilor (>5 cm) până la formarea fructelor (BBCH 21-90). TOMATE: <i>Phytophthora infestans, Alternaria solani</i> • 2,0 kg/ha Se aplică la apariția primelor simptome, de la prima inflorescență vizibilă până la dezvoltarea primelor fructe (BBCH 51-71). VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 2,0 kg/ha Se aplică la apariția primelor simptome, de la începutul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 55-80).	ATENȚIE



INSECTICIDE

1.	ARTEMIDE 222 g/L lambda cihalotrin	Sipcam Oxon S.p.A, Italia CO:757PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>ITALIA</u>	PORUMB: <i>Agriotes spp.</i>, <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> • 90 mL/25 000 semințe Tratament sămânță. FLOAREA SOARELUI: <i>Agriotes spp</i> • 270 mL/75 000 semințe • 235 mL/65 000 semințe Tratament sămânță.	PERICOL
2.	AFFIRM TOP 9,5 g/kg emamectin benzoat	Syngenta Crop Protection AG, Elveția CO:758PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	MĂR: <i>Adoxophyes spp.</i>, <i>Cydia pomonella</i>, <i>Grapholita molesta</i>, <i>Leucoptera xitella</i>, <i>Lithocolletis spp.</i>, <i>Lithocolletis</i> <i>blancardella</i>, (<i>Phyllonorycter</i> <i>blancardella</i>), <i>Pandemis spp.</i>, <i>Archips</i> <i>sp.</i>, <i>Argyrotaenia sp.</i> • 2,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : De la fructe cu dimensiunea de până la 10 cm până când fructele ajung la maturitate (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. VINETE (CÂMP, SERE, SOLARII): <i>Tuta absoluta</i>, <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Spodoptera sp.</i>, <i>Autographa gamma</i> (<i>Plusia gamma</i>) • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : De la apariția primei frunze adevărate până la inflorescențe vizibile (BBCH 11-55). sau De când primele fructe ating dimensiunea tipică până ajung la maturitate (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. FASOLE (CÂMP, SERE, SOLARII): <i>Helicoverpa spp.</i>, <i>Spodoptera spp.</i> • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u>: De la începutul dezvoltării păstăilor până când păstaile ajung la maturitate (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. BROCCOLI, CONOPIDĂ (CÂMP) : <i>Helicoverpa spp.</i>, <i>Mamestra</i> <i>brassicae</i>, <i>Mamestra oleracea</i>, <i>Pieris spp.</i>, <i>Autographa gamma</i> (<i>Plusia gamma</i>), <i>Plutella xylostella</i>, <i>Spodoptera spp.</i>, <i>Agrotis sp.</i> • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : Căpățânile încep să se formeze până se ajunge la maturitate (BBCH 41-49). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor.	ATENȚIE



TOMATE (CÂMP, SERE, SOLARII):

Helicoverpa armigera, *Tuta absoluta*,
Spodoptera sp., *Autographa gamma*
(*Plusia gamma*), *Agrotis* sp.

- 1,5 kg/ha

Se aplică astfel:

Cultura : De la apariția primei frunze
adeverate până la inflorescențe
vizibile (BBCH 11-55).

sau

Când primele fructe ating
dimensiunea tipică până ajung la
maturitate (BBCH 71-89)

Dăunători : la apariția dăunătorilor.

**VARZĂ ALBĂ, VARZĂ ROSIE,
VARZĂ DE BRUXELLES, VARZĂ
CHINEZEASCĂ (CÂMP):**

Helicoverpa spp., *Mamestra*
brassicae, *Mamestra oleracea*,
Spodoptera spp., *Pieris* spp., *Plutella*
sp., *Autographa gamma* (*Plusia*
gamma), *Agrotis* sp.

- 1,5 kg/ha

Se aplică astfel:

Cultura : Căpățânile încep să se
formeze până ajung la maturitate
(BBCH 41-49).

Dăunători : la apariția dăunătorilor.

CĂPSUN (CÂMP, SERE, SOLARII):

Helicoverpa armigera, *Acleris*
comariana, *Ancyliis comptana*,
Spodoptera spp., *Drosophilla suzukii*,
Acleris comptana, *Acleris comariana*,
Helicoverpa armigera, *Spodoptera*
frugiperda, *Spodoptera exigua*

- 1,5 kg/ha

Se aplică astfel:

Cultura : De la apariția primei frunze
până la apariția primelor flori (BBCH
11-55).

Dăunători : la apariția dăunătorilor.

**ZMEUR, MUR, COACĂZ (ALB ȘI
NEGRU), AGRIS (CÂMP):**

Pandemis cerasana, *Pandemis*
heparana, *Archips rosanus*, *Archips*
podanus, *Drosophilla suzukii*

- 1,25 - 1,5 kg/ha

Se aplică astfel:

Cultura : De la apariția primei frunze
până la apariția primelor flori (BBCH
11-55).

Dăunători : la apariția dăunătorilor.

AFIN, MERIȘOR (CÂMP):

Rhopobota naevana, *Adoxophyes*
orana, *Archips rosanus*, *Pandemis*
heparana, *Drosophilla suzukii*

- 1,25 - 1,5 kg/ha

Se aplică astfel:

Cultura : De la apariția primei frunze
până la apariția primelor flori (BBCH

			11-55). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>CASTRAVETI, DOVLECEI, ZUCCHINI (CÂMP, SERE, SOLARII):</u> <i>Helicoverpa spp., Spodoptera spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp.</i> • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : De la prima frunză adevărată până la apariția primelor flori (BBCH 11-55). sau De când primele fructe ating dimensiunea și forma tipică până când fructele ajung la maturitate (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>ARDEI (CÂMP, SERE, SOLARII):</u> <i>Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp.</i> • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : De la prima frunză adevărată până la apariția primelor flori (BBCH 11-55). sau De când primele fructe ating dimensiunea și forma tipică până când fructele ajung la maturitate (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>KALE, VĂRZOASE (CÂMP):</u> <i>Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., Pieris spp., Plutella sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp.</i> • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : Căpățânile încep să se formeze până la maturitate (BBCH 41-49). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>SALATĂ, CICOARE, RUCOLĂ (CÂMP):</u> <i>Helicoverpa spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp., Spodoptera spp.</i> • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : Căpățânile încep să se formeze până la maturitate (BBCH 41-49). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>PEPENE GALBEN, PEPENE VERDE, DOVLEAC (SERE, SOLARII):</u>	
--	--	--	--	--



				<i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Spodoptera</i> spp., <i>Autographa gamma</i> (<i>Plusia gamma</i>), <i>Agrotis</i> sp. • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : De la prima frunză adevărată până la apariția primelor flori (BBCH 11-55). sau Când primele fructe ating dimensiunea și forma tipică până când fructele ajung la maturitate (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>PĂR :</u> <i>Cydia pomonella</i>, <i>Grapholita molesta</i>, <i>Archips</i> spp., <i>Argyrotaenia</i> spp., <i>Pandemis</i> spp., <i>Leucophaea</i> spp., <i>Lithocolletis</i> spp. • 2,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : De la fructe cu dimensiunea de până la 10 cm până ce fructele ajung la maturitate (BBCH 71-89) <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor <u>PRUN :</u> <i>Cydia pomonella</i>, <i>Grapholita molesta</i> • 2,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : De la apariția fructelor până ce fructele ajung la maturitate (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>MAZĂRE (CÂMP):</u> <i>Cydia nigricana</i>, <i>Helicoverpa</i> spp. • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : 10% din păstăi ating lungimea tipică până când păstăile sunt complet formate (BBCH 71-79). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Eupoecilia ambiguella</i>, <i>Drosophila suzukii</i> • 1,25 - 1,5 kg/ha Se aplică astfel: <u>Cultura</u> : Apariția inflorescențelor până la inflorescențe bine dezvoltate, butonii florali strâns grupați (BBCH 53-55). sau Începutul dezvoltării boabelor până la maturitatea deplină (BBCH 71-89). <u>Dăunători</u> : la apariția dăunătorilor. <u>PLANTE ORNAMENTALE ȘI FLORI (CÂMP, SERE, SOLARII):</u> <i>Pieris brassicae</i>, <i>Depressaria</i>
--	--	--	--	--



				<i>erinaceella, Plutella xylostella, Helicoverpa spp., Spodoptera spp.</i> • 1,5 kg/ha Se aplică astfel: Cultura : 2 frunze adevărate până la începutul înfloririi (BBCH 12-55). sau 10% din fructe au dimensiunea optimă până când fructele ajung la maturitate (BBCH 71-89). Dăunători : la apariția dăunătorilor.	
3.	RAPID 060CS 60 g/L gamma cihalotrin	FMC Agro Operational Romania SRL CO:759PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRAU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ: <i>Sitobion avenae, Lema melanopa</i> • 60-80 mL/ha Se aplică de la apariția frunzei stindard până când boabele au un conținut lăptos și au atins dimensiunea finală (BBCH 37-75). SECARĂ DE TOAMNĂ: <i>Sitobion avenae, Lema melanopa</i> • 50 - 80 mL/ha Se aplică de la apariția frunzei stindard până când boabele au un conținut lăptos și au atins dimensiunea finală (BBCH 37-75). RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Meligethes aeneus</i> • 60-80 mL/ha Se aplică de când mugurii floralii sunt prezenți dar sunt încă acoperiți de frunze până când 20% din florile din inflorescența principală sunt deschise (BBCH 50-62). <i>Ceutorhynchus quadridens</i> • 60-80 mL/ha Se aplică de când primele 2 internoduri sunt vizibile până când primele petale sunt vizibile și mugurii floralii sunt încă închiși (BBCH 32-59).	ATENȚIE
4.	FOSHIELD 725 g/L fosfonați de potasiu	Desarrollo Agrícola y Minero S.A, Spania CO:760PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN GERMANIA	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 4,0 L/ha Se aplică de la stadiul de 5 frunze până la recoltare (BBCH 15-89); 6 tratamente cu 10 zile pauză între aplicări sau 5 tratamente cu 20 zile pauză între aplicări.	
ERBICIDE					
1.	AKAPIT 125EC 125 g/L fluazifop – P – butil	CIECH Sarzyna S.A, Polonia CO:761PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	RAPITĂ DE TOAMNĂ: Buruieni monocotiledonate anuale și perene: <i>Ex. Apera spica-venti, Echinochloa crus-gali, Avena fatua</i> • 3,0 L/ha Se aplică toamna, de la 2 frunze până la 8 frunze (BBCH 12-18).	PERICOL



				<i>Apera spica-venti</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, samulastra cereale, <i>Elymus repens</i> • 3,0 L/ha Se aplică primăvara după pornirea în vegetație, de la 2 frunze până la al 5-lea internod format (BBCH 12-35). CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale și perene: <i>Ex.: Apera spica-venti, Echinochloa crus-galli</i>, samulastra cereale, <i>Avena fatua</i>, <i>Setaria spp</i>, <i>Elymus repens</i> • 2,0 L/ha Se aplică de la 2 frunze până la începerea formării tuberculilor (BBCH 12-40). FASOLE PĂSTĂI: Buruieni monocotiledonate anuale și perene: <i>Ex.: Echinochloa crus-galli, Setaria viride</i>, samulastra cereale • 3,0 L/ha Se aplică de la prima pereche de frunze trifoliolate până la apariția florilor (BBCH 11-51). CĂPSUN: Buruieni monocotiledonate anuale și perene: <i>Ex.: Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria pumila, Lolium perene, Elymus repens</i> • 3,0 L/ha Se aplică după recoltare (BBCH>91).	
2.	BETTIX SC 700 g/L metamitron	UPL Holdings Cooperatief U.A, Olanda CO:762PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>OLANDA</u>	<u>SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ ROȘIE, SFECLĂ FURAJERĂ, MANGOLD:</u> <i>Poa annua, Fallopia convolvulus, Sonchus asper, Stellaria media</i> • 2- 6* L/ha (* Doza maximă pe solurile cu un conținut de peste 20% argilă sau humus peste 2%.) Se aplică înainte de însămânțare sau preemergent (BBCH 00-09). sau • 3L/ha + 3 L/ha Se aplică posteemergent, cultura în stadiul de 1-8 frunze (BBCH 10-18), buruienile în stadiul de cotiledon; 2 tratamente la interval de 6-14 zile.	ATENȚIE



3.	CLAP 300 SL 300 g/L clopiralid	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO: 251PC/19.12.2016	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>REPUBLICA CEHĂ</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>PORUMB:</u> Buruieni dicotiledonate: (<i>Anthemis arvensis</i> , <i>Cardaria draba</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Veronica</i> spp., <i>Viola lanceolata</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Matricaria</i> spp., <i>Sonchus oleraceus</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Fallopia convolvulus</i> , <i>Geranium pusillum</i> etc.) • 0,4 L/ha Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze până la stadiul de 11 frunze (BBCH 12-21).	
4.	TERBUSTAR 500 SL 500 g/L terbutilazină	CIECH Sarzyna S.A., Polonia CO: 589PC/03.02.2020	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>EXTINDEREA MOMENTULUI DE APLICARE:</u> <u>PORUMB:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: (<i>Viola arvensis</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Matricaria indora</i> , <i>Capsella bursa- pastoris</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Veronica arvensis</i> etc.) • 1,0 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la 6 frunze (BBCH 12-16). Se aplică 1 tratament/sezon preemergent sau postemergent, odată la 3 ani pe aceeași suprafață la o doză maximă de 850 g terbutilazină/ha.	ATENȚIE
5.	TUDOR 114 OD 10 g/L florasulam + 24 g/L tifensulfuron metil + 80 g/L nicosulfuron	INNIGO Sp. Z.o.o., Polonia CO:763PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>PORUMB:</u> Buruieni mono și dicotiledonate: (ex. <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Polygonum lapathifolium</i> , <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Anthemis arvensis</i> , <i>samulastra de rapita</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Galinsoga parviflora</i>) • 0,5 L/ha Se aplică astfel: <u>Cultura:</u> 2-8 frunze(BBCH 12-18). <u>Buruieni:</u> 2-3 frunze.	PERICOL
6.	PANAREX 40 g/L quizalofop – P- tefuril	UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda CO:764PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>SPANIA</u>	<u>FLOAREA SOARELUI:</u> Buruieni graminee anuale și perene: • 0,5 – 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). <i>Sorghum halepense</i> • 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). <u>SOIA:</u> Buruieni graminee anuale și perene:	PERICOL



				• 0,5 – 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). <i>Sorghum halepense</i> • 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). <u>SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ FURAJERĂ:</u> Buruieni graminee anuale și perene: • 0,5 – 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până când frunzele acoperă complet solul (BBCH 12-39). <i>Sorghum halepense</i> • 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până când frunzele acoperă complet solul (BBCH 12-39). <u>FASOLE (CÂMP):</u> Buruieni graminee anuale și perene: • 0,5 – 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția primelor petale (BBCH 12-59). <i>Sorghum halepense</i> • 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția primelor petale (BBCH 12-59). <u>MAZĂRE (CÂMP):</u> Buruieni graminee anuale și perene: • 0,5 – 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). <i>Sorghum halepense</i> • 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). <u>NĂUT, LINTE:</u> Buruieni graminee anuale și perene: • 0,5 – 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). <i>Sorghum halepense</i> • 1,75 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul
--	--	--	--	--



				de 2 frunze până la apariția inflorescenței (BBCH 12-51). (*În funcție de gradul de îmburuienare și speciile de buruieni prezente.)	
7.	RASSEL 100 SC 100 g/L florasulam	Innvigo Sp.z.o.o., Polonia CO:621PC/30.06.2020	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Centaurea cyanus</i> <i>Anthemis arvensis</i> <i>Galium aparine</i> <i>Persicaria/Polygonum lapathifolia</i> • 50 mL/ha Se aplică astfel: <u>Cultura:</u> postemergent, de la apariția primei frunze până la stadiul de șapte frunze (BBCH 11-17). <u>Buruieni:</u> în faza de 2-6 frunze. Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Centaurea cyanus</i> <i>Anthemis arvensis</i> <i>Galium aparine</i> <i>Polygonum persicaria</i> <i>Polygonum convolvulus</i> <i>Persicaria/Polygonum lapathifolia</i> • 50 mL/ha + 100 mL/ha adjuvant Asystent + Se aplică astfel: <u>Cultura:</u> postemergent, de la apariția primei frunze până la stadiul de șapte frunze (BBCH 11-17). <u>Buruieni:</u> în faza de 2-6 frunze.	PERICOL
8.	SKAUT 75 SG 750 g/kg tifensulfuron metil	Innvigo Sp.z.o.o., Polonia CO:765PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale: (ex. <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , etc.) • 15 g/ha + 0,1L/ha adjuvant Asystent + Se aplică astfel: <u>Cultura:</u> de la 2 până la 8 frunze (BBCH 12-18). <u>Buruieni:</u> în faza de 2-6 frunze	PERICOL
REGULATORI DE CREȘTERE					
1.	FROOTI 77,8 g/L 1-acid naftilacetic	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:766PC/24.03.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	MĂR, PĂR: Reglarea numărului de fructe • 0,2 L/ha (0,19 L/10 000 m ² suprafață foliară tratată) Se aplică la sfârșitul înfloririi până când fructele au mărimea de 20 mm (BBCH 69-72). Reducerea căderii fructelor	ATENȚIE



			• 0,2 L/ha (0,19 L/10 000 m² suprafață foliară tratată) Se aplică de la atingerea diametrului de 10mm a fructelor până la atingerea maturității de recoltare a fructelor (BBCH 71-87).	
--	--	--	--	--

EXTINDEREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU UTILIZĂRI MINORE (ART.51 – Reg.(CE) nr.1107/2009

INSECTICIDE

1.	POLECI/(DECA 2,5EC - a doua denumire comercială) 25 g/L deltametrin	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:094PC/21.01.2015	SMRZ: ROMANIA	PORUMB: <i>Agrotis segetum</i> • 100 mL/hL apă (0,1%) CARTOF DULCE: <i>Aphis spp</i> • 100 mL/hL apă (0,1%) VITA DE VIE: <i>Lepidosaphes ulmi</i> • 25 mL/hL apă (0,025 %)	PERICOL
2.	POLYVERSUM 1×10 ⁹ oospores /g <i>Pythium oligandrum</i> M1	Biopreparaty spol s.r.o., Republica Cehă CO:163/16.03.2016	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN REPUBLICA CEHĂ	CĂPSUN: <i>Botrytis cinerea, Phytophthora spp., Phytophthora fragariae</i> • 100 g/ha Se aplică primul tratament la BBCH 10, 3-4 tratamente de la BBCH 60 la BBCH 89 (5-8 zile între tratamente); Înmuiera răsadurilor cu 0,05% și udarea după plantare. MAC: <i>Helminthosporium papaveris</i> <i>Peronospora arborescens</i> • 100 g/ha Se aplică 3 tratamente, primul la BBCH12, al doilea la BBCH 19, al treilea înainte de apariția primului lăstar vizibil BBCH 51. MUSTAR: <i>Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Alternaria spp.</i> • 100 g/ha Se aplică preventiv (5-7 zile între tratamente). HAMEI: <i>Pseudoperonospora humuli</i> • 250 g/ha Se aplică preventiv (5-7 zile între tratamente). Înmuiera butașilor cu 0,05% înainte de plantare. LEGUME BRASICACEE: <i>Alternaria brassicae, Leptosphaeria maculans, Hyaloperonospora</i>	



				<i>parasitica</i> • 200 g/ha Se aplică preventiv (5-7 zile între tratamente). LUPIN: <i>Ascochyta pisi</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 100 g/ha Se aplică 2 tratamente în vegetație: primul de la sfârșitul înfloririi până când păstăile au ajuns la dimensiunea finală (BBCH 65 – 79); 7-10 zile între tratamente. Tratarea semințelor cu 0,5-1 kg/t.	
--	--	--	--	---	--

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR – (ART.43– Reg.(CE) nr.1107/2009)

FUNGICIDE

1.	TELDOR 500 SC 500 g/L fenhexamid	Bayer Cropscience AG, Germania CO: 2084/ 19.12.2000	SMRZ: SLOVENIA ITALIA	VITA DE VIE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,0 L/ha Se aplică 1-2 tratamente astfel: BBCH 63-89 (de la apariția inflorescențelor până la coacerea deplină pentru strugurii de vin) BBCH 69-89 (de la sfârșitul înfloritului până la coacerea deplină pentru strugurii de masă) CAPSUN: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,5 L/ha Se aplică 1-3 tratamente: primul aplicat la începutul înfloririi (BBCH 55) iar următoarele după fiecare recoltare a fructelor (BBCH 89) TOMATE ÎN SPAȚII PROTEJATE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,2 L/ha Se aplică 1-2 tratamente de la a treia inflorescență vizibilă până la maturitatea deplină a fructelor (BBCH 53-89). CASTRAVEȚI ÎN SPAȚII PROTEJATE: <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 L/ha Se aplică 1-3 tratamente de la apariția celei de a doua frunze adevărate până la maturitatea deplină a fructelor (BBCH 12-89). PLANTE ORNAMENTALE (CRIZANTEME ȘI LALELE): <i>Botrytis spp.</i> • 0,8 L/ha Se aplică 3 tratamente la avertizare (10 zile între tratamente).	
----	--	--	---	--	--



				POMI - SPECII SÂMBUROASE (CIREȘ, VIȘIN ȘI PRUN): <i>Monilinia</i> spp. • 0,8 L/ha Se aplică 1-2 tratamente la cireș și vișin și 1-3 tratamente la prun, de la umflarea mugurilor până când fructele ajung la maturitate (BBCH 51-89).	
ERBICIDE					
1.	STARSHIP 100 SC/KAN-DOO- a doua denumire comercială) 100 g/L mezotrionă	Nufarm Romania, SRL CO:190PC/03.06.2016	SMRZ: AUSTRIA	PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică preemergent de la semănat până la răsărire (BBCH 00-09) • 1,0 L/ha Se aplică de la răsărire până în faza de cel mult 8 frunze ale porumbului (BBCH 10-18). Se aplică 1 tratament pe același teren, într-un sezon.	ATENȚIE
2.	KIDEKA / (CRIMSON – a doua denumire comercială) 100 g/L mezotrionă	Nufarm Romania, SRL CO:252PC/19.12.2016	SMRZ: AUSTRIA	PORUMB (PORUMB DE SILOZ, PORUMB DULCE, PORUMB PENTRU BOABE): Buruieni dicotiledonate anuale (ex.: <i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Anagalis arvensis</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Polygonum persicaria</i> , <i>Sonchus asper</i> , etc.) • 0,5 - 1,0* L/ha Se aplică un tratament pe sezon în postemergentă când plantele de porumb au 2 –8 frunze (BBCH 12-18) și buruienile dicotiledonate au 4 frunze. (*doza se stabilește în funcție de gradul de îmburuienare)	PERICOL
3.	ROUNDUP ENERGY 450 g/L glifosat	Bayer Agriculture BV, Belgia CO:009PC/ 28.05.2012	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	PORUMB, SFECLĂ DE ZAHĂR: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 2,4 L/ha Se aplică preemergent. MIRIȘTE: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 2,4 – 4,0* L/ha Se aplică după recoltare. TERENURI NECULTIVATE: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 2,4 - 4,0* L/ha Se aplică pentru buruienile perene înainte de înfrățire când au 10-15 cm	ATENȚIE



				înălțime, iar pentru buruienile anuale în faza de creștere activă 4 – 6 frunze. <u>DISTRUGEREA PAJISTILOR:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 2,4 – 4,0* L/ha Se aplică înainte de pășunat sau cosit (perioada iunie-octombrie) sau după ce buruienile cresc din nou în urma pășunatului sau cositului. <u>LIVEZI (MĂR, PĂR, CIREȘ, PRUN):</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 4 L/ha Se aplică astfel: Pentru MĂR ȘI PĂR: după recoltare, dar înainte de faza de buton verde. Pentru CIREȘ ȘI PRUN: după recoltare (după căderea frunzelor) dar înainte de faza de buton alb. <u>RAPITĂ:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 2,4 L/ha Se aplică preemergent înainte de semănat. (* în funcție de gradul de infestare și de speciile de buruieni prezente)	
4.	AGROSAR 360 SL / (AGRO-GLYFO GREEN – a doua denumire comercială) 360 g/L glifosat	Ciech Sarzyna SA, Polonia CO: 415PC/ 28.02.2018	<u>SMRZ:</u> POLONIA	<u>MIRIȘTE:</u> Buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene • 4 L/ha Se aplică de la mijlocul lunii august până toamna târziu, în stadiul de creștere intensivă a buruienilor (10-25 cm pentru <i>Agropyron repens-pir</i>, monocotiledonate 5 cm înălțime și dicotiledonate la 2 frunze adevărate). <u>MĂR :</u> Buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene • 3,0 – 4,0* L/ha Se aplică din primăvară până în toamnă, pe buruienile verzi. (* în funcție de gradul de infestare și de speciile de buruieni prezente) <u>ZONE FĂRĂ DESTINAȚIE AGRICOLĂ (GRĂDINI, TERENURI, TERITORIUL DIN JURUL CASEI, DE-A LUNGUL FUNDATIILOR DE CLĂDIRI, GARDURI ȘI ALTE ÎMPREJURIMI, ÎN JURUL COPACILOR ȘI TUFELOR DE FLORI, SUB GARDURI VII ȘI ARBUSTI, ÎNTRE BLOCURI ȘI</u>	ATENȚIE



				PIETRE DE PAVAJ, PE TERITORIUL CURȚII ȘI CĂILOR DE ACCES): Buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene • 4,0 L/ha Se aplică în stadiul de creștere intensivă a buruienilor .	
5.	CORIDA / (ADENTIS – a doua denumire comercială) 750 g/Kg tribenuron-metil	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd. CO: 367PC/ 29.11.2017	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	CEREALE DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARA (GRÂU ȘI ORZ): Buruieni dicotiledonate: <i>(Aethusa cynapium, Anagalis arvensis, Anthemis arvensis, Arabidopsis thaliana, Brassica napus Cardamine hirsute, Cerasitium sp., Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Chrysanthemum sp., Cirsium arvense, Daucus carota, Descurainia sophia, Galium aparine, Fumaria officinalis, Geranium sp., Lamium purpureum, Matricaria sp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum sp., Sinapis arvensis, Stellaria media, Viola sp., Veronica sp., Thlaspi arvense)</i> • 15 - 20 g/ha Se aplică postemergent. <u>Cultura:</u> de la formarea primului internod până la apariția frunzei stindard (BBCH 31-39). <u>Buruieni:</u> stadiul de creștere intensă – până în faza de 6 frunze complet formate.	ATENȚIE
6.	TEMSA SC / (OSORNO - a doua denumire comercială) 100 g/L meztionă	GLOBALCHEM NV, Belgia CO: 150PC/16.03.2016	SMRZ: POLONIA	PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale: <i>(ex: Raphanus raphanistrum, Matricaria spp, Chenopodium album, Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Solanum nigrum, etc.)</i> • 0,75 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent, de la 2 până la 8 frunze ale porumbului (BBCH 12-18); max.1 aplicare/sezon.	PERICOL
7.	MERLIN FLEXX 240 g/L izoxaflutol + 240 g/L ciprosumamidă (safener)	Bayer AG CO: 002PC/17.05.2010	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	PORUMB: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale: • 0,3 - 0,41 L/ha Se aplică preemergent. Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 0,41 L/ha Se aplică postemergent. <u>Cultura:</u> în stadiul de 2 - 3 frunze (BBCH 12 – 13) <u>Buruieni:</u> în stadiul de 2 - 3 frunze (BBCH 12 – 13) Nu se utilizează în tank-mix.	ATENȚIE

REOMOLOGARE PROCEDURA EUROPEANĂ

FUNGICIDE

1.	FEZAN 250 g/L tebuconazol	Sipcam Oxon S.p.A., Italia CO: 2730/19.12.2007	—	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Puccinia</i> spp., <i>Septoria</i> spp., <i>Helminthosporium</i> spp. • 0,8 L/ha Numărul maxim de tratamente: 2 Primul tratament se aplică de la faza de alungire a tulpinii, până la apariția frunzei standard (BBCH 32-39). <i>Fusarium</i> spp. • 1,0 L/ha Al doilea tratament se aplică de la înspicare până la înflorire (BBCH 51-69). RAPITA: <i>Phoma lingam</i> • 0,5 L/ha Primul tratament se aplică toamna, în stadiul de 4-8 frunze (BBCH 14-18). <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Phoma lingam</i>, <i>Erysiphe communis</i> • 1,0 L/ha Al doilea tratament se aplică de la faza de buton floral, până la înflorirea deplină și scuturarea petalelor (BBCH 30-67).	PERICOL
----	-------------------------------------	--	---	--	---------

INSECTICIDE

1.	PHOSTOXIN TABLET 560 g/kg fosfură de aluminiu	Detia Freyberg GMBH, Germania CO: 369/27.12.1974	SMRZ: Marea Britanie	CEREALE DEPOZITATE: Insecte dăunătoare care infestază produsele depozitate (ex. <i>Sitophilus</i> spp., <i>Tribolium confusum</i>, <i>Oryzaephilus surinamensis</i>, <i>Sitotroga cerealella</i>, <i>Ephestia kuehniella</i>) • 30 g/t de semințe (10 tablete) Se aplică la infestare (toate stadiile de dezvoltare a dăunătorilor, stadiul de adult fiind cel mai sensibil). CULTURI DE CÂMP: <i>Cricetus cricetus</i>, <i>Citellus (Spermophilus) citellus</i> • 2 tablete/galerie NUCI, PRODUSE CONSUMABILE PROCESATE, LEGUMINOASE, CONDIMENTE USCATE DEPOZITATE, SEMINTE OLEAGINOASE DEPOZITATE, CEAI, CAFEA, CACAO, ROSCOVA, PĂSTĂI DE CERATONIA SILIQUE, PLANTE PENTRU INFUZII (DUPĂ RECOLTARE): Insecte dăunătoare care infestază	PERICOL
----	---	--	--------------------------------	---	---------



				produsele depozitate (ex. <i>Sitophilus spp.</i>, <i>Tribolium confusum</i>, <i>Oryzaephilus surinamensis</i>, <i>Sitotroga cerealella</i>, <i>Ephestia kuehniella</i>) • 10 tablete/m³ (1 tabletă are aproximativ 3 g) Se aplică la infestare (toate stadiile de dezvoltare a dăunătorilor, stadiul de adult fiind cel mai sensibil). SPATII DE DEPOZITARE/ MANIPULARE PRODUSE, TUTUN: Insecte dăunătoare care infestează produsele depozitate (ex. <i>Sitophilus spp.</i>, <i>Tribolium confusum</i>, <i>Oryzaephilus surinamensis</i>, <i>Sitotroga cerealella</i>, <i>Ephestia kuehniella</i>) • 10 tablete/m³ (1 tabletă are aproximativ 3 g) Se aplică la infestare (toate stadiile de dezvoltare a dăunătorilor, stadiul de adult fiind cel mai sensibil).	
2.	MAGTOXIN TABLET 660 g/kg fosfură de magneziu	Detia Freyberg GMBH, Germania CO: 2558/14.06.2005	SMRZ: Marea Britanie	CEREALE DEPOZITATE: Insecte dăunătoare care infestează produsele depozitate (ex. <i>Plodia interpunctella</i>, <i>Oryzaephilus surinamensis</i>, <i>Sitophilus granarius</i>, <i>Sitotroga cerealella</i>, <i>Tribolium confusum</i>, <i>T. castaneum</i>, <i>Trogoderma granarium</i>) • 3-5 tablete/t de produs (3 tablete/tratament în celulele de siloz, la introducerea cerealelor și 5 tablete pentru tratarea cerealelor pastrate în depozite în vrac) Se aplică la infestare (toate stadiile de dezvoltare a dăunătorilor, stadiul de adult fiind cel mai sensibil). SPATII DE DEPOZITARE, TUTUN: Insecte dăunătoare care infestează produsele depozitate (ex. <i>Plodia interpunctella</i>, <i>Oryzaephilus surinamensis</i>, <i>Sitophilus granarius</i>, <i>Sitotroga cerealella</i>, <i>Tribolium confusum</i>, <i>T. castaneum</i>, <i>Trogoderma granarium</i>) • 3-5 tablete/m³ Se aplică la infestare (toate stadiile de dezvoltare a dăunătorilor, stadiul de adult fiind cel mai sensibil).	PERICOL
3.	VANTEX 60 CS/(NEXIDE 60 CS - a doua denumire comercială) 60 g/L gama cihalotrin	Cheminova A/S, Danemarca CO: 2172/16.12.2002	—	GRĂU DE TOAMNĂ: Afide: <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i> (Vectori ai virozei piticirii galbene) <i>Oulema melanopus</i>, <i>Eurvgaster integriceps</i> • 50-80 mL/ha Se aplică la apariția a 2 frunze până la coacerea în lapte a boabelor (BBCH 12-75).	ATENȚIE



				<u>GRÂU DE PRIMĂVARĂ:</u> Afide: <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i> (Vectori ai virozei piticirii galbene) <i>Oulema melanopus</i> • 50-80 mL/ha Se aplică la apariția a 2 frunze până la coacerea în lapte a boabelor (BBCH 12-75). <u>ORZ DE TOAMNĂ:</u> Afide: <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i> (Vectori ai virozei piticirii galbene) <i>Oulema melanopus</i> • 50-80 mL/ha Se aplică la apariția a 2 frunze până la coacerea în lapte a boabelor (BBCH 12-75). <u>ORZ DE PRIMĂVARĂ:</u> Afide: <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i> (Vectori ai virozei piticirii galbene) <i>Oulema melanopus</i> • 50-80 mL/ha Se aplică la apariția a 2 frunze până la coacerea în lapte a boabelor (BBCH 12-75). <u>OVĂZ:</u> Afide: <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i> (Vectori ai virozei piticirii galbene) <i>Oulema melanopus</i> • 50-80 mL/ha Se aplică la apariția a 2 frunze până la coacerea în lapte a boabelor (BBCH 12-75). <u>SECARĂ:</u> Afide: <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i> (Vectori ai virozei piticirii galbene) <i>Oulema melanopus</i> • 50-80 mL/ha Se aplică la apariția a 2 frunze până la coacerea în lapte a boabelor (BBCH 12-75). <u>TRITICALE:</u> Afide: <i>Sitobion avenae</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i> (Vectori ai virozei piticirii galbene) <i>Oulema melanopus</i> • 50-80 mL/ha	
--	--	--	--	---	--



			Se aplică la apariția a 2 frunze până la coacerea în lapte a boabelor (BBCH 12-75). CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Afide (<i>Myzus persicae</i>, <i>Macrosiphum euphorbiae</i>, <i>Aphis nasturtii</i>, <i>Aulacorthum solani</i>) • 50-80 mL/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până în faza de maturare a semințelor (BBCH 11-89). RAPITA: <i>Meligethes aeneus</i> Afide (<i>Ceutorhynchus</i> spp., <i>Dasineura brassicae</i>, <i>Psylliodes chrysocephala</i>, <i>Phyllotreta</i> spp., <i>Brevicoryne brassicae</i>, <i>Athalia rosae</i>) • 50-80 mL/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până când aproape toate păstăile au atins dimensiunea finală (BBCH 10-79). VARZĂ: <i>Mamestra brassicae</i> <i>Plutella xylostella</i> <i>Pieris</i> spp. • 50-80 mL/ha Se aplică din faza de 2 frunze până când căpătâna verzei ajunge la dimensiunea caracteristică soiului (BBCH 12-49). SFECLA DE ZAHĂR: Afide (<i>Pegomyia betae</i>) • 50-80 mL/ha Se aplică din faza de 2 frunze până când rădăcina de sfeclă ajunge la dimensiunea de recoltat (BBCH 12-49). MAZĂRE: Afide (<i>Acyrtosiphon pisu</i>, <i>Cydia nigricana</i>, <i>Sitona lineatus</i>) • 50-80 mL/ha Se aplică din faza de 2 frunze până când boabele și păstăile sunt complet uscate (BBCH 12-89). VITĂ DE VIE: <i>Lobesia botrana</i> • 50-80 mL/ha Se aplică din faza de 2 frunze până când boabele de struguri devin moi și se apropie de coacerea deplină (BBCH 12-85).	
--	--	--	--	--



				LIVEZI DE MĂR PEPINIERE: <i>Aphis pomi</i> 135 mL/ha Se aplică la avertizare când există pragul de dăunare.	
ERBICIDE					
1.	PILOT 10 EC 100 g/L quizalofop-p-etil	Nissan Chemical Europe S.A.S., Franța CO: 2776/27.03.2008	SMRZ: Marea Britanie	FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Bromus</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> spp.) 0,6 L/ha Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i>) 1,25 L/ha Se aplică postemergent. Buruieni monocotiledonate anuale: la apariția a 2-4 frunze (BBCH 12-14). Pir (<i>Agropyron repens</i>): 10-15 cm înălțime. RAPIȚA DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (samulastra de cereale, <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Bromus</i> spp.,) 0,6 L/ha Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i>) 1,25 L/ha Se aplică postemergent. Buruieni monocotiledonate anuale: la apariția a 2-4 frunze (BBCH 12-14). Pir (<i>Agropyron repens</i>): 10-15 cm înălțime. CARTOF PENTRU CONSUM (CU EXCEPȚIA CARTOFULUI CULTIVAT PENTRU SĂMÂNȚĂ): Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Setaria</i> spp.) 0,6 L/ha Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i>) 1,0 L/ha Se aplică postemergent. Buruieni monocotiledonate anuale: la apariția a 2-4 frunze (BBCH 12-14). Pir (<i>Agropyron repens</i>): 10-15 cm înălțime. SFECLA DE ZAHĂR: Buruieni monocotiledonate anuale (samulastra de cereale, <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Panicum miliaceum</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Avena fatua</i>) 0,6 L/ha	PERICOL



				Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i>) • 1,25 L/ha Se aplică postemergent. <u>Buruieni monocotiledonate anuale:</u> la apariția a 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>Pir (<i>Agropyron repens</i>):</u> 10-15 cm înălțime. MAZĂRE: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Avena fatua</i>, <i>Lolium multiflorum</i>, <i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>). • 0,6 L/ha Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i>) • 1,25 L/ha Se aplică postemergent. <u>Buruieni monocotiledonate anuale:</u> la apariția a 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>Pir (<i>Agropyron repens</i>):</u> 10-15 cm înălțime. FASOLE: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Avena fatua</i>, <i>Lolium multiflorum</i>, <i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>) • 0,6 L/ha Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i>) • 1,25 L/ha Se aplică postemergent. <u>Buruieni monocotiledonate anuale:</u> la apariția a 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>Pir (<i>Agropyron repens</i>):</u> 10-15 cm înălțime. MORCOV: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Echinochloa crus-galli</i>) • 0,6 L/ha Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i>) • 1,25 L/ha Se aplică postemergent. <u>Buruieni monocotiledonate anuale:</u> la apariția a 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>Pir (<i>Agropyron repens</i>):</u> 10-15 cm înălțime.	
MOLUSCOCIDE					
1.	AGROSAN B 50 g/kg metaldehida	Kollant S.P.A., Italia CO: 2722/25.10.2007	—	TOMATE SI VINETE: Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la	ATENTIE



				începutul formării lăstarilor laterali (BBCH 00-19). <u>ARDEI:</u> Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la apariția inflorescențelor (BBCH 00-49). <u>PEPENI GALBENI, PEPENI VERZI:</u> Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la începutul formării lăstarilor laterali (BBCH 00-19). <u>CONOPIDĂ:</u> Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la apariția inflorescențelor (BBCH 00-49). <u>MAZĂRE ȘI FASOLE VERDE:</u> Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la apariția inflorescențelor (BBCH 00-50). <u>MAZĂRE ȘI FASOLE USCATĂ:</u> Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la începutul formării lăstarilor laterali (BBCH 00-19). <u>RAPITA, FLOAREA SOARELUI, SOIA, BUMBAC:</u> Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la începutul formării lăstarilor laterali (BBCH 00-19). <u>PORUMB, MEI, SORG:</u> Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon.	
--	--	--	--	---	--



				Se aplică după semănat până la începutul fazei de înfrățire (BBCH 00-19). CEREALE (GRÂU, SECARĂ, TRITICALE, ORZ, OVĂZ): Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 00-29). SFECLA DE ZAHĂR: Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică după semănat până la apariția primelor frunze (BBCH 00-10) PLANTE ORNAMENTALE (CULTURI FLORICOLE, PEPINIERE, RĂSADURI, PLANTATII POMICOLE): Melci și limacși • 7 kg/ha (2 aplicări la interval de 7-14 zile) Maxim 14 kg/ha/cultură/sezon. Se aplică preventiv sau la infestare.	
--	--	--	--	--	--

B. APROBAREA CELEI DE- A DOUA DENUMIRI COMERCIALE

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALĂ	A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ	NR. CERTIFICAT DE OMOLOGARE/ DATA	DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII
1.	ELATUS ERA	INDAVIUS	342PC/29.11.2017	Syngenta Agro SRL
2.	MICROTHIOL SPECIAL	MICROTHIOL JETT	182/30.10.1974	UPL Europe Ltd., Marea Britanie
3.	CYFLAMID 5 EW	CYFLODIUM 5 EW	2270/27.05.2004	Nisso Chemical Europe GmbH
4.	CORAGEN	VOLIAM	2724/25.10.2007	FMC International Switzerland Sarl (FISSA)
5.	DIGATOR	GHEPARD FORTE	664PC/24.11.2020	HELM AG, Germania
6.	AMINO 600 SL	PIMIENTO	2530/22.02.2005	Adama Agricultural Solutions SRL
7.	XANADU	PHYTON	543PC/12.07.2019	UPL Agricultural Solutions SRL
8.	KINARA	SEMPRA	504PC/14.03.2019	UPL Agricultural Solutions SRL
9.	SACRON WG	SAFECAP WG	119PC/22.07.2015	UPL Europe Ltd., Marea Britanie
10.	POLYVERSUM	GREEN DOCTOR	163PC/30.04.2022	Biopreparaty sol s.r.o., Republica Cehă
11.	SANMITE 10 SC	NEXTER	211PC/20.10.2016	Nissan Chemical Europe SAS, Franța
12.	PROTIOSTAR 250 EC	TRACIAFIN	720PC/07.12.2021	Finchimica S.p.A., Italia
13.	PLANTOIL	MIDOS OIL	614PC/30.06.2020	Industrias Afrasa S.A., Spania
14.	MEZONIR 340 WG	DENAR 340 WG	691PC/22.04.2021	Innvigo sp. z.o.o., Polonia
15.	RUMEZO 200 SE	MALTON 200 SE	690PC/22.04.2021	Innvigo sp. z.o.o., Polonia
16.	FUNDAMENTUM 700 WG	LOCUS 700 WG	741PC/15.11.2018	Innvigo sp. z.o.o., Polonia
17.	TARTAROS (denumire nouă ERA)	PROMINO 300 EC	721PC/07.12.2021	CAC Chemical GmbH, Germania



18.	TARGA SUPER 5 EC	GRAMIN SUPER	1159/20.04.1989	Nissan Chemical Europe S.A.S., Franța
19.	STARLIGHT	STARLORD	414PC/28.02.2018	Biochem SRL
20.	ALOHA	ANACONDA	408PC/28.02.2018	Biochem SRL

C. APROBAREA PERMISELOR DE COMERȚ PARALEL CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT	NR. PERMIS DE COMERȚ PARALEL (P.C.P.) DENUMIRE COMERCIALĂ PRODUS	CULTURI	AGENȚI DE DĂUNARE	DOZE DE APLICARE
1.	TRIXTAN SC 40 g/L diflufenican + 300 g/L pendimetalin + 250 g/L clorotoluron	S.C. AGROVENA S.R.L.	PCP NR. 13/24.03.2022	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate	2,0 L/ha De la răsărire până la stadiul de 3 frunze desfăcute (BBCH 10-13).
2.	BIZAR 15 g/L penoxsulam + 3,75 g/L florasulam + 100 g/L diflufenican	S.C. AGROVENA S.R.L.	PCP NR. 14/24.03.2022	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ	Buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate	1,0 L/ha Se aplică la cultură, postemergent toamna, de la apariția primei frunze până la stadiul de 3 frați vizibili (BBCH 11-23).
				SECARĂ	Buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate	1,0 L/ha Se aplică la cultură, postemergent timpuriu toamna, de la apariția primei frunze până la 4 frunze (BBCH 11-14).
3.	CLOZE 480 EC 480 g/L clomazonă	S.C. AGROVENA S.R.L.	PCP NR. 15/24.03.2022	RAPIȚA DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate	0,15 - 0,20 L/ha Se aplică preemergent.
4.	TEBIC 430 SC 430 g/L tebuconazol	S.C. AGROVENA S.R.L.	PCP NR. 16/24.03.2022	RAPIȚA	<i>Phoma</i> lingam, <i>Alternaria</i> spp., <i>Botrytis</i> spp. Regulator de creștere	0,45 L/ha Se aplică toamna la 4-8 frunze (BBCH 14-18).
					<i>Phoma</i> lingam, <i>Alternaria</i> spp., <i>Botrytis</i> spp. Regulator de creștere	0,6 L/ha Se aplică primăvara-creșterea tulpinii (BBCH 30-39).
					<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Alternaria</i> spp. <i>Botrytis</i> spp.	0,75 L/ha Se aplică primăvara-înflorire (BBCH 65-69).
				GRÂU	<i>Puccinia recondita</i> <i>Blumeria graminis</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Pyrenophora tritici-repensis</i>	0,6 L/ha Se aplică până la apariția frunzei standard (BBCH 30-39).



					<i>Puccinia recondita</i> <i>Blumeria graminis</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Phaeosphaeria nodorum</i> <i>Fusarium spp</i>	0,6 L/ha Se aplică de la apariția spicului până la începutul înfloritului (BBCH 51-61).
			ORZ		<i>Puccinia hordei</i> <i>Blumeria graminis</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Pyrenophora teres</i>	0,6 L/ha Se aplică în stadiul sfârșit înfrățire- al doilea internod (BBCH 29-32).
					<i>Puccinia hordei</i> <i>Blumeria graminis</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Pyrenophora teres</i>	0,6 L/ha Se aplică în stadiul apariției spicului-până la începutul înfloritului (BBCH 51-61).

REGULAMENTE PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA 26.11.2021 –16.03.2022

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2068 al Comisiei din 25 noiembrie 2021 **de modificare a** Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil și piraclostrobin.

2. Regulamentul (UE) 2021/2202 al Comisiei din 9 decembrie 2021 **de modificare a anexelor II, III și IV la** Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acequinocil, *Bacillus subtilis* tulpina IAB/BS03, emamectin, flutolanil și imazamox din sau de pe anumite produse.

3. Regulamentul delegat (UE) 2021/2244 al Comisiei din 7 octombrie 2021 **de completare a** Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme specifice privind controalele oficiale în ceea ce privește procedurile de prelevare a probelor pentru reziduurile de pesticide din alimente și hrana pentru animale.

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2246 al Comisiei din 15 decembrie 2021 **de modificare a** Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1793 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

5. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1330/2014 al Comisiei din 15 dec. 2014 **de aprobare a substanței active meptildinocap**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/4 al Comisiei din 4 ianuarie 2022 **de aprobare a substanței active *Purpureocillium lilacinum* tulpina PL11 ca substanță cu risc mic** în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/19 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 **de reînnoire a aprobării substanței active *Purpureocillium lilacinum* tulpina 251** în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/43 al Comisiei din 13 ianuarie 2022 **de reînnoire a aprobării substanței active flumioxazin** în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexelor la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/408.

9. Regulamentul (UE) 2022/78 al Comisiei din 19 ianuarie 2022 **de modificare a anexelor II și III la** Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru **dazomet, hexitiazox, metam și metilzotiocianat din sau de pe anumite produse.**

10. Regulamentul (UE) 2022/85 al Comisiei din 20 ianuarie 2022 **de modificare a anexei II la** Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de **flonicamid din sau de pe anumite produse.**

11. Regulamentul (UE) 2022/93 al Comisiei din 20 ianuarie 2022 **de modificare a anexelor II, III și IV la** Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru **acrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetil, izofetamid, virusul mozaic pepino, tulpina europeană (EU), izofat cu virulență**



ușoară Abp1 și virusul mozaic pepino, tulpina CH2, izolat cu virulență ușoară Abp2, spinetoram și spirotetramat din sau de pe anumite produse.

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/94 al Comisiei din 24 ianuarie 2022 privind **nereînnoirea aprobării substanței active fosmet**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/159 al Comisiei din 4 februarie 2022 de **aprobare a substanței active cu risc redus *Bacillus amyloliquefaciens* tulpina IT-45**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/378 al Comisiei din 4 martie 2022 de **modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectină, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) tulpina QST 713, *Bacillus thuringiensis* subsp. Aizawai tulpinile ABTS-1857 și GC-91, *Bacillus thuringiensis* subsp. Israeliensis (serotipul H-14) tulpina AM65-52, *Bacillus thuringiensis* subsp. Kurstaki tulpinile ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 și EG 2348, *Beauveria bassiana* tulpinile ATCC 74040 și GHA, clodinafop, *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximat, fosetil, malation, mepanipirim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* tulpina MA342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* M1, rimsulfuron, spinosad, *Trichoderma asperellum* (anterior *T. harzianum*) tulpinile ICC012, T25 și TV1, *Trichoderma atroviride* (anterior *T. harzianum*) tulpina T11, *Trichoderma gamsii* (anterior *T. viride*) tulpina ICC080, *Trichoderma harzianum* tulpinile T-22 și ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram**.

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/383 al Comisiei din 4 martie 2022 de **reînnoire a aprobării substanței active cu risc redus *Metarhizium brunneum* tulpina Ma 43 (anterior *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* tulpina BIPESCO 5/F52)**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

3. DIVERSE

1. Revenind la decizia CNOPPP din cadrul ședinței desfășurate în data de 24.11.2020, secțiunea DIVERSE, punctul 3, CNOPPP a luat notă de "*Clarificarea zonării pentru autorizarea produselor de protecția plantelor în România, din punct de vedere al eficacității*", transmisă de ICDPP și anume:

"Referitor la clarificarea zonelor în care se efectuează testele de eficacitate, în vederea omologării în România, lucrurile sunt clar definite în Regulamentul 1107/2009, art. 3 (17), art. 29 (3) și (6), și Anexa I. În Anexa I a Regulamentului 1107/2009, zona centrală în care se află și România, cuprinde următoarele state membre: Belgia, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Regatul Unit. Prin urmare, indiferent de procedura după care se face evaluarea (autorizare zonală, recunoaștere reciprocă, reînnoirea autorizațiilor conform art. 43, etc.), testele de eficacitate pot fi acceptate la evaluare, numai din zona centrală, așa cum prevede Regulamentul.

Pentru anul 2022 fac excepție de la această hotărâre:

- 1. omologările prin recunoașterea reciprocă a autorizațiilor emise în zona de sud - cu condiția ca în dosarul biologic să existe minim 2 teste de eficacitate din zona OEPP Europa de Sud-Est (căreia îi aparține România pentru organismul țintă) sau din Bulgaria (condiții stabilite în ședința CNOPPP din 24.11.2020).**
- 2. reînnoirea autorizațiilor pe art. 43, pentru produsele de protecția plantelor la care omologarea s-a efectuat pe baza testelor de eficacitate realizate, în alte zone – cu condiția efectuării a cel puțin 2 teste de eficacitate în zona centrală. Certificatul de omologare se va prelungi cu un sezon, până la definitivarea acestor teste și depunerea la secretariatul CNOPPP, în vederea reînnoirii autorizației, conform art.43 din Regulamentul 1107/2009.**



Începând cu anul 2023, indiferent de procedura după care se face evaluarea (autorizare zonală, recunoaștere reciprocă, reînnoire autorizații art. 43, etc.), testele de eficacitate pot fi acceptate la evaluare, numai din zona centrală, așa cum prevede Regulamentul.

2. Ca urmare a aplicării prevederilor **REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/94** al Comisiei privind nereînnoirea aprobării substanței active fosmet, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei, pentru următoarele produse de protecție a plantelor:

- **IMIDAN 40 WG** (certificat de omologare nr. 289PC/28.02.2017)
- **IMIDAN 50 WG** (certificat de omologare nr. 711PC/09.09.2021).

certIFICATELE de omologare de retrag de la 01.05.2022, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării **o perioadă de grație de 2 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.07.2022)**, la care se adaugă **o perioadă de grație de 4 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 01.11.2022)**.

3. La solicitarea **Evergreen Garden Care, Austria**, se retrage omologarea produsului de protecție a plantelor **Roundup 60**. Astfel, certificatul de omologare nr. 332PC/29.06.2017, se retrage de la data de 24.03.2022 fără acordarea unei perioade de grație.

4. La solicitarea **Corteva Agriscience România SRL**, se retrage omologarea produsului de protecție a plantelor **KELVIN TOP**. Astfel, certificatul de omologare nr. 2728/25.10.2007 se retrage de la data de 24.03.2022 fără acordarea unei perioade de grație.

5. La solicitarea **Corteva Agriscience România SRL**, se retrage omologarea produsului de protecție a plantelor **LONTREL 300**. Astfel, certificatul de omologare nr. 1070/08.11.1984, se retrage de la data de 24.03.2022, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 24.09.2022), la care se adaugă o perioadă de grație de 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 24.02.2023).

6. La solicitarea **UPL Agricultural Solutions România SRL**, se retrage omologarea produsului de protecție a plantelor **SEMPRA** - a doua denumire comercială a produsului de protecție a plantelor **PELICAN 500**. Astfel, pentru produsul de protecție a plantelor **SEMPRA**, certificat de omologare nr. 2774/27.03.2008, se retrage de la data de 24.03.2022 fără acordarea unei perioade de grație.

7. La solicitarea **UPL Europe Ltd, Marea Britanie**, se retrage omologarea produsului de protecție a plantelor **VIVENDI 200**, ca urmare a nesusținerii produsului conform art.43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009. Astfel, certificatul de omologare nr.244PC/20.10.2016, se retrage de la data de 30.04.2022, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 30.10.2022), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 30.10.2023).

8. Ca urmare a nesusținerii conform art.43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 a produsului de protecție a plantelor **BARCA 334 SL/(GALA 334 SL - a doua denumire comercială)** de către deținătorul omologării, certificatul de omologare se retrage de la data de 30.04.2022 iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 30.10.2022), la care se adaugă o



perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 30.10.2023).

9. Se respinge solicitarea **HELM AG, Germania**, privind acordarea unei perioade de grație pentru epuizarea stocurilor etichetate în baza vechii clasificări CLP pentru produsele de protecție a plantelor **SIMBA/(FALSTAR-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.334PC/28.08.2017) și **HELMSTAR 75 WG/(TRIMEO-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.2596/14.12.2005).

10.CNOPPP a luat notă de clarificările aduse de către **Corteva Agriscience România SRL** cu privire la schimbarea denumirii comerciale a adjuvantului **Trend 90** în **VIVOLT** exclusiv pentru produsele de protecție a plantelor comercializate de către Corteva Agriscience România SRL.

11.CNOPPP a luat notă de solicitarea **Bayer SRL**, privind evaluarea de către România a creșterii densității semințelor pentru porumbul tratat cu **REDIGO M 120 FS** (certificat de omologare nr. 514PC/12.07.2019).

12.CNOPPP a aprobat solicitarea **BASF SE, Germania**, privind reducerea dozei sub formă de interval a produsului de protecție a plantelor **SYSTIVA 333 FS** (certificat de omologare nr. 058PC/29.09.2014) pentru cultura de grâu de toamnă de la 150 mL/100 kg semințe la 75-150 mL/100 kg semințe iar pentru cultura orz de toamnă la agenții fitopatogeni *Pyrenophora graminea* și *Fusarium nivale* de la 150 mL/100 kg semințe la 75-150 mL/100 kg semințe.

13.CNOPPP a aprobat solicitarea **BASF SE, Germania**, privind extinderea omologării produsului **PRIAXOR EC/(IMPERIS ULTRA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 273PC/28.02.2017) pentru controlul *Fusarium* spp. în cultura de grâu.

14.CNOPPP a aprobat solicitarea **SBM Developpement, Franța** privind modificarea condițiilor de aprobare a produsului **BELEM 0,8 MG/(PICADOR 0,8 MG - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 095PC/21.01.2015, respectiv aplicarea a două tratamente succesive la semănatul culturilor de porumb și floarea - soarelui pentru combaterea organismului dăunător *Tanymecus dilaticollis*.

15.CNOPPP a aprobat recertificarea BPE a **SC BASF SRL - prin Centrul de Competențe Tehnice** până la data de 09.05.2026.

16.CNOPPP a aprobat propunerea Comisiei de Protecție a Plantelor ASAS de certificare BPE a companiei **SAGEA AGROMANIA SRL** și de recertificare BPE a **SC AGROBLU ROMÂNIA SRL, SC AGROTEST ROMÂNIA SRL** și a Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov.

17.CNOPPP a luat notă de schimbarea denumirii companiei **Bio-Ferm Biotechnologische Entwicklung und Produktion GmbH, Austria** în **SAN Agrow Holding GmbH, Austria**.

3a. SCHIMBARE DENUMIRI COMERCIALE

18.La solicitarea **Adama Agricultural Solutions SRL** denumirea comercială a produsului **CAPTADIN 80 WDG** (a doua denumire comercială a produsului **MERPAN 80 WDG**) a fost schimbată în **FLO-CAPTAN**.

19.La solicitarea **Barclay Chemicals (R&D) Ltd.** denumirea comercială a produsului **TARTAN 360** a fost schimbată în **COSMIC NEO**.

20.La solicitarea **SINON EU GmbH** denumirea comercială a produsului **GLISTER ULTRA** a fost schimbată în **GLYPHOCOVER**.



21. La solicitarea **HELM AG, Germania** denumirea comercială a produsului **TARTAROS** a fost schimbată în **ERA**.

22. La solicitarea **S.C. ALCHIMEX S.A.** denumirea comercială a produsului **POINTER ULTRA** a fost schimbată în **RIVAL ULTRA**.

3b. SCRISORI DE REPREZENTARE

23. Doamnele **Violeta DUMITRU, Maria NICULIU și Mihaela Alexandra PAPA** vor reprezenta compania **BAYER SRL** în procesul de omologare și comunicarea cu autoritățile române implicate.

24. Compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta compania **SAN Agrow Holding GmbH** în procesul de omologare și comunicarea cu autoritățile române implicate.

25. Compania **SHARTEC SRL** va reprezenta compania **GLOBACHEM N.V., Belgia** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și comunicarea cu autoritățile române implicate.

26. Compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta compania **Azuferra y Fertilizantes Pallares, S.A. (AFEPASA)** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și comunicarea cu autoritățile române implicate.

27. Compania **ANTARIPA PPP SRL** va reprezenta compania **Pestila Sp. z.o.o.** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor **AFRODYTA 250 SC, HERMES 069 EW, BARCA 335 SL/GALA 334 SL-** a doua denumire comercială, **ZNACHOR 500 SC** și comunicarea cu autoritățile române implicate.

28. Compania **ANTARIPA PPP SRL** va reprezenta compania **Ciech Sarzyna S.A., Polonia** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și comunicarea cu autoritățile române implicate.

29. Compania **Summit Agro SRL, România** va reprezenta compania **Finchimica S.p.A., Italia** în procesul de omologare a produsului de protecție a plantelor **PROTIOSTAR 250 SC** și comunicarea cu autoritățile române implicate.

3c. NOTIFICĂRI TRANSFER PRODUSE

30. CNOPPP a luat notă de transferul produsului de protecție a plantelor **TARTAROS** (certificat de omologare nr.721PC/07.12.2021) de la **HELM AG, Germania** către **CAC Chemical GmbH (CAC), Germania**.

31. CNOPPP a luat notă de transferul produselor de protecție a plantelor **AXCELA** (certificat de omologare nr.201PC/03.06.2016) și **SLIMAX** (certificat de omologare nr.464PC/15.11.2018) de la **Lonza Cologne GmbH, Germania** către **YOU Solutions Germany GmbH, Germania**.

3d. NOTIFICĂRI LOCAȚII DE FORMULARE

31. La solicitarea companiei **BARCLAY CHEMICALS (R&D)**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **VALENTIA** (certificat de omologare nr. 680PC/ 22.04.2021).

32. La solicitarea companiei **SHARDA CROP CHEM ESPANA SL**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **FLYER 5 SC** (certificat de omologare nr. 714PC/ 09.09.2021).

33. La solicitarea companiei **SHARDA CROP CHEM ESPANA SL**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **ROYALTY 50 WG** (certificat de omologare nr. 609PC/ 30.06.2020).

34. La solicitarea companiei **SHARDA CROP CHEM ESPANA SL**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **SHARPEN 33 EC/ (PENDITIM 33 EC - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 104PC/ 21.01.2015).



35. La solicitarea companiei **ISAGRO SpA, Italia**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **SCATTO/ (DEMETRINA 25 EC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 263PC/ 19.12.2016).
36. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsele: **PRINCIPAL PLUS/ (CORDUS PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 038PC/ 27.02.2014), **PRINCIPAL/ (CORDUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2819/ 18.12.2008), **ARIGO/ (COLOMBUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 031PC/ 17.12.2013), **TITUS PLUS** (certificat de omologare nr. 2108/ 11.04.2001), **BASIS** (certificat de omologare nr. 1875/ 15.12.1998).
37. La solicitarea companiei **BASF SE**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **BUTISAN DUO** (certificat de omologare nr. 172PC/ 16.03.2016).
38. La solicitarea companiei **BASF SE**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsele **BUTISAN S** (certificat de omologare nr. 238PC/20.10.2016) și **BUTISAN 400 SC** (certificat de omologare nr. 2076/02.11.2000).
39. La solicitarea companiei **BASF SE**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **WING P** (certificat de omologare nr. 021PC/ 11.07.2013).
40. La solicitarea companiei **BARCLAY CHEMICALS (R&D)**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsele **GALLUP SUPER 360 / (BARBARIAN SUPER 360** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 270PC/ 19.12.2016) și **TARTAN 360/ (CLEAN UP GOLD** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 695PC/ 22.04.2021).
41. La solicitarea companiei **GHARDA CHEMICALS EUROPE LTD**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **DIMBO 480 SL / (COMPAS SUPER** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 175PC/ 16.03.2016).
42. La solicitarea companiei **FINCHIMICA S.p.A**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **PROTIOSTAR 250 EC** (certificat de omologare nr. 720PC/ 07.12.2021).
43. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **MUSTANG/ (VECTOR** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 1862/ 29.09.1998).
44. La solicitarea companiei **PROPLAN PLANT COMPANY SL**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **TOSCANA / (POIROT** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 180PC/ 16.03.2016).
45. CNOPPP a luat notă de transferul unor locații de formulare pentru produsele: **ARIGO/ (COLOMBUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 031PC/ 17.12.2013), **BASIS** (certificat de omologare nr. 1875/ 15.12.1998), **CURZATE F** (certificat de omologare nr. 2583/ 14.12.2005), **KELVIN TOP** (certificat de omologare nr. 2728/ 25.10.2007), **PRINCIPAL/ (CORDUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2819/ 18.12.2008), **QUELEX** (certificat de omologare nr. 631PC/ 30.06.2020), **TITUS PLUS** (certificat de omologare nr. 2108/ 11.04.2001), **LANCELOT SUPER** (certificat de omologare nr. 2861/ 18.04.2011) ca urmare a informărilor companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**.
46. CNOPPP a luat notă de transferul unor locații de formulare pentru produsele: **PRINCIPAL PLUS/ (CORDUS PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 038PC/ 27.02.2014) și **VICTUS OD** (certificat de omologare nr. 236PC/ 20.10.2016) ca urmare a informărilor companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**.
47. La solicitarea companiei **S.C. ALCHIMEX S.A.**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **RIVAL ULTRA** (certificat de omologare nr. 2675/19.12.2006).
48. La solicitarea companiei **ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS S.R.L**, au fost aprobate noi locații de formulare pentru produsul **SULTAN 50 SC / (MAGISTRAL 50 SC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2159/ 11.10.2002).



3e. COFORMULANȚI

49. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE** a fost aprobată utilizarea unor surse adiționale de coformulant în compoziția produselor **ARIGO/(COLOMBUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 031PC/ 17.12.2013), **VICTUS OD** (certificat de omologare nr. 236PC/ 20.10.2016), **BASIS** (certificat de omologare nr. 1875/ 15.12.1998), **PRINCIPAL/ (CORDUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2819/ 18.12.2008), **PRINCIPAL PLUS/ (CORDUS PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 038PC/ 27.02.2014), **TITUS PLUS** (certificat de omologare nr. 2108/ 11.04.2001).

50. Notificare **CORTEVA AGRISCIENCE**, înregistrată la ANF cu nr.3337/09.03.2022, privind schimbarea denumirii unui coformulant aflat în compoziția produsului **ZORVEC ENDAVIA** (certificat de omologare nr. 642PC/ 24.11.2020).

3f. MODIFICĂRI MINORE

51. La solicitarea companiei **Ciech Sarzyna SA**, a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **FENUXAR 69 EW** (certificat de omologare nr. 689PC/ 22.04.2021).

52. La solicitarea companiei **Ciech Sarzyna SA**, a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **FAWORYT 300 SL/ (DICOSUN** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 503PC/ 14.03.2019).

53. La solicitarea companiei **Ciech Sarzyna SA**, a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **NIKOSAR 060 OD / (RADIAL EXTRA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 377PC/ 29.11.2017).

54. La solicitarea companiei **NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L**, a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **LEIMAY/ (GACHINKO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 344PC/ 29.11.2017).

55. La solicitările companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**, au fost aprobate modificările minore în compoziția produselor **PRINCIPAL PLUS/ (CORDUS PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 038PC/ 27.02.2014), **PRINCIPAL/ (CORDUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2819/ 18.12.2008), **ARIGO/(COLOMBUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 031PC/ 17.12.2013), **BASIS** (certificat de omologare nr. 1875/ 15.12.1998), **VICTUS OD** (certificat de omologare nr. 236PC/ 20.10.2016), **TITUS PLUS** (certificat de omologare nr. 2108/ 11.04.2001).

3g. SURSE DE SUBSTANȚE ACTIVE

56. La solicitarea companiei **Ciech Sarzyna SA**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *nicosulfuron* aflată în compoziția produsului **NIKOSAR 060 OD/ (RADIAL EXTRA** - a doua denumire comercială).

57. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o, POLONIA**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *triticonazol* aflată în compoziția produsului **TRITER 050 FS**.

58. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o, POLONIA**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *deltametrin* aflată în compoziția produselor **DELMETROS 100 SC/ (KORON 100 SC** - a doua denumire comercială) și **DelCaps 050 CS/(DelTop 050 CS** - a doua denumire comercială).

59. La solicitarea companiei **BARCLAY CHEMICALS (R&D)**, au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă *florasulam* aflată în compoziția produsului **VALENTIA**.

60. La solicitarea companiei **Nufarm Romania SRL**, au fost aprobate trei surse adiționale pentru substanța activă *tebuconazol* aflată în compoziția produsului **ORIOUS 25 EW/ (SALVATOR 25 EW** - a doua denumire comercială)

61. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o, POLONIA**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *nicosulfuron* aflată în compoziția produselor **NIXON 50 SG/ (HENIK 50 SG** - a doua



denumire comercială), **MEZONIR 340 WG** și **HENIK EXTRA 040 OD/ (PLONARIUS EXTRA 040 OD** - a doua denumire comercială).

62. La solicitarea companiei **BASF SE** au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă *florasulam* aflată în compoziția produsului **BIATHLON 4D/ (ANDOR** - a doua denumire comercială).

63. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *trinexapac-etil* aflată în compoziția produsului **MODDUS 250 EC** și **MODDUS EVO**.

64. La solicitarea companiei **ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *deltametrin* aflată în compoziția produsului **DELTA GRI / (FASTER DELTA** - a doua denumire comercială).

65. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *nicosulfuron* aflată în compoziția produselor **PRINCIPAL PLUS/ (CORDUS PLUS** - a doua denumire comercială), **PRINCIPAL/ (CORDUS** - a doua denumire comercială) și **VICTUS OD**.

66. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *halauxifen metil* aflată în compoziția produselor **BELKAR, KORVETTO, PIXXARO, QUELEX, VIBALLA, REXADE, TARZEC, BELKAR SUPER**.

67. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o, POLONIA**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *tebuconazol* aflată în compoziția produselor **ZIZAN 500 SC/ (AMBROSSIO 500 SC** - a doua denumire comercială) și **KIER 450 SC/ (MOLLIS 450 SC** - a doua denumire comercială).

68. La solicitarea companiei **FINCHIMICA S.p.A**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *protioconazol* aflată în compoziția produsului **PROTIOSTAR 250 EC**.

69. La solicitarea companiei **ADAMA AGRICULTURAL SOLUTION SRL, ROMANIA**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *trinexapac-etil* aflată în compoziția produsului **STEMPER**.

70. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE**, au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă *florasulam* aflată în compoziția produsului **MUSTANG/ (VECTOR** - a doua denumire comercială).

71. La solicitarea companiei **HELM AG, GERMANIA**, au fost aprobate două surse adiționale pentru substanța activă *protioconazol* aflată în compoziția produsului **TARTAROS**.

3h. AMBALAJE ADIȚIONALE

72. La solicitarea **SBM DEVELOPPEMENT**, a fost aprobat ambalajul adițional de **1,2 kg** pentru produsul de protecție a plantelor **COLUMBO 0,8MG**, omologat cu certificatul de omologare nr.587 PC/03.02.2020.

73. La solicitarea **EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.**, au fost aprobate ambalaje adiționale, pentru produsul de protecție a plantelor **ESTIUOIL / (YAGOS** - a doua denumire comercială), omologat cu certificatul de omologare nr. 586 PC/ 03.02.2020, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L	PE AD (HDPE) (alb)/PE AD(alb)/ COEX (alb)	Flacon	100mL; 250mL; 500mL	COEX	Flacon
5L	PE AD (HDPE) (alb)/COEX (alb)	Bidon			
10L	PE M/APM(alb)/ HDPE (alb)	Bidon			
20L	HDPE (albastru)	Bidon			
25L	HDPE (albastru) / PE M/ AM	Bidon			
60L	HDPE	Bidon			



74. La solicitarea **CORTEVA AGRISCIENCE ROMÂNIA SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **EXALT**, omologat cu certificatul de omologare nr.712PC/09.09.2021, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE		AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		AMBALATOR
Capacitate	Material	Capacitate	Material	
0,25L; 0,5L; 1L; 2L; 3L; 5L; 10L; 15L	PET	20mL	Monodoze 20mL-Folie transparentă 350 PET.GAG/70 μ PE/EVOH/PE, tipărită 1 culoare(negru)	CHEMARK România
0,25L; 0,5L; 1L; 2L; 3L; 5L;10L; 15L; 20L	HDPE	200mL	Flacoane 250mL COEX(HDPE/PA) + capace cu diam. 36mm, cu inel de siguranță și liner pentru lipire prin termosudare.	CHEMARK România

75. La solicitarea **CORTEVA AGRISCIENCE ROMÂNIA SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor: **CURZATE**, omologat cu certificatul de omologare.nr.422PC/05.06.2018 și **ZORVEC ENDAVIA**, omologat cu certificatul de omologare nr.642PC/24.11.2020, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	PRODUS	AMBALAJE OMOLOGATE		AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		AMBALATOR
		Capacitate	Material	Capacitate	Material	
1	CURZATE	500 G/sac 1kg /sac 1,5 L/sticlă	Folie aluminiu căptușită cu polietilenă Folie aluminiu căptușită cu polietilenă HDPE	200 G 1 kg	Folie multistrat PET/PETMET/PE Folie multistrat PET/PETMET/PE	AGRII
2	ZORVEC ENDAVIA	18mL - 50mL 60mL-100mL 110mL- 200mL 210mL- 300mL 310mL- 500mL 600mL- 1L 1,5L- 3L 3,5L-5L 8L-10L	Polietilenă fluorurată de înaltă densitate COEX, HDPE, EVOH	40 mL 400mL	Flacoane HDPE Flacoane HDPE	AGRII

76. La solicitarea **DOW AGROSCIENCE EXPORT SAS**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor: **CLOSER**, omologat cu certificatul de omologare nr. 537PC/12.07.2019, **DELEGATE**, omologat cu certificatul de omologare nr. 536PC/17.07.2019 și **LASER 240 SC**, omologat cu certificatul de omologare nr. 2155/11.10.2002, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	PRODUS	AMBALAJE OMOLOGATE		AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		AMBALATOR
		Capacitate	Material	Capacitate	Material	
1	CLOSER	250mL;500mL; 1L;2L;3L;5L; 10L;20L	PET, HDPE	10mL	Folie transparentă 250 μ PET.GAG.PE/70 μ PE. EVOH.PE+23 μ PCTFE	CHEMARK România
2	DELEGATE	0,25L,0,5L,1L,2L 3L,5L,10L,15L	PET	3 g	Plic pentru 3 g-din folie hârtie+Aluminiu+PE	CHEMARK România



		0,25L,0,5L,1L,2L 3L,4L,5L,10L,1 5L, 20L	HDPE			
		0,1Kg,0,2Kg, 0,25kg,0,5 Kg, 1 Kg,2 Kg,3 Kg, 4 Kg,5 Kg	Folie Bag			
3.	LASER 240	250mL,500mL, 1L	PET	10mL	Folie transparentă 250 µ PET.GAG.PE/70 µ PE. EVOH PE + 23 µ PCTFE	CHEMARK România

77. La solicitarea **INNIGO AGRO SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **INVISTER 300SL / MEPIK 300SL**, omologat cu certificatul de omologare nr. 416PC /28.02.2018, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,25 L	PE/PA	-	120 mL	HDPE/PA COEX	Flacon
0,50 L	PE/PA	-	275 mL	HDPE/PA	Flacon
1 L	PE/PA	-	323 mL	HDPE/PA COEX	Flacon
5 L	PE/PA	-	574 mL	HDPE/PA	Flacon
10 L	PE/PA	-	550 mL	HDPE/PA COEX	Flacon
			500 mL	HDPE/PA	Flacon
			1000 mL	HDPE/PA COEX	Flacon
			1000 mL	HDPE/PA	Flacon
			1100 mL	HDPE/PA COEX	Flacon
			5850 mL	HDPE/PA COEX	Recipient
			5500 mL	HDPE/PA COEX	Flacon
			5000 mL	HDPE/PA COEX	Flacon, bidon
			10000 mL	HDPE/PA COEX	Recipient
			500mL	HDPE/EvOH	Flacon
			1000 mL	HDPE/EvOH	Recipient
			5000 mL	HDPE/EvOH	Recipient
			10000 mL	HDPE/EvOH	Recipient
			20000 mL	HDPE/EvOH	Recipient
			100 mL	COEX/EvOH	Flacon
			250 mL	COEX/EvOH	Flacon
			120 mL	HDPE/F	Flacon
			318 mL	HDPE/F	Flacon
			312 mL	HDPE/F	Flacon
			585 mL	HDPE/F	Flacon
			580 mL	HDPE/F	Flacon
			575 mL	HDPE/F	Flacon
			570 mL	HDPE/F	Flacon
			1150 mL	HDPE/F	Flacon
			1160 mL	HDPE/F	Flacon
			1170 mL	HDPE/F	Flacon
			1185 mL	HDPE/F	Flacon
			1200 mL	HDPE/F	Flacon
			5880 mL	HDPE/F	Bidon
			5950 mL	HDPE/F	Bidon, recipient
			10000 mL	HDPE/F	Bidon



78. La solicitarea **BARCLAY CHEMICALS Ltd.**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **TARTAN 360 /CLEAN UP GOLD - a doua denumire comercială**), omologat cu certificatul de omologare nr.695PC/22.04.2021, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L	HDPE	-	100 mL	HDPE	-
2 L	HDPE	-	250 mL	HDPE	-
5 L	HDPE	-	500 mL	HDPE	-
10 L	HDPE	-			
15 L	HDPE	-			
20 L	HDPE	-			
25 L	HDPE	-			
200 L	HDPE	containere			
500 L	HDPE	containere			
640 L	HDPE	containere			
1000 L	HDPE	containere			

79. La solicitarea **UPL Agricultural Solutions România**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **ARGOS**, omologat cu certificat de omologare nr.683PC /22.04.2021, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
5L,10L,20L	HDPE-F	CANISTER	1000mL,500mL, 100mL,10mL	HDPE-F	
200L	HDPE-F	DRUM			
500L,1000L	HDPE-F	CONTAINER			
200L	IRON DRUM	DRUM			

80. La solicitarea **PESTILA Spółka z o.o.**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **AFRODYTA 250 SC**, omologat cu certificat de omologare nr.583 PC /03.02.2020, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
500 mL, 1L	HDPE	Sticlă	250 mL	HDPE	Sticlă
5 L, 10L, 20L	HDPE	Canistră	220 L	HDPE	Tambur
500 mL, 1L	HDPE/PA (COEX)	Sticlă	1000 L	HDPE	Container
5 L, 10 L, 20 L	HDPE/PA (COEX)	Canistră	250 mL	HDPE/PA (COEX)	Sticlă
			250 mL	fHDPE	Sticlă

81. La solicitarea **INNIGO AGRO SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **HERBOS 110 EC/FENOXINN 110 EC**, omologat cu certificatul de omologare nr. 328PC /29.06.2017, conform tabelului de mai jos:



AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,5 L	HDPE/EVOH	FLACON	0,5L	HDPE/PA	FLACON
1 L	HDPE/EVOH	FLACON	0,5 L	HDPE/PA COEX	FLACON
5L	HDPE/EVOH	RECIPIENT	1 L	HDPE/PA COEX	FLACON
10L	HDPE/EVOH	RECIPIENT	1 L	PE/PA	FLACON
			1 L	HDPE/PA COEX	FLACON
			5L	HDPE/PA COEX	FLACON, RECIPIENT, CANISTRĂ
			10L	HDPE/PA COEX	RECIPIENT

82. La solicitarea **INNIGO AGRO SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **RASSEL 100SC**, omologat cu certificatul de omologare nr.621PC/30.06.2020, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
	Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1	0,250 L	HDPE	flacon	100mL;250 mL	COEX/EVOH	flacon, recipient
2	0,5 L	HDPE	flacon	500mL;1,0L; 5,0 L; 10 L; 20 L	HDPE/EVOH	flacon, recipient
3	0,6 L	HDPE	flacon	120mL;323mL;55 0mL; 1,0L;1,1L;5,0L;5, 5L; 5,85L;10,0L	HDPE /PA / COEX	flacon, recipient, canistră
4	0,8 L	HDPE	flacon	275mL; 500mL;574mL; 1,0L	HDPE /PA	flacon
5	1,0 L	HDPE	flacon	120mL;312mL;31 8mL; 570mL;575mL;58 0mL; 585mL;1,15L;1,1 6L; 1,17L;1,185L;1,2 L;5,88L; 5,95L;10,0L.	HDPE/F	flacon, canistră
6	2,0 L	HDPE	flacon	188mL;564mL;510 mL;1,2L;5,85L;6,0 L;11,22L;22,0L	HDPE	flacon, recipient, canistră
7	3,0 L	HDPE	recipient			
8	4,0 L	HDPE	canistră			
9	5,0 L	HDPE	flacon, recipient, canistră			
10	10 L	HDPE	recipient, canistră			
11	20 L	HDPE	recipient, canistră			



83. La solicitarea **Syngenta Agro SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **FORCE 1,5 G**, omologat cu certificatul de omologare nr. 2767/27.03.2008, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
50 g	HDPE	Canistră	100 g	Folie hârtie / PET metalizat / PE	Plic
100 g	HDPE	Canistră	1 kg	Folie hârtie / PET metalizat / PE	Plic
250 g	HDPE	Canistră			
500 g	HDPE	Canistră			
1 kg	HDPE	Canistră			
5 kg	HDPE	Canistră			
10 kg	HDPE	Canistră			

84. La solicitarea **Syngenta Agro SRL**, au fost aprobate ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor: **VERTIMEC 1,8% EC**, omologat cu certificatul de omologare nr.1774/13.02.1997, **AFFIRM**, omologat cu certificatul de omologare nr. 2857/15.12.2010 și **DUAL GOLD 960 EC/TENDER-** a doua denumire comercială), omologat cu certificatul de omologare nr.1854/29.09.1998, conform tabelelor de mai jos:

VERTIMEC 1,8% EC

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
250 mL	HDPE	Bidon	25 mL (20 mL produs)	HDPE	Bidon
1 L	HDPE	Canistră	100 mL	HDPE	Bidon
5 L	HDPE	Canistră			

AFFIRM

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
250 g	HDPE	Canistră	20 g	Folie hârtie/ PET metalizat /PE	Plic
500 g	HDPE	Canistră			
1 kg	HDPE	Canistră			
5 kg	HDPE	Canistră			
10 kg	HDPE	Canistră			
250 g	PE	Cutie			
250 g	PE/PA Compozit	Cutie			
500 g	Folie hârtie / PET metalizat /PE	Cutie			
1 kg	Folie hârtie / PET metalizat	Cutie			



	/ PE				
5 kg	PVC și film PE	Cutie			

DUAL GOLD 960 EC/(TENDER - a doua denumire comercială)

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE APROBATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
500mL	HDPE/PA	BIDON	100 mL	HDPE	BIDON
1 L	PET	BIDON			
5 L	HDPE	BIDON			
10 L	HDPE	BIDON			
20 L	HDPE	BIDON			
1000 L	HDPE	BUTOI			

PREȘEDINTE

Paulina GABOR

