


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 25.04.2024

A. OMOLOGARE

NR. CR T.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ (art.33-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)					
FUNGICIDE					
1.	REVFLEX 66,6 g/L mefentrifluconazol + 80 g/L piraclostrobin + 100 g/L metrafenonă	BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Elveția CO:956PC/25.04.2024	SMRZ: POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM*, GRÂU SPELTA*: <i>Blumeria graminis</i> , <i>Zymoseptoria tritici</i> , <i>Puccinia triticina</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> , <i>Oculimacula spp.</i> • 0,5 -1 L/ha ORZ DE TOAMNĂ: <i>Blumeria graminis</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Puccinia hordei</i> • 0,5 -1 L/ha SECARĂ DE TOAMNĂ*: <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Puccinia recondita</i> • 0,5 -1 L/ha TRITICALE DE TOAMNĂ*: <i>Blumeria graminis</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Puccinia striiformis</i> • 0,5 -1 L/ha *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>PERICOL</u>
2.	QUESTAR 50 g/L fenpicoxamidă	Corteva Agriscience România SRL CO:957PC/25.04.2024	SMRZ: POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU SPELTA*, GRÂU DURUM*: <i>Puccinia triticina</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Septoria tritici</i> • 1,5-2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinei până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69).	<u>PERICOL</u>



				TRITICALE DE TOAMNĂ: <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Septoria spp</i> • 1,5-2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinei până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69).	
				SECARĂ DE TOAMNĂ: <i>Puccinia recondite</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> • 1,5-2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinei până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	INSIGNIA 200 g/kg piraclostrobin	BASF SE, Germania CO:958PC/25.04.2024	SMRZ: OLANDA	PORUMB: <i>Setosphaeria turcica</i> , <i>Kabatiella zae</i> , <i>Cochliobolus carbonum</i> , <i>Puccinia sorghi</i> • 0,5*-1 kg/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea paniculului în partea superioară și inferioară (BBCH 31-65). *Doza de 0,5 kg/ha se va aplica doar în cazul unor presiuni de atac reduse	ATENȚIE
ERBICIDE					
1.	BOKATOR 30 g/L diflufenican + 600 g/L aclonifen	Globachem N.V., Belgia CO:959PC/25.04.2024	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	CARTOF: Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate <i>(Echinochloa crus-galli, Polygonum convolvulus, Chenopodium album, Viola spp., Polygonum aviculare, Amaranthus retroflexus, Matricaria inodora, Polygonum lapathifolium Solanum nigrum, Ambrosia artemisiifolia etc.)</i> • 1,9 L/ha Se aplică preemergent, de la semănat/plantat până când cotiledoanele se apropie de suprafața solului dar înainte de răsărire (BBCH 00-08). FLOAREA SOARELUI: Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate <i>(Echinochloa crus-galli, Polygonum convolvulus, Chenopodium album, Viola spp., Polygonum aviculare, Amaranthus retroflexus, Matricaria inodora, Polygonum lapathifolium Solanum nigrum, Ambrosia artemisiifolia etc.)</i> • 1,9 L/ha Se aplică preemergent, de la	ATENȚIE



				semănat/plantat până când cotiledoanele se apropie de suprafața solului dar înainte de răsărire (BBCH 00-08).	
2.	HERBICLEAN SPRAY 30,0 g/L acid nonanoic (acid pelargonic)	SBM Development SAS, Franța CO:960PC/25.04.2024	SMRZ: OLANDA	DRUMURI ȘI SUPRAFETE AFANATE SAU PIETROASE: Buruieni anuale, bianuale sau perene și mușchi (ex: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Bryophyta</i> sp., <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Geranium molle</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Veronica arvensis</i> , etc.) • 1000 mL/10m²	-----
INSECTICIDE					
1.	CARNADINE MAX 200 g/L acetamiprid	Nufarm Europe GmbH, Germania CO:961PC/25.04.2024	SMRZ: AUSTRIA	CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,15 L/ha (1 tratament) • 0,12 L/ha (2 tratamente la interval minim de 7 zile) Se aplică de la apariția primilor muguri individuali (1-2 mm) până la maturitatea boabelor (BBCH 51-89). GRÂU, TRITICALE*, ORZ, GRÂU DURUM* (DE TOAMNĂ): <i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Sitobion avenae</i> • 0,15 L/ha Se aplică de la începutul înfrățirii până când boabele de cereale au o consistență lăptoasă (BBCH 21-75). ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Sitobion avenae</i> • 0,15 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). PORUMB: <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> • 0,15 L/ha Se aplică de la apariția inflorescențelor până când boabele de porumb au o consistență lăptoasă (BBCH 51-75). <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,30 L/ha Se aplică de la apariția inflorescențelor până când boabele de porumb au o consistență lăptoasă (BBCH 51-75).	ATENȚIE



				<u>RAPITĂ DE TOAMNĂ:</u> <i>Ceutorhynchus napi</i>, <i>Ceutorhynchus quadridens</i>, <i>Ceutorhynchus assimilis/obstrictus</i>, <i>pallidactylus</i>, <i>Dasineura brassicae</i> • 0,20 L/ha Se aplică de la primul internod vizibil până la apariția primelor petale când mugurii floriali sunt încă închiși (BBCH 31-59). <i>Meligethes aeneus</i> • 0,20 L/ha Se aplică din stadiul în care mugurii floriali sunt prezenți, dar sunt acoperiți de frunze până la apariția primelor petale când mugurii floriali sunt încă închiși (BBCH 50-59). <i>Psylliodes chrysocephala</i> • 0,20 L/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până în stadiul de 9 sau mai multe frunze desfăcute (BBCH 11-19). Nu se aplică în perioada de înflorire. <u>TUTUN*:</u> <i>Myzus persicae</i> • 0,15 L/ha Se aplică la apariția dăunătorilor. <i>Thrips tabaci</i> • 0,25 L/ha Se aplică la apariția dăunătorilor. <u>GRÂU ALAC*, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*, TRITICALE DE PRIMĂVARĂ*:</u> <i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Sitobion avenae</i> • 0,15 L/ha Se aplică de la începutul înfrățirii până când boabele de cereale au o consistență lăptoasă (BBCH 21-75). <u>SORG*, DUGHIE*, MEI*:</u> <i>Diabrotica virgifera virgifera</i>, <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,15 L/ha Se aplică de la apariția inflorescențelor până când boabele de porumb au o consistență lăptoasă (BBCH 51-75). <u>PORUMB DULCE* (DOAR PENTRU PRODUCEREA DE SĂMÂNȚĂ):</u>
--	--	--	--	---



				<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> • 0,15 L/ha Se aplica de la apariția inflorescențelor până când boabele de porumb au o consistență lăptoasă (BBCH 51-75). <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,30 L/ha Se aplică de la apariția inflorescențelor până când boabele de porumb au o consistență lăptoasă (BBCH 51-75). <u>CARTOF DULCE*:</u> <i>Aphis</i> spp. • 0,12 L/ha Se aplică la apariția dăunătorilor. <u>RIDICHI*, SERADELA*, FACELIA*:</u> <i>Brevicoryne brassicae</i>, <i>Parthenothrips dracaenae</i>, <i>Otiorynchus</i> spp., <i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 0,15 L/ha Se aplică la apariția dăunătorilor. <u>PLANTELE CUPĂ* (<i>Silphium perfoliatum</i>, <i>Silphium integrifolium</i>):</u> <i>Aphis</i> spp., <i>Parthenothrips dracaenae</i>, <i>Trialeurodes vaporariorum</i>, <i>Otiorynchus</i> spp. • 0,15 L/ha Se aplică la apariția dăunătorilor. <u>BULBI ȘI TUBERCULI DE FLORI*, FLORI TĂIATE*, PEPINIERE DE FLORI*, CULTURI DE FLORI PERENE* (BEGONIA, CRIZANTEMA, GERANIUM, TRANDAFIRI, BUJOR ETC.)</u> <i>Aphis fabae</i>, <i>Aphis gossypii</i>, <i>Macrosiphoniella sanborni</i>, <i>Aulacorthum solani</i>, <i>Macrosiphon rosae</i>, <i>Myzus persicae</i>, <i>Parthenothrips dracaenae</i>, <i>Trialeurodes vaporariorum</i>, <i>Lygus</i> spp., <i>Otiorynchus</i> spp., etc. • 0,25 L/ha Se aplică la apariția dăunătorilor. **Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.
--	--	--	--	---



REGULATORI DE CREȘTERE

1.	HINGIOS 75 OD 75 g/L prohexadion (variante prohexadion calciu)	BAYER SRL, România CO:962PC/25.04.2024	SMRZ: POLONIA	RAPIDĂ DE TOAMNĂ: • 1,2 L/ha Se aplică de la 2 la 8 frunze (BBCH 12-18).	ATENȚIE
----	--	--	--------------------------------	--	----------------

OMOLOGARE ZONALĂ (art.34-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

INSECTICIDE

1.	ALAKAZAM 500 WG/(VELMERI 500 WG- a doua denumire comercială) 500 g/kg flonicamid	JT Agro Ltd, Irlanda CO: 810PC/07.12.2022	SMRZ: ROMÂNIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: VARZA ALBA, VARZA DE BRUXELLES: Afide (ex <i>Brevicoryne brassicae</i>), <i>Aleyrodes proletella</i> • 0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71). MAZARE VERDE*: <i>Myzus persicae</i> • 0,140 kg/ha Se aplică din aprilie până în iunie, de la sase frunze formate (cu stipele) sau trei cărcei dezvoltați până la 10% din păstai au atins mărimea caracteristică (BBCH 16-71). ORZ, OVĂZ, SECARĂ*: Afide (ex <i>Schizaphis graminum</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>) • 0,140 kg/ha Se aplică astfel: Toamna: De la prima frunză desfăcută până la înfrățire (BBCH 11-25). Primăvara: De la stadiul de frunză stindard complet dezvoltată până la maturitate în lapte (BBCH 39-77). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE
----	--	---	--------------------------------	---	----------------

FUNGICIDE

1.	PREVIOUS 840 SL 310 g/L fosetil + 530 g/L propamocarb	Sharda Cropchem Espana SL., Spania CO:963PC/25.04.2024	SMRZ: ROMÂNIA	TOMATE (SPAȚII PROTEJATE): <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp. • 3 L/ha aplicare la sol • 3 mL/m ² aplicare prin picurare CASTRAVETI (SPAȚII PROTEJATE): <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.	ATENȚIE
----	---	--	--------------------------------	---	----------------




				• 3 L/ha aplicare la sol • 3 mL/m² aplicare prin picurare PEPENE ROȘU (SPAȚII PROTEJATE): <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp. • 3 L/ha aplicare la sol • 3 mL/m² aplicare prin picurare	
--	--	--	--	--	--

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 – 42 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

FUNGICIDE

1.	GLOBALDIF	Globachem NV, Belgia CO:964PC/25.04.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	RAPIȚĂ DE TOAMNĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>; <i>Alternaria</i> spp. • 0,25 L/ha Se aplică de la apariția primelor flori până când 50% din florile de pe racemul principal se deschid și petalele mai vechi cad (BBCH 60-65;max.1 tratament/sezon. RAPIȚĂ DE PRIMĂVARĂ*: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>; <i>Alternaria</i> spp.; <i>Phoma lingam</i>; <i>Erysiphae</i> spp.; <i>Cladosporium</i> spp. • 0,25 L/ha Se aplică de la apariția primelor flori până când 50% din florile de pe racemul principal se deschid și petalele mai vechi cad (BBCH 60-65;max.1 tratament/sezon SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola</i> • 0,25 L/ha Se aplică din momentul când frunzele acoperă 90% din suprafața solului până când rădăcina de sfeclă a atins dimensiunea recoltabilă (BBCH 39-49);max.2 tratamente/sezon. SFECLĂ FURAJERĂ*: <i>Cercospora beticola</i>; <i>Uromyces betae</i>; <i>Erysiphe betae</i>; <i>Ramularia</i> spp. • 0,25 L/ha Se aplică din momentul când frunzele acoperă 90% din suprafața solului până când rădăcina de sfeclă a atins dimensiunea recoltabilă (BBCH 39-49);max.2 tratamente/sezon. CARTOF: <i>Alternaria solani</i> • 0,25 L/ha Se aplică din momentul când frunzele acoperă 90% din	ATENȚIE
----	-----------	---	---	--	---------




				suprafața solului până când rădăcina de sfeclă a atins dimensiunea recoltabilă (BBCH 39-49); max. 4 tratamente/sezon. *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care s-au efectuat nu s-au efectuat teste de eficacitate	
2.	MAXENTIS 150 g/L protioconazol + 200 g/L azoxistrobin	ADAMA Agricultural Solutions SRL, România CO:965PC/25.04.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	GRÂU: <i>Septoria tritici</i>, <i>Puccinia striiformis</i> <i>Puccinia recondita</i>, <i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>Tritici</i>, <i>Fusarium</i> spp. • 0,8 – 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69); max. 1 tratament/sezon. ORZ: <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora teres</i>, <i>Puccinia</i> sp. <i>hordei</i>, <i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>hordei</i> • 0,8 – 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la înflorire deplină (BBCH 30-65); max. 1 tratament/sezon. TRITICALE: <i>Septoria tritici</i>, <i>Puccinia recondita</i> • 0,8 – 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69); max. 1 tratament/sezon. SECARĂ: <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Puccinia recondita</i> • 0,8 – 1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la înflorire deplină (BBCH 30 - 65); max. 1 tratament/sezon. RAPITĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,8 – 1,0 L/ha Se aplică de la apariția mugurilor floralii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 50-69); max. 1 tratament/sezon. <i>Alternaria</i> spp. • 0,8 – 1,0 L/ha Se aplică de la înflorire deplină până când 30% din silicve au ajuns la maturitatea finală (BBCH 65-73); max. 1	ATENȚIE



				tratament/sezon.	
INSECTICIDE					
1.	LEPTOSAR 200 SL 200 g/L acetamiprid	CIECH Sarzyna S.A., Polonia CO:966PC/25.04.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	RAPITA DE TOAMNĂ: <i>Meligethes aeneus</i> • 0,15 -0,3 L/ha Se aplică din faza de început de dezvoltare a mugurilor florali până în faza în care primele petale sunt vizibile, dar bobocii florali sunt încă închisi (BBCH 50-59). <i>Ceutorhynchus napi,</i> <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> • 0,2 -0,3 L/ha Se aplică după infestarea culturii, la avertizare, (începutul alungirii tulpinii, fără internoduri) până la sfârșitul fazei de înmugurire (faza buton galben, bobocii florali sunt încă închisi) (BBCH 30-59). <i>Ceutorhynchus obstrictus</i> • 0,15 -0,3 L/ha Se aplică după infestarea culturii, la avertizare, (începutul alungirii tulpinii, fără internoduri) până la sfârșitul fazei de înmugurire (muguri galbeni) (BBCH 30-59). <i>Dasineura brassicae</i> • 0,15 -0,3 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfloriturii, până în faza în care 20% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 69-72). Nu se aplică în perioada de înflorire. PORUMB: <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,3 L/ha Se aplică de la începutul apariției inflorescenței (panicul) până în faza la începutul înfloririi: primele stamine vizibile (BBCH 51-61). PORUMB PENTRU FLORICELE*, SORG*, MEI*: <i>Ostrinia nubilalis, Aphis sp., (Rhopalosiphum maidis)</i> • 0,2 -0,3 L/ha Se aplică odată cu apariția dăunătorilor. Astfel: PORUMB FLORICELE* Se aplică de la începutul dezvoltării paniculelor până la maturitatea în lapte completă (spicele conțin	ATENȚIE



				aproximativ 40% substanță uscată) (BBCH 51-75). SORG – Se aplică de la faza în care vârful inflorescenței iese din teaca frunzei stindard până începutul maturității în lapte, boabele au dimensiune finală (BBCH 51-75). MEI – Se aplică de la faza în care vârful inflorescenței iese din teaca frunzei stindard până începutul maturității în lapte, boabele au dimensiune finală (BBCH 51-75). <u>TRITICALE DE PRIMĂVARĂ*</u> <u>TRITICALE DE TOAMNĂ*</u> <u>SECARĂ DE TOAMNĂ*</u> <i>Eurygaster maura</i> • 0,2 L/ha Se aplică odată cu apariția dăunătorilor, de la faza de început a alungirii fratelui principal până la sfârșitul inspicării - (BBCH 30-59). <u>SECARA DE PRIMĂVARĂ*</u> <u>GRĂU DURUM*, GRĂU SPELTA*, GRĂU EINKORN (ALAC)*:</u> <i>Oulema melanopus</i> • 0,2 L/ha Se aplică odată cu apariția dăunătorilor, de la faza de frunza stindard vizibilă, până la faza de înflorire completă când se formează 50% din antere (BBCH 37-65). <i>Eurygaster maura</i> • 0,2 L/ha Se aplică odată cu apariția dăunătorilor, de la faza de alungire a fratelui principal până la sfârșitul inspicării (BBCH 30-59). <u>NAP*, MUSTAR ALB*, NEGRU*, CHINEZESC*:</u> <i>Meligethes aeneus</i> • 0,15 -0,3 L/ha Se aplică din faza de început de dezvoltare a mugurilor florali până în faza în care primele petale sunt vizibile, dar bobocii florali sunt încă închisi (BBCH 50-59). <i>Ceutorhynchus obstrictus</i> • 0,15 -0,3 L/ha Se aplică din faza de început de dezvoltare a mugurilor florali până în faza în care primele petale sunt vizibile, dar bobocii florali sunt încă închisi (BBCH 50-59).
--	--	--	--	--



50-59).

Dasineura brassicae

- 0,15 -0,3 L/ha

Se aplică de la sfârșitul înfloritului, până în faza în care 20% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 69-72).

IN* (PENTRU SEMINTE ȘI FIBRE):

Longitarsus parvulus, *Aphthona euphorbiae*,

- 0,3 L/ha

Se aplică după infestarea culturii de la apariția cotiledoanelor până la apariția celei de a 2 frunze adevărate (BBCH 10-14).

Thrips sp.

- 0,3 L/ha

Se aplică după infestarea culturii, la avertizare, de la începutul alungirii tulpinii- până la începutul înfloririi-10% flori deschise (BBCH 30-61).

CÂNEPĂ* (PENTRU FIBRE ȘI SEMINTE):

Ostrinia nubilalis

- 0,3 L/ha

Se aplică la momentul eclozării larvelor, la avertizare (iunie).

Psylliodes attenuata

- 0,2 -0,3 L/ha

Se aplică după infestarea culturii, la avertizare, de la de la apariția complete a cotiledoanelor și a primei perechi de frunze- până la a 4 a pereche de frunze (BBCH 11-14).

Aphis sp, *Thrips sp*

- 0,3 L/ha

Se aplică după infestarea culturii la stadiul principal atinge 90% din înălțimea finală – până la apariția petalelor florilor masculine, dar bobocii florali sunt închisi (BBCH 39-59).

MAC* (PENTRU PRODUCȚIA DE SEMINTE):

Dasineura papaveris

- 0,15 L/ha

Se aplică după infestarea culturii, de la începutul dezvoltării fructelor și semințelor până la sfârșitul coacerii fructelor și semințelor (BBCH 71-89).



DOVLEAC* (PENTRU SEMINTE)

Lygus sp 0,2 -0,3 L/ha
Se aplică odată cu apariția dăunătorilor, de la începutul dezvoltării inflorescenței până la deschiderea primei flori (BBCH 50-65).

VINETE* (SERE CU STRUCTURĂ STABILĂ):

Trialeurodes vaporariorum,
Thrips tabaci, *Frankliniella occidentalis*, *Ptyomiza* sp,
Aphis sp, *Psylliodes* sp, *Lygus* sp.

• 0,3 L/ha

Se aplică odată cu apariția dăunătorilor, de la începutul dezvoltării lăstarilor laterali-pana la cocerea deplină (BBCH 30-59).

Nu se aplică în timpul înfloritului

PAR*, PAR CHINEZESC*:

Aphis sp.

• 0,125 L/ha

Se aplică la apariția primelor colonii de afide, de la formarea mugurilor- până la coacerea fructelor (BBCH 51-87).

Nu se aplică în timpul înfloritului

Cydia pomonella

• 0,125 L/ha

Se aplică la începutul zborului și depunerii ouălor în masă, de la fruct de 10 mm - fruct 40 mm (BBCH 71-74).

Calioa limacina

• 0,125 L/ha

Se aplică la apariția larvelor, de la fruct 10 mm - până la maturarea completă (BBCH 71-87).

Anthonomus piri

• 0,125 L/ha

Se aplică la apariția larvelor, de la fruct 10 mm- până la maturarea completă.

Dasineura pyri

• 0,125 L/ha

Se aplică la apariția dăunătorului, în perioada de dezvoltare a fructelor (BBCH 71-79).

Cacopsylla sp.

• 0,125 L/ha

Se aplică la apariția dăunătorului, de la formarea mugurilor- până la fruct de 10



mm.
Nu se aplică în timpul înfloritului.

GUTUI*, MOSMON*:

Aphis sp

- 0,125 L/ha

Se aplică după apariția primelor colonii de afide, de la formarea mugurilor până la faza de coacere a fructelor (BBCH 51-87).

Nu se aplică în timpul înfloritului.

Cydia pomonella

- 0,125 L/ha

Se aplică la începutul zborului fluturului și al ouatului în masă, din faza în care fructul după înflorire atinge dimensiunea de 10 mm până la faza în care diametrul fructului ajunge la 40 mm, fructul crește (BBCH 71-74).

VISIN*, CIRES*:

Myzus cerasi

- 0,125 L/ha

Se aplică după apariția primelor colonii de afide, de la formarea mugurilor până la faza de înflorire completă (BBCH 51-65).

Rhagoletis cerasi

- 0,125 L/ha

Se aplică imediat ce omizile sau simptomele de hrănire ale acestora sunt vizibile, din faza în care fructul post-înflorire atinge dimensiunea de 10 mm până la maturitatea fructului (BBCH 51-59).

Argyresthia ephippiella

- 0,125 L/ha

Se aplică imediat ce omizile sau simptomele de hrănire ale acestora sunt vizibile, din faza în care fructul post-înflorire atinge dimensiunea de 10 mm până la maturitatea fructului (BBCH 51-59).

Anthonomus rectirostris

- 0,125 L/ha

Se aplică imediat ce este detectată infestarea cu dăunători, de la începutul fazei de muguri albi până la faza de înflorire completă (BBCH 57-65).

Nu se aplică în timpul înfloritului

PIERSIC*, NECTARIN*, CAIS*:

Pandemis

heparana



				<i>Adoxophyes orana</i>, <i>Archips rosana</i> • 0,125 L/ha Se aplică din momentul în care omizile eclozează și încep să se hrănească, din faza în care mugurii floralii se umflă până la faza de înflorire completă (BBCH 51-65). Nu se aplică în timpul înfloriturii <i>Myzus persicae</i>, <i>Aphis sp</i> • 0,125 L/ha Se aplică după apariția primelor colonii de afide, din faza de umflare a mugurilor floralii până la faza de înflorire completă (BBCH 51-65). Nu se aplică în timpul înfloriturii ALUN: Afide (<i>Corylobium avellanae</i>, <i>Myzocallis coryli</i>) <i>Balaninus nucum</i>, <i>Cydia sp.</i>, <i>Metcalfa pruinosa</i>, <i>Archips rosana</i> • 0,125 L/ha Se aplică imediat ce este detectată infestarea cu dăunători sau când se observă simptome de hrănire, conform avertizărilor, de la începutul dezvoltării inflorescenței până la faza de înflorire completă (BBCH 51-65). Nu se aplică în timpul înfloriturii NUC: Afide (<i>Chromaphis juglandicola</i>, <i>Callaphis juglandis</i>) • 0,125 L/ha Se aplică după ce au apărut primele colonii de afide, la avertizare, de la începutul dezvoltării inflorescenței până la faza de înflorire completă (BBCH 51-65). Nu se aplică în timpul înfloriturii TUTUN: <i>Thrips tabaci</i>, <i>Aphis sp</i> • 0,125 -0,25 L/ha Se aplică la apariția dăunătorilor, conform avertizărilor, de la începutul dezvoltării părților vegetative ale culturii până la prima fază a frunzelor și până la faza în care 50% din păstăile de semințe sunt brune (BBCH 40-85), în faza de alungire a tulpinii și de acoperire a plantelor în rând (BBCH 30-39); este permisă o
--	--	--	--	---



				singură aplicare	
				*Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	
ERBICIDE					
1.	OBELISK 6 g/kg iodosulfuron metil sodiu + 30 g/kg mezosulfuron-metil + 90 g/kg mefenpir dietil (safener)	Ascenza Agro S.A., Portugalia CO:967PC/25.04.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ TRITICALE DE TOAMNĂ SECARĂ*, GRÂU DURUM DE TOAMNĂ*, GRÂU SPELTA*: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 0,2 -0,4 kg/ha Se aplică de la începutul înfrățirii până la nodul 2 la cel puțin 2 cm deasupra nodului 1 (BBCH 21-32); max. 1 tratament/sezon. *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR pentru care s-au efectuat sau nu s-au efectuat teste de eficacitate	PERICOL

B. APROBARE A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ (CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013)

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALĂ	A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ	NR. CERTIFICAT DE OMOLOGARE/ DATA	DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII
1	FUSILADE FORTE	PRIVIU FORTE	2019/26.10.1999	Nufarm România SRL
2	VENUS 250 SC	FRIGGA 250SC	878PC/28.09.2023	Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia
3	Znachor 500 SC	Bosskiller 500 SC	369PC/29.11.2017	Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia
4	Chlomazon 480 EC	Diflunic 480 EC	739PC/07.12.2021	Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia
5	AMISTAR GOLD	PRIORI GOLD	424PC/05.06.2018	Syngenta Agro SRL

C. APROBAREA PERMISELOR DE COMERT PARALEL CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013 -



3. DIVERSE

1. Ca urmare a nesușinerii, conform art.43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, a produselor de protecție a plantelor **Clinic Xpert/(Clean Up Xpert** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. **243PC/20.10.2016**) și **Credit 360 SL** (certificat de omologare nr. **445PC/15.11.2018**) de către deținătorul omologării se vor retrage certificatele de omologare de la data de **16.12.2024** ,iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o **perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 16.06.2025)**, la care se adaugă o **perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de 16.06.2026)**.

2. Ca urmare a nesușinerii, conform art.43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, a produselor de protecție a plantelor **HELOSATE 450 TF/ (GLYPHOCOVER 450** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. **390PC/ 28.02.2018**) de către deținătorul omologării se vor retrage certificatele de omologare de la data de **16.12.2024** ,iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o **perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 16.06.2025)**, la care se adaugă o **perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de 16.06.2026)**.

3. Ca urmare a nesușinerii, conform art.43 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, a produselor de protecție a plantelor **ROUNDUP ADVANCE** (certificat de omologare nr. **189PC/ 03.06.2016**) și **ROUNDUP EVOLUTION** (certificat de omologare nr. **010PC/ 28.05.2012**) de către deținătorul omologării se vor retrage certificatele de omologare de la data de **16.12.2024** ,iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o **perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 16.06.2025)**, la care se adaugă o **perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de 16.06.2026)**.

4. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Certis Belchim BV, Olanda**, privind schimbarea denumirii unei locații de formulare precum și schimbarea denumirii producătorului substanței active milbemectin aflată în compoziția produselor de protecție a plantelor **MILBEKNOCK EC/(KOROMITE** – a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. **2213/ 20.08.2003**).

5. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **SAN Agrow Holding GmbH, Austria**, privind o noua metoda de fabricație pentru substanța activă **Aureobasidium pullulans** aflată în compoziția produselor **BLOSSOM PROTECT** (certificat de omologare nr. **652PC/ 24.11.2020**) și **BOTECTOR** (certificat de omologare nr. **651PC/ 24.11.2020**) .

3a. SCHIMBARE DENUMIRI COMERCIALE

6. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **FMC International Switzerland Sarl**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **INECOR** (certificat de omologare nr. **839PC/25.04.2023**) în **Shenzi 200 SC**.

7. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **FMC Agro Operational România SRL**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului **Koban** (a doua denumire comercială a produsului **Succesor Pro**) (certificat de omologare nr. **191PC/03.06.2016**) în **Dual Next**.

3b. SCRISORI DE REPREZENTARE

8. CNOPPP a luat notă de informările companiei **Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia**, privind desemnarea companiei **AGRICONNECT SRL, București**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor **MOMOS 250 EC**(certificat de omologare nr. **816PC/07.12.2022**), **HADES 250 EW/(WELES** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. **808PC/07.12.2022**), **PONY 306 SE/(VITONG** - a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. **832PC/07.12.2022**), **VENUS 250 SC**(certificat de omologare nr. **878PC/28.09.2023**),



CHLOMAZON 480EC (certificat de omologare nr. 739PC/07.12.2021), **ZNACHOR 500SC** (certificat de omologare nr. 369PC/29.11.2017).

9. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **VIORYL Chemical and Agricultural Industry, Research SA, Grecia**, privind desemnarea domnului **Adrian Costea** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de reînnoire a omologării produsului de protecție a plantelor **LYPHASE 36 SL/(GLYGOLD 36 SL- a doua denumire comercială)**.

10. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Summit Agro România SRL**, privind desemnarea doamnei **Roxana Alexandru** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

3c. NOTIFICĂRI TRANSFER PRODUSE

11. La solicitarea companiei **SINON CORPORATION, TAIWAN**, produsele de protecție a plantelor **GLIFOTIM/(GLADIATOR – a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2011 A/16.12.2002) vor fi transferate de la deținătorul de omologare actual **SINON CORPORATION, TAIWAN, R.O.C.**, către **SINON EU GmbH, Germania**.

3d. NOTIFICĂRI LOCĂȚII DE FORMULARE

12. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, privind adăugarea unor noi locații de formulare pentru produsul **CICLOPE** (certificat de omologare nr. 310PC/ 10.04.2017).

13. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Nichino Europe Co Ltd., Marea Britanie**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **ORTUS 5 SC** (certificat de omologare nr. 1331/ 03.07.1992).

14. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Clayton Plant Protection Ltd., Irlanda**, privind adăugarea unor noi locații de formulare pentru produsul **CLAYTON NAVARO** (certificat de omologare nr. 772PC/ 23.08.2022).

15. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Nichino Europe Co Ltd., Marea Britanie**, privind adăugarea unei noi locații de formulare pentru produsul **MONCUT** (certificat de omologare nr. 360PC/ 29.11.2017).

3e. MODIFICĂRI MAJORE:-

3f. MODIFICĂRI MINORE:

16. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Ascenza Agro SA, Portugalia**, privind o modificare minoră în compoziția produselor **SEXTAN/ (TEBUTEC - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2810/ 18.12.2008).

17. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Clayton Plant Protection Ltd., Irlanda**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **CLAYTON HEED** (certificat de omologare nr. 780PC/ 23.08.2022).

18. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS, FRANTA.**, privind o modificare minoră în compoziția produsului **JUVINAL 10 EC** (certificat de omologare nr. 1701/ 13.07.1995).

3g. SURSE DE SUBSTANȚE ACTIVE:

19. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **LIFE SCIENTIFIC LTD., IRLANDA**, privind o sursă adițională pentru substanța activă **metconazol** aflată în compoziția produsului **LS METCO 60** (certificat de omologare nr. 872PC/ 28.09.2023).

20. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Life Scientific Ltd., Irlanda**, privind o sursă adițională pentru substanța activă **difenoconazol** aflată în compoziția produsului **LS DIFENO** (certificat de omologare nr. 834PC/ 25.04.2023).



21. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia**, privind o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produsului **CLARO 375 SC** (certificat de omologare nr. 898PC/ 17.11.2023).

22. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **INDUSTRIAS AFRASA S.A., SPANIA**, privind două surse adiționale pentru substanța activă **clodinafop-propargil** aflată în compoziția produsului **CICLOPE** (certificat de omologare nr. 310PC/ 10.04.2017).

23. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **Clayton Plant Protection Ltd., Irlanda**, privind două surse adiționale pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produsului **CLAYTON NAVARO** (certificat de omologare nr. 772PC/ 23.08.2022).

3h. AMBALAJE ADIȚIONALE:

24. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE ROMÂNIA SRL**, CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional, pentru produsul **CLOSER** omologat cu certificatul de omologare nr. 537PC/ 12.07.2019, microambalat de **CHEMARK ROM SRL**, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,25 L; 0,5 L; 1 L; 2 L; 3 L; 5L; 10L; 20L	HDPE ; PET	sticla	500mL	FLACON/ HDPE	sticla

25. La solicitarea companiei **ASCENZA AGRO SA**, CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional, pentru produsele de protecție a plantelor **SEXTAN/(TEBUTEC-** a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr.2810/18.12.2008, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
40 mL	HDPE/COEX	recipient	500 mL	HDPE COEX (HDPE/EVOH)	recipient
1 L	HDPE/COEX COEX/PA COEX	recipient			
5 L	COEX COEX/HDPE	recipient			
20 L	HDPE	recipient			
200 L	PE/APM	recipient			

26. La solicitarea companiei **INNIGO Sp.z.o.o., Polonia**, CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale, pentru produsele de protecție a plantelor **LOS OVADOS 250 EC /(BIATOX-a doua denumire comercială)**, omologate cu certificatul de omologare nr.794PC/23.08.2022, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
CAPACITATE	MATERIAL	TIP	CAPACITATE	MATERIAL	TIP
100mL,250 mL,	HDPE/PA/COEX		1,5mL,3,0mL,	HDPE/PA/COEX	monodoza



500mL, 1L, 5L, 10L		-	15mL, 20mL		
			50 mL	HDPE/PA/COEX	recipient

27. La solicitarea companiei **INNIGO Sp.z.o.o., Polonia**, CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale, pentru produsul de protecție a plantelor **CLARO 375 SC** omologat cu certificatul de omologare nr. 622PC/30.08.2020, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
250mL; 500mL; 510mL; 564mL; 600mL; 800mL; 1000mL; 1200mL; 2000mL 3000mL; 4000mL; 5000mL 5850mL; 6000mL;	HDPE	-	10 L; 11, 22L; 20L; 22L; 124L; 220L; 222L	HDPE	-
275mL; 323mL; 500mL; 550mL; 574mL; 1000mL; 1100mL; 5000mL; 5500mL 5850mL; 10000mL	HDPE/PA	-			
5950mL	HDPE/F	-			
0.5 L; 1 L; 5 L; 10 L; 20 L	HDPE/EVOH	-			

28. La solicitarea companiei **ISK Biosciences Europe**, CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional, pentru produsele de protecție a plantelor **SHIRLAN 500 SC/(DALIMO-a doua denumire comercială)** omologat cu certificatul de omologare nr. 1881/15.12.1998, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
5L; 10L; 20L	HDPE	Sticla, recipient	1L	HDPE	Sticla, recipient
1L	PET	Sticla, recipient			

29. La solicitarea companiei **ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL**, CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **MAVRIK 2F** omologat cu certificatul de omologare nr. 2126/18.12.2001, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L, 5L	COEX/HDPE (PA)	bidon	5mL	COEX. Layer Polyester amorph/EV OH/PE	monodoza
100 mL	COEX/HDPE (PA)	Flacon			



50 mL	COEX	Flacon	
10 mL	COEX/HDPE	Flacon	
5 mL	COEX/HDPE	monodoza	

30. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **SYNGENTA Agro SRL**, privind adaptarea dimensiunilor ambalajelor de 1L utilizate pentru comercializarea produselor lichide în România.

31. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **KWIZDA AGRO ROMÂNIA**, privind adăugarea unui inel de prindere (eyelet) la ambalajul existent al produsului de protecție a plantelor **DEGESCH PLATE**, omologat cu certificatul de omologare nr. 265PC/ 19.12.2016.

PREȘEDINTE

ȘOLDEA Romeo

