

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR

**1.LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA
DIN DATA DE 31.01.2025**

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ (art.33-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)					
FUNGICIDE					
1.	AMISTAR MAX 93,5 g/L azoxistrobin + 500 g/L folpet	Syngenta Agro SRL, România CO:1023PC/31.01.2025	SMRZ: GERMANIA	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ): <i>Septoria tritici</i> <i>Puccinia striiformis</i> <i>Puccinia recondita</i> • 1-1,5 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ): <i>Pyrenophora teres</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Ramularia collo-cygni</i> • 1-1,5 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înspicării (BBCH 30-59). SECARĂ DE TOAMNĂ*, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*: <i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> • 1-1,5 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). TRITICALE DE TOAMNĂ*, TRITICALE DE PRIMĂVARĂ*: <i>Septoria tritici</i> <i>Puccinia striiformis</i> <i>Puccinia recondita</i> • 1-1,5 L/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				(în funcție de gradul de infecție) Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
2.	FOLPETIS 500 SC 500 g/L folpet	Ascenza Agro S.A., Portugalia CO:1024PC/31.01.2025	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	GRĂU DE TOAMNĂ, GRĂU DURUM DE TOAMNĂ, GRĂU DURUM DE PRIMĂVARĂ*: <i>Zymoseptoria tritici</i> • 0,9 - 1,2 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Se aplică 2 tratamente la interval de 14 de zile. Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul fazei de înspicare (BBCH 30-59). ORZ DE TOAMNĂ: <i>Pyrenophora teres</i> • 0,9 - 1,2 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Se aplică 2 tratamente la interval de 14 de zile. Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul fazei de înspicare (BBCH 30-59). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	MELVAR START 120 g/L protioconazol + 300 g/L folpet	Ascenza Agro S.A., Portugalia CO:1025PC/31.01.2025	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	GRĂU DE TOAMNĂ, GRĂU DURUM DE TOAMNĂ, GRĂU DURUM DE PRIMĂVARĂ*: <i>Zymoseptoria tritici</i> • 1,0 - 1,5 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Se aplică 2 tratamente la interval de 14 de zile. Se aplică de la apariția celui de al doilea internod până la începutul înfloritului (BBCH 32-61). ORZ DE TOAMNĂ: <i>Pyrenophora teres</i> • 1,0 - 1,5 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Se aplică 2 tratamente la interval de 14 de zile. Se aplică de la apariția celui de al doilea internod până la începutul înfloritului (BBCH 32-61). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



REGULATORI DE CREȘTERE

1.	MEDAX TOP 300 g/L clorură de mepiquat + 50 g/L prohexadion de calciu	BASF SE, Germania CO: 248PC/20.10.2016	—	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ, SECARĂ*, TRITICALE*: • 0,6 - 1,0 L/ha (1 tratament) Poate fi aplicat împreună cu sulfatul de amoniu la doza de 0,6 – 1,0 kg/ha. Se aplică de la alungirea tulpinii până la formarea completă a frunzei standard (BBCH 30-39). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	--	---	---	---

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 – 42 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

FUNGICIDE

1.	ZELORA START 120 g/L protioconazol + 300 g/L folpet	SELECTIS - Produtos para a Agricultura, S.A. CO:1026PC/31.01.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN GRECIA	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM DE TOAMNĂ*, GRÂU DURUM DE PRIMĂVARĂ*: <i>Zymoseptoria tritici</i> • 1,0-1,5 L/ha Se aplică din stadiul de alungire a tulpinii, când nodul 2 este la cel puțin 2 cm deasupra nodului 1, până la începutul înfloririi (BBCH 32 - 61); max. 2 tratamente la un interval de 14 zile. ORZ DE TOAMNĂ: <i>Helminthosporium teres</i> sin. (<i>Pyrenophora teres</i>) • 1,0-1,5 L/ha Se aplică din stadiul de alungire a tulpinii, când nodul 2 este la cel puțin 2 cm deasupra nodului 1, până la începutul înfloririi (BBCH 32 - 61); max. 2 tratamente la un interval de 14 zile. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	---	---	---	--	---

RODENTICIDE

1.	ARVALIN 25 g/kg fosfura de zinc	DETIA FREYBERG GMBH CO: 578PC/ 20.11.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN GERMANIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: CÂMPII ȘI PAJISTI, CULTURI AGRICOLE, CULTURI FORESTIERE, CULTURI LEGUMICOLE, CULTURI DE PLANTE DECORATIVE, POMI FRUCTIFERI, VITĂ DE VIE: <i>Microtus arvalis</i> . • 5 bucăți / galerie (2 kg/ha max. 3 aplicari pe sezon)	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	---	---	---	--	---



				Utilaj de aplicare a momelii care poziționează momeala în tuneluri artificiale în sol, create în acest scop. Tunelurile realizate cu ajutorul utilajului de aplicare a momelilor nu trebuie să aibă un diametru mai mare de 5 cm.	
DESICANT și ERBICID					
1.	MIZUKI 10,6 g/L pirafliufen-etil	NICHINO EUROPE Co LTD CO:1027PC/31.01.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN BULGARIA	CARTOF: Desicant • 2,0 L/ha Se aplică cu echipament convențional de la începutul îngălbenirii frunzelor (înainte de recoltare) (BBCH 91); 1-2 tratamente/ sezon cu pauză între tratamente 5 zile. Buruieni anuale (ex: <i>Chenopodium album</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Galium aparine</i>, etc.) • 1,0 -2,0 L/ha Se aplică cu echipament convențional înainte de răsărire sau imediat după răsărire (când maxim 5% din plante sunt vizibile) (BBCH 00-09); 1 tratament/ sezon. VITĂ DE VIE: Lăstari de 15 cm lungime înainte de lignificare • 2,0 L/ha Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul, începând cu stadiul de 9 sau mai multe frunze deschise până când strugurii sunt de mărimea unor boabe de mazăre (aprilie-august) (BBCH 19-75); 1-2 tratamente/ sezon, cu pauză între tratamente de 20 zile. Buruieni anuale (ex: <i>Chenopodium album</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Galium aparine</i>, etc.) • 2,0 L/ha Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul începând cu stadiul de dormans (latentă) până când strugurii sunt de mărimea unor boabe de mazăre (februarie – septembrie) (BBCH 00-75); 1-2 tratamente/ sezon cu pauză între tratamente de 20 zile. MĂR, PĂR**, GUTUI*, MOȘMON*: Lăstari nelignificați de pe trunchi și de la baza trunchiului (drajoni) – lungime 15 cm • 2,0 L/ha Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul începând cu stadiul de umflare a mugurilor neînfloriți până când fructele au atins jumătate din dimensiunea finală (BBCH 51-75); 1-2 tratamente/ sezon cu pauză între tratamente de 20 zile.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



Buruieni anuale

(ex: *Chenopodium album*, *Solanum nigrum*, *Galium aparine*, etc.)

- 2,0 L/ha

Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul începând cu stadiul de dormans (latentă) până când fructele au atins jumătate din dimensiunea finală (BBCH 00-75); 1-2 tratamente/ sezon; Pauză între tratamente – 20 zile;

ANGHINARE* (CÂMP):**Buruieni anuale**

(ex: *Chenopodium album*, *Solanum nigrum*, *Galium aparine*, etc.)

- 0,875 L/ha

Se aplică cu echipament convențional (iulie-octombrie) (BBCH 12-14); 1 tratament/ sezon.

PIERSIC*, NECTARIN*, CAIS*, CIREȘ*:

Lăstari nelignificați de pe trunchi și de la baza triunchiului (drajoni) – lungime 15 cm

- 2,0 L/ha

Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul când mugurii floriali sunt închisi până când fructele au atins jumătate din dimensiunea lor finală (martie-august) (BBCH 51-75); 1-2 tratamente/ sezon, cu pauză între tratamente de 20 zile.

Buruieni anuale

(ex: *Chenopodium album*, *Solanum nigrum*, *Galium aparine*, etc.)

- 2,0 L/ha

Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul începând cu stadiul de dormans (latentă) până când fructele au atins jumătate din dimensiunea finală (BBCH 00-75); 1-2 tratamente/ sezon cu pauză între tratamente de 20 zile.

NUC*, ALUN*, MIGDAL*:

Lăstari nelignificați de pe trunchi și de la baza triunchiului (drajoni) – lungime 15 cm

- 2,0 L/ha

Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul (BBCH 13-76); 1-2 tratamente/ sezon cu pauză între tratamente de 20 zile.

Buruieni anuale

(ex: *Chenopodium album*, *Solanum nigrum*, *Galium aparine*, etc.)

- 2,0 L/ha

Se aplică pe rând cu scut de protecție pentru a evita driftul începând cu stadiul de dormans (latentă) până când fructele au atins jumătate din dimensiunea finală (BBCH 00-75); 1-2 tratamente/ cu pauza între tratamente de 20 zile.



*Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR – (ART.43– Reg.(CE) nr.1107/2009)

INSECTICIDE

1.	KAISO SORBIE 5 EG 50 g/kg lambda-cihalotrin	NUFARM GmbH&Co.KG, AUSTRIA CO: 2739/ 19.12.2007	SMRZ: AUSTRIA	NU SE REÎNNOIEȘTE OMOLOGAREA Certificatul de omologare nr.: 2739/19.12.2007 se retrage cu data de 31.01.2025 fără acordarea unei perioade de grație.
----	--	--	------------------	---

3. DIVERSE

1. CNOPPP a respins solicitarea **Alianței Pentru Agricultură și Cooperare**, privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru utilizarea produsului de protecție a plantelor **TRANSFORM** ca insecticid pentru controlul afidelor din culturile de cereale.

2. CNOPPP a respins **Federației Naționale Cartoful din România**, privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru utilizarea produsului de protecție a plantelor **CLOSER** (certificat de omologare nr. 537PC/ 12.07.2019) ca insecticid destinat controlului afidelor din culturile legumicole.

3. CNOPPP a respins **Federației Naționale Cartoful din România**, privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru utilizarea produsului de protecție a plantelor **MIZUKI** ca desicant pentru cultura de cartof.

4. CNOPPP a aprobat solicitarea **BASF Agricultural Solutions Romania** privind modificarea dozei de aplicare sub formă de interval de **0,5 - 1 L/ha** pentru culturile omologate la **grâu de toamnă** pentru combaterea *Zymoseptoria tritici* (syn. *Septoria tritici*), **orz de toamnă și orz de primăvară** pentru combaterea *Pyrenophora teres* (syn. *Helminthosporium teres*) pentru produsul de protecție a plantelor **SICARIS** (certificat de omologare nr. 851PC/25.04.2023).

5. CNOPPP a aprobat solicitarea **BASF Agricultural Solutions Romania** privind modificarea dozei de aplicare sub formă de interval **0,75 - 1 L/ha** pentru cultura de **soia** omologată pentru produsul de protecție a plantelor **PASSAT** (certificat de omologare nr. 864PC/25.04.2023).

6. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24**, aflată în compoziția produsului de protecție a plantelor **TAEGRO** (certificat de omologare nr. 548PC/03.02.2020), la notificarea **NOVOZYMES FRANCE SAS, FRANTA**.

PREȘEDINTE

ȘOLDEA Romeo

