

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 17.11.2023

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ (art.33-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)					
ERBICIDE					
1.	ROUNDUP DYNAMIC 500 g/L glifosat (613 g/L sare de potasiu)	BAYER SRL, România CO:896PC/17.11.2023	SMRZ: OLANDA	TOATE CULTURILE ÎNAINTE DE PLANTAT/SEMĂNAT: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 1,08 - 3,2* L/ha TOATE CULTURILE DUPĂ PLANTAT/ SEMĂNAT (PREEMERGENT): Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 1,08 - 3,2* L/ha MIRIȘTI: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 1,08 - 3,2* L/ha Se aplică: 5 zile înainte de semăna pentru buruienile perene și 2 zile înainte de semănat pentru buruienile anuale. VITA DE VIE, LIVEZI: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 1,08 - 3,2* L/ha Se aplică: Creșterea activă a buruienilor. TERENURI NECULTIVATE: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 1,08 - 3,2* L/ha Se aplică: Creșterea activă a buruienilor. PAJIȘTI: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 2,16 - 3,2* L/ha	



				Se aplică: 5 zile înainte de cosit, pășunat sau semănat. PEPINIERE FORESTIERE ÎNAINTE ȘI DUPĂ PLANTARE: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 2,16 - 3,2* L/ha Se aplică: Creșterea activă a buruienilor. * în funcție de gradul de infestare și de speciile de buruieni prezente	
2.	BOXER 800 EC 800 g/L prosulfocarb	SYGENTA AGRO SRL, ROMÂNIA CO:2787/26.06.2008	SMRZ: ROMÂNIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale (Ex. <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Ambrosia artemisiifolia</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Amaranthus chlorostachys</i>, <i>Abutilon theophrasti</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Chenopodium hybridum</i>, <i>Cannabis sativa</i>, <i>Datura stramonium</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Mercurialis annua</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Panicum milliaceum</i>, <i>Solanum nigrum</i>) • 3,0 - 5,0 L/ha Se aplică preemergent, de la sămânța uscată la cotiledoane care cresc spre suprafața solului (BBCH 00 – 08). Doza de 5,0 L/ha se aplică în caz de infestare puternică.	PERICOL

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 – 42 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

FUNGICIDE

1.	PHYTOSARCAN 510 g/L fosfonați de potasiu (exprimați ca acid fosforic)	EXCLUSIVAS SARABIA SA, SPANIA CO:897PC/17.11.2023	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN GRECIA	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 0,75 - 2,5 L/ha Se aplică în toate etapele. Recomandat: Din momentul dezvoltării depline a primelor frunze (BBCH >20) și repetat când apare boala. Maxim 3 tratamente/sezon la interval de 10 zile CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 0,45 - 2,5 L/ha Se aplică în toate etapele. Recomandat: De la formarea celei de a 2-a frunză (> 4 cm) până la întărirea completă a epidermei, 95% dintre tuberculi în această fază (BBCH 12-49). Maxim 3 tratamente/sezon la interval de 10 zile SALATĂ VERDE: <i>Bremia lactucae</i> • 0,45 - 2,5 L/ha	=====
----	---	---	---	---	-------



				Se aplică în toate etapele. Recomandat: de la apariția celei de a 2-a frunză adevărată până la formarea capatanii la dimensiunea tipică (BBCH 12-49). Maxim 3 tratamente/sezon la interval de 10 zile.	
2.	CLARO 375 SC 175 g/L protioconazol + 200 g/L azoxistrobin	INNIGO Sp.z.o.o, Polonia CO:898PC/17.11.2023	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>GRÂU DE TOAMNĂ:</u> <i>Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățitului până la alungirea paiului (BBCH 25-32); 1 tratament <i>Oculimacula yallundae</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la alungirea internodiilor până la alungirea paiului (BBCH 30-32); 1 tratament <i>Blumeria graminis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la apariția primului nod până la stadiul de frunză stindard complet desfășurată (BBCH 31-39); 1 tratament sau Se aplică de la apariția primului nod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59); 2 tratamente. <i>Pyrenophora tritici repentis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Mycosphaerella graminicola</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la stadiul de frunză stindard complet desfășurată până la faza de burduf (BBCH 39-49); 1 tratament. <i>Mycosphaerella graminicola</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la apariția primului nod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59); 2 tratamente. <i>Septoria nodorum</i>, <i>Fusarium culmorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul înforțului până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament. <u>TRITICALE DE TOAMNĂ:</u> <i>Fusarium spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățitului până la alungirea paiului (BBCH 25-32); 1 tratament <i>Rhynchosporium secalis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la alungirea internodiilor până la sfârșitul înspicării (BBCH 30-59); 1 tratament.	<u>ATENȚIE</u>



				<i>Blumeria graminis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la apariția primului nod până la stadiul de frunză stindard complet desfășurată (BBCH 31-39); 1 tratament sau Se aplică de la apariția primului nod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59); 2 tratamente <i>Pyrenophora tritici repentis, Puccinia recondita</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la stadiul de frunză stindard complet desfășurată până la faza de burduf (BBCH 39-49); 1 tratament <i>Mycosphaerella graminicola</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la stadiul de frunză stindard complet desfășurată până la sfârșitul înspicării (BBCH 39-59); 1 tratament sau Se aplică de la apariția primului nod până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59); 2 tratamente <i>Septoria nodorum, Fusarium culmorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la începutul înforitului până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69); 1 tratament ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Puccinia hordei</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățitului până la apariția frunzei standard (BBCH 29-37); 1tratament sau Se aplică de la sfârșitul înfrățitului până la sfârșitul înspicării (BBCH 29-59); 2 tratamente. <i>Fusarium culmorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică din faza de burduf până la apariția spicului (BBCH 49-51); 1tratament RAPIȚĂ DE TOAMNĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium longisporum</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la apariția primelor petale (buton galben) până la înflorire deplină (BBCH 59-65); 1tratament	
--	--	--	--	--	--



				<i>Alternaria brassicae</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la înflorire deplină până la sfârșitul înfloritului (BBCH 65-69); 1tratament SECARĂ DE PRIMĂVARĂ: <i>Oculimacula yallundae</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Blumeria graminis</i>, <i>Rynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora tritici repentis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Septoria nodorum</i>, <i>Fusarium culmorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățitului până la sfârșitul înfloritului (BBCH 25-69); 2 tratamente MUSTAR': <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la primele petale vizibile (flori închise) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 59-69); 1tratament MAC*: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la primele petale vizibile (flori închise) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 59-69); 1tratament *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR	
3.	DUKES 700 WG 700 g/kg ditianon	Sharda Cropchem Espana SL, Spania CO:899PC/17.11.2023	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	MĂR: <i>Venturia spp.</i> • 0,5 kg/ha (0,34 kg/ m înaltime coroana/ ha) Se aplică de la umflarea mugurilor floral, pana cand fructele ajung la aproximativ 90% din dimensiunea finală (BBCH 51-79).	ATENȚIE
ERBICIDE					
1.	PALACID 480 SL 480 g/L dicamba	Albaugh TKI d.o.o Slovenia CO:900PC/17.11.2023	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN MALTA	PORUMB (pentru BOABE ȘI SILOZ): Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică între 2 -8 frunze (BBCH 12-18). Buruieni dicotiledonate perene precum <i>Convolvulus arvensis</i> și <i>Calystegia sepium</i> • 0,4 L/ha prima aplicare • 0,2 L/ha a doua aplicare Se aplică între 2 -6 frunze(BBCH 12-16).	ATENȚIE



				PORUMB ZAHARAT: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică între 2 -8 frunze(BBCH 12-18). CEREALE (GRÂU, ORZ, TRITICALE, SECARĂ, OVĂZ, GRÂU DUR): Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,15 - 0,25 L/ha Se aplică de la începutul înfrățirii până la apariția primului internod (BBCH 21-30). SORG: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,3 - 0,4 L/ha Se aplică între 2 -8 frunze(BBCH 12-18). TERENURI NECULTIVATE SI MIRISTI (după recoltare, înainte de cultura următoare): Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,6 L/ha Se aplică în iunie-octombrie.	
2.	MESIMET 40 g/L mezotrionă + 400 g/L S- metolacior	Sharda Cropchem Espana SL, Spania CO:901PC/17.11.2023	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN MALTA	PORUMB: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate (în stadii tinere de creștere și dezvoltare) • 3,0 L/ha Se aplică de la 1 la 4 frunze (BBCH 10-14).	ATENȚIE
3.	ALIVE 100 EC 100 g/L propaquizafop	Sharda Cropchem Espana SL, Spania CO:902PC/17.11.2023	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	SFECĂ DE ZAHĂR: <i>Echinochloa crus-galli, Avena fatua, Digitaria sanguinalis, Setaria pumila, Setaria viridis, Lolium perenne</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la prima pereche de frunze desfăcute până când frunzele acoperă 50% din suprafața (BBCH 12-35). <i>Apera spica-venti</i> • 0,5 - 0,7 L/ha Se aplică de la prima pereche de frunze desfăcute până când frunzele acoperă 50% din suprafața (BBCH 12-35). <i>Agropyron repens</i> • 1,25 - 1,5 L/ha (se aplică 1 tratament sau se aplică 2 tratamente a câte 0,6L/ha) Se aplică de la prima pereche de frunze desfăcute până când frunzele acoperă 50% din suprafața	PERICOL



				(BBCH 12-35). RAPITĂ: <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Avena fatua</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Setaria pumila</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Lolium perenne</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la 2 frunze desfăcute până la începutul alungirii tulpinii: fără internoduri (BBCH 12-30). <i>Apera spica-venti</i> • 0,5 - 0,7 L/ha Se aplică de la 2 frunze desfăcute până la începutul alungirii tulpinii: fără internoduri (BBCH 12-30). <i>Agropyron repens</i> • 1,25 – 1,5 L/ha (se aplică 1 tratament sau se aplică 2 tratamente a câte 0,6L/ha) Se aplică de la 2 frunze desfăcute până la 9 sau mai multe internoduri extinse vizibile (BBCH 12-39). Buruieni monocotiledonate anuale și perene • 1,2 L/ha Se aplică de la 2 frunze desfăcute până la 9 sau mai multe internoduri extinse vizibile (BBCH 12-39). CARTOF: <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Avena fatua</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Setaria pumila</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Lolium perenne</i> • 0,6 L/ha Se aplică din stadiul de formare al primelor frunze până când 50% din plante se întâlnesc între rânduri (BBCH 10-35). <i>Apera spica-venti</i> • 0,5 - 0,7 L/ha Se aplică din stadiul de formare al primelor frunze până când 50% din plante se întâlnesc între rânduri (BBCH 10-35). <i>Agropyron repens</i> • 1,25 – 1,5 L/ha (se aplică 1 tratament sau se aplică 2 tratamente a câte 0,6L/ha) Se aplică din stadiul de formare al primelor frunze până când 50% din plante se întâlnesc între rânduri (BBCH 10-35). CEAPĂ: <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Avena fatua</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Setaria pumila</i>, <i>Setaria viridis</i>, <i>Lolium perenne</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la apariția primei	
--	--	--	--	--	--



				frunze până în momentul dezvoltării a 30% din lungimea estimată a tulpinii florale (BBCH 9-53). <i>Apera spica-venti</i> • 0,5 - 0,7 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până în momentul dezvoltării a 30% din lungimea estimată a tulpinii florale (BBCH 9-53). <i>Agropyron repens</i> • 1,25 – 1,5 L/ha (se aplică 1 tratament sau se aplică 2 tratamente a câte 0,6L/ha) Se aplică de la apariția primei frunze până în momentul dezvoltării a 30% din lungimea estimată a tulpinii florale (BBCH 9-53). <u>FASOLE, VARZĂ:</u> <i>Echinochloa crus-galli, Avena fatua, Digitaria sanguinalis, Setaria pumila, Setaria viridis, Lolium perenne</i> • 0,6 L/ha Se aplică începând cu apariția celei de a treia frunze adevărată (min. BBCH 13). <i>Apera spica-venti</i> • 0,5 - 0,7 L/ha Se aplică începând cu apariția celei de a treia frunze adevărată (min. BBCH 13). <i>Agropyron repens</i> • 1,25 – 1,5 L/ha (se aplică 1 tratament sau se aplică 2 tratamente a câte 0,6L/ha) Se aplică începând cu apariția celei de a treia frunze adevărată (min. BBCH 13). <u>MAZĂRE, MORCOV, PĂTRUNJEL:</u> <i>Echinochloa crus-galli, Avena fatua, Digitaria sanguinalis, Setaria pumila, Setaria viridis, Lolium perenne</i> • 0,6 L/ha Se aplică începând cu apariția celei de a doua frunze adevărată (min. BBCH 13). <i>Apera spica-venti</i> • 0,5 - 0,7 L/ha Se aplică începând cu apariția celei de a doua frunze adevărată (min. BBCH 13). <i>Agropyron repens</i> • 1,25 – 1,5 L/ha (se aplică 1 tratament sau se aplică 2 tratamente a câte 0,6L/ha) Se aplică începând cu apariția celei
--	--	--	--	--



				de a doua frunze adevărată (min. BBCH 13).	
				CĂPSUN: <i>Echinochloa crus-galli, Avena fatua, Digitaria sanguinalis, Setaria pumila, Setaria viridis, Lolium perenne</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la începutul formării mugurilor axilari până când sunt vizibile primele frunze noi (BBCH 91-92).	
4.	SOCRATES 300SC 300 g/L sulcotrionă	Sharda Cropchem Espana SL, Spania CO:903PC/17.11.2023	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN UNGARIA	PORUMB: Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate (<i>Amaranthus sp., Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Solanum nigrum, Cyperus rotundus, Datura stramonium</i>) • 1,5 L/ha Se aplică în stadiul de 2 – 9 frunze pentru cultura de porumb (BBCH 12-19)	ATENȚIE

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR – (ART.43– Reg.(CE) nr.1107/2009)

ERBICIDE

1.	CONCORDIA 306 SE/ (DICOTON - a doua denumire comercială) 6,25 g/L florasulam + 300 g/L acid 2,4 D	Adama Agriculture BV, Olanda CO: 388PC/28.02.2018	SMRZ: POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ TRITICALE DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ : Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,4 - 0,6 L/ ha Se aplică postemergent Cultura: de la 2 frunze până la apariția celui de-al doilea internod (BBCH 12-32) Buruieni: < 20 cm	ATENȚIE
----	--	---	----------------------	---	----------------

INSECTICIDE - ACARICIDE

1.	ERCOLE 4 g/kg lambda-cihalotrin	OXON ITALIA S.p.A. CO:199PC/ 03.06.2016	SMRZ: ROMÂNIA	PORUMB, SORG, MEI: <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <i>Diabrotica spp</i> • 12 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00) sau încorporat în sol odată cu prima prașilă mecanică, când planta are 5-8 frunze (BBCH 15-18). BUMBAC: <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00) . FLOAREA-SOARELUI: <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i>	ATENȚIE
----	---	---	----------------------	---	----------------



				• 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <u>CARTOF:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <u>MORCOV:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <u>TOMATE, ARDEI, VINETE</u> <u>SALATĂ :</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu plantarea, când planta are 2-6 frunze (BBCH 12-16). <u>TUTUN:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>CASTRAVETI, PEPENE VERDE, PEPENE GALBEN, DOVLEAC, DOVLECI:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>RAPITĂ, SOIA:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <u>PEPINIERE SILVICE</u> <u>FLORICULTURĂ, PLANTE ORNAMENTALE:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>VĂRZOASE DE CAPĂȚÂNĂ ȘI INFLORESCENȚĂ (VARZĂ, VARZĂ DE BRUXELLES, CONOPIDĂ, BROCOLI):</u>
--	--	--	--	--



				<i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>CULTURI SEMINCERE</u> <u>(VARZĂ, CUCURBITACEE, SALATĂ, PORUMB, RAPITĂ, MORCOV, CARTOF ȘI ALTE SOLANACEE)</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul pentru culturile semănite (BBCH 00) sau Încorporat în sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14).	
2.	TRIKA EXPERT 4 g/kg lambda-cihalotrin	Sipcam Oxon SpA, Italia CO:169PC/ 16.03.2016	SMRZ: ROMÂNIA	<u>PORUMB, SORG, MEI:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <i>Diabrotica spp</i> • 12 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00) sau Încorporat în sol odată cu prima prașilă mecanică, când planta are 5-8 frunze (BBCH 15-18). <u>BUMBAC:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00) . <u>FLOAREA-SOARELUI:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00) . <u>CARTOF:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <u>MORCOV:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00) . <u>TOMATE, ARDEI, VINETE</u> <u>SALATĂ :</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i>	<u>ATENȚIE</u>



				• 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu plantarea, când planta are 2-6 frunze (BBCH 12-16). <u>TUTUN:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odata cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>CASTRAVETI, PEPENE VERDE, PEPENE GALBEN, DOVLEAC, DOVLECEI:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odata cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>RAPITĂ, SOIA:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul (BBCH 00). <u>PEPINIERE SILVICE FLORICULTURĂ, PLANTE ORNAMENTALE:</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odata cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>VĂRZOASE DE CAPĂȚÂNĂ ȘI INFLORESCENȚĂ (VARZĂ, VARZĂ DE BRUXELLES, CONOPIDĂ, BROCOLI):</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14). <u>CULTURI SEMINCERE (VARZĂ, CUCURBITACEE, SALATĂ, PORUMB, RAPITĂ, MORCOV, CARTOF ȘI ALTE SOLANACEE)</u> <i>Agrotis spp., Melolontha spp., Agriotes spp., Diabrotica spp.</i> • 10 - 15 kg/ha Încorporat în sol odată cu semănatul pentru culturile semănite (BBCH 00) sau Încorporat în sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14).	
--	--	--	--	---	--



EXTINDEREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU UTILIZĂRI MINORE (ART.51 - Reg.(CE) nr. 1107/2009)

FUNGICIDE

1.	AFRODYTA 250SC/(STROBE 250 SC - a doua denumire comercială) 250 g/L azoxistrobin	Pestila Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polonia CO:583PC/ 03.02.2020	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	SECARA DE PRIMĂVARĂ: <i>Blumeria graminis, Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola, Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1,0 L/ha Se aplică de la formarea primului internod pana la sfarsitul inspicarii (BBCH 31-59). GAZON* (din samântă) <i>Blumeria graminis</i> • 1,0 L/ha	ATENȚIE
2.	MAKLER 250 SE/(BOLID 250 SE – a doua denumire comercială) 250 g/L azoxistrobin	Innvigo Sp. Z.o.o., Polonia CO:425PC/ 05.06.2018	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	TELINĂ DE RĂDĂCINĂ: <i>Septoria apiicola, Cercospora apii, Mycosphaerella sp.</i> • 1,0 L/ha HREAN, RIDICHI: <i>Albugo candida, Alternaria brassicae, Botryotinia fuckeliana</i> • 1,0 L/ha SFECLĂ ROȘIE: <i>Cercospora beticola, Erysiphe betae</i> • 1,0 L/ha CONOPIDĂ: <i>Albugo candida, Alternaria brassicae, Mycosphaerella brassicicola, Peronospora parasitica</i> • 1,0 L/ha BROCCOLI, VARZĂ DE BRUXELLES: <i>Albugo candida, Alternaria brassicae, Mycosphaerella brassicicola, Peronospora parasitica</i> • 0,8 - 1,0 L/ha	ATENȚIE

REOMOLOGARE PROCEDURA EUROPEANA

FUNGICIDE

1.	AMIRAL PROFFY 6 FS 60 g/L tebuconazol	ALCHIMEX S.A., Romania+NUFARM GmbH & Co. KG, Austria CO: 2370/15.10.2008	—	GRÂU: <i>Tilletia spp. Fusarium spp.</i> • 0,5 L/tona de sămânță Tratament sămânță. ORZ: <i>Ustilago nuda Pyrenophora graminea</i> • 0,5 L/tona de sămânță Tratament sămânță.	ATENȚIE
----	---	--	---	--	----------------



ERBICIDE

1.	SAJON 4 OD / (NICOZEA 4 OD - a doua denumire comercială) 40 g/L nicosulfuron	Ascenza Agro SA, Portugalia CO: 2820/18.12.2008	SMRZ: Spania	PORUMB: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Sorghum halepense</i> din semințe) •0,8 L/ha Se aplică postemergent. Porumb: -la apariția a 4-6 frunze (BBCH 14-16) Buruienile monocotiledonate anuale: la apariția a 2-4 frunze.	ATENȚIE
----	---	---	--------------	---	----------------

B. APROBAREA CELEI DE - A DOUA DENUMIRI COMERCIALE

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALĂ	A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ	NR. CERTIFICAT DE OMOLOGARE/ DATA	DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII
1.	TIDEX	BABUTH	733PC/07.12.2021	Exclusivas Sarabia SA, Spania
2.	DELMUR	JOLPOLT	613PC/30.06.2020	Exclusivas Sarabia SA, Spania
3.	EUSKATEL	SKELDON	850PC/25.04.2023	Albaugh TKI d.o.o., Slovenia
4.	DIPIRIL	DEIRA	627PC/30.06.2020	Industrias Afrasa S.A. Spania
5.	FLOSUL	POWSYS	398PC/28.02.2018	Sulphur Mills Limited
6.	LOS OVADOS 200SE	BIATOX 200SE	794PC/23.08.2022	INNVIGO sp. z.o.o., Polonia

C. APROBAREA PERMISELOR DE COMERȚ PARALEL CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT	NR. PERMIS DE COMERȚ PARALEL (P.C.P.) DENUMIRE COMERCIALĂ PRODUS	CULTURI	AGENȚI DE DĂUNARE	DOZE DE APLICARE
1.	IMAZZI 40 40 g/L imazamox	SC AGILANTE CAPITAL SRL	Nr.31/17.11.2023	FLOAREA SOARELUI (HIBRIZI DE TIP CLEARFIELD)	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene, inclusiv Orobanche cumuna	1,0-1,25 L/ha Se aplică postemergent în stadiul de 2-8 frunze ale culturii (BBCH 12-18) iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze).
				MAZĂRE	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	0,75-1,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de 2-4 frunze desfăcute (BBCH 12-14) iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze).



				OREZ Soiuri rezistente la erbicide imidazolinone (de tip Clearfield)	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	0,875 L/ha Se aplică două tratamente postemergente astfel: - primul tratament: se aplică în stadiul de 3 până la 4 frunze desfăcute (BBCH 13-14), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). - al doilea tratament se aplică în stadiul de 5 până la 6 frunze desfăcute (BBCH 15-16), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze).
				SOIA	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	0,75-1,0 L/ha Se aplică postemergent în stadiul de 2-4 frunze ale culturii (BBCH 12-14) iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze).

2.REGULAMENTE PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE IN PERIOADA 15.09.2023 - 15.11.2023

1. Regulamentul (UE) 2023/1783 al Comisiei din 15 septembrie 2023 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benzoat de denatoniu, diuron, etoxazol, metomil și teflubenzuron din sau de pe anumite produse;
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1784 al Comisiei din 15 septembrie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 în ceea ce privește alocarea către statele membre, în scopul procedurii de reînnoire, a evaluării etoxazolului, a cărui aprobare expiră la 31 ianuarie 2028;
3. Regulamentul (UE) 2023/2382 al Comisiei din 29 septembrie 2023 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de carbetamid, carboxină și triflururon din sau de pe anumite produse;
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2455 al Comisiei din 7 noiembrie 2023 privind nereînnoirea aprobării substanței active metiram, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2456 al Comisiei din 7 noiembrie 2023 privind nereînnoirea aprobării substanței active clofentezin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

3. DIVERSE

1. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei Albaugh TKI d.o.o., SLOVENIA privind reducerea dozei omologate a produsului **FENCE/(OSPREY-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 420PC/05.06.2018) pentru culturile de grâu și orz și aplicarea sub formă de interval de la **0,25 L/ha la 0,5 L/ha**.



2. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **CORTEVA Agriscience România SRL**, privind extinderea momentului de aplicare a produsului de protecție a plantelor **QUELEX** (certificat de Omologare nr. 631PC/30.06.2020) pentru controlul buruienilor din culturile de cereale.
3. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **INNIGO Sp.z.o.o, Polonia** privind extinderea domeniului de utilizare a produsului de protecție a plantelor **INVISTER 300 SL/(MEPIK 300 SL- a doua denumire comercială)** (certificat de Omologare nr. 416PC/28.02.2018) (2 tratamente/sezon) la rapiță de toamnă.
4. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL**, privind modificarea numelui producătorului substanței active pentiopirad din produsul de protecție a plantelor **FONTELIS** (certificatul de omologare nr. 2866/ 14.12.2012) din **mitsui chemicals, Inc** în **mitsui chemicals agro, Inc**.
5. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **BAYER SRL, ROMANIA**, privind acționarea României ca Stat Membru Raportor Zonal în procesul de extindere a utilizării produsului de protecție a plantelor **DECIS EXPERT 100 EC** (certificat de omologare nr. 123PC/ 22.07.2015).
6. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA** privind schimbarea denumirii producătorului substanței active **piroxsulam** aflată în compoziția produsului **AVOXA** (certificate de omologare nr. 661PC/ 24.11.2020).
7. CNOPPP a aprobat recertificarea BPE a companiei **CROPVANCE SRL** (fosta **SC AGROBLU ROMANIA SRL**).
8. CNOPPP a luat notă de informările **Detia Freyberg GmbH**, privind schimbarea denumirii comerciale a producătorului din **Detia Freyberg GmbH** în **Detia Freyberg Produktion GmbH** în certificatele de omologare ale produselor de protecție a plantelor **PHOSTOXIN TABLET, MAGTOXIN TABLET, DEGESCH PLATE și ARVALIN**.
9. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **AGRO-KANESHO, JAPONIA** privind relocarea sediului social începând cu data de 10 octombrie 2023.
10. Ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/2455 al Comisiei din 7 noiembrie 2023 privind nereînnoirea aprobării substanței active **metiram**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei:
- certificatul de omologare nr. 001PC/06.11.2009 al produsului **CABRIO TOP** se retrage de la **28.05.2024**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României, se acordă o **perioadă de grație de 3 luni** pentru comercializare (până la data de **28.08.2024**) la care se adaugă 3 luni pentru utilizare și eliminare stocuri (până la data de **28.11.2024**).
 - certificatul de omologare nr. 1369/21.12.1992 al produsului **POLYRAM DF** se retrage de la **28.05.2024**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României, se acordă o **perioadă de grație de 3 luni** pentru comercializare (până la data de **28.08.2024**) la care se adaugă 3 luni pentru utilizare și eliminare stocuri (până la data de **28.11.2024**).
11. Ca urmare a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/2456 al Comisiei din 7 noiembrie 2023 privind nereînnoirea aprobării substanței active **clofentezin**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei:
- certificatul de omologare nr. 1137/28.03.1988 al produsului **ASCLEPIOS 500 SC/ (APOLLO 500 SC - a doua denumire comercială)** se retrage de la **11.05.2024**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României, se acordă o **perioadă de grație de 3 luni** pentru comercializare (până la data de **11.08.2024**) la care se adaugă 3 luni pentru utilizare și eliminare stocuri (până la data de **11.11.2024**).



3a. SCHIMBARE DENUMIRI COMERCIALE

12. CNOPPP a aprobat solicitarea companiei **UPL Holdings Coöperatief U.A., Olanda**, privind schimbarea denumirii comerciale a produsului de protecție a plantelor **DIFENOCONAZOL 250 EC** (certificat de omologare nr. 880PC/28.09.2023) în **DIFECOL**.

3b. SCRISORI DE REPREZENTARE

13. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **PROBELTE S.A.U. Spania**, privind desemnarea companiei **ARTEMISA d.o.o., Slovenia** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produsului de protecție a plantelor **BELTHIRUL** (certificat de omologare nr. 020PC/ 11.07.2013).

14. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **ARTEMISA d.o.o., Slovenia**, privind desemnarea doamnei **Marius Sebastian Brătășanu** pentru reprezentare în procesul de omologare și comunicarea cu autoritățile române implicate pentru produsele de protecție a plantelor.

3c. NOTIFICĂRI TRANSFER PRODUSE

15. CNOPPP a aprobat transferul către compania **Adama Agricultural Solutions SRL, România** de la deținătorii de omologare actuali, a următoarelor produse de protecție a plantelor:

Nr.crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare	Deținător de omologare actual
1.	TAIFUN 360 SL/(GLYPHOGAN - a doua denumire comercială)	269PC/19.12.2016	Adama Agriculture BV, Olanda
2.	ACTIVUS 400 SC	327PC/29.06.2017	
3.	TRINITY SC	309PC/10.04.2017	
4.	GOLTIX TITAN	409PC/28.02.2018	
5.	CONCORDIA 306 SE/(DICOTON - a doua denumire comercială)	388PC/28.02.2018	
6.	RACER 25 EC	1069/08.11.1984	Adama Agricultural Solutions Ltd., Israel
7.	TOLUREX 50 SC	1734/22.02.1996	
8.	SURDONE	2109/11.04.2001	Adama Deutschland GmbH, Germania
10.	AMINO 600 SL/(PIMIENTO - a doua denumire comercială)	2530/22.02.2005	Adama Manufacturing Poland SA, Polonia

16. CNOPPP a aprobat transferul a 5 produse de protecție a plantelor depuse pentru evaluare pe art. 34 de la compania **INPEST INDIA PVT. Ltd.**, la compania **Rangoli România Pesticide SRL**.

3d. NOTIFICĂRI LOCAȚII DE FORMULARE

17. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania**, a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsele de protecție a plantelor **CZAR 36 CS** (certificat de omologare nr. 713PC/ 09.09.2021) și **ENCLO 48 EC** (certificat de omologare nr. 735PC/ 07.12.2021).

18. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL**, a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul de protecție a plantelor **LONTREL 600** (certificat de omologare nr. 509PC/ 14.03.2019).



3e. MODIFICĂRI MAJORE:-

3f. MODIFICĂRI MINORE:

19. La solicitarea companiei **UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda**, a fost aprobată o modificare minoră în compoziția produsului **MINSTREL/ (LODIN** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 505PC/ 14.03.2019).

3g. SURSE DE SUBSTANȚE ACTIVE

20. La solicitarea companiei **Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *fludioxonil* aflată în compoziția produselor de protecție a plantelor **TRIGOF 050 FS/ (MADRON 050 FS** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 497PC/ 14.03.2019) și **FLUTRIX 050 FS** (certificatul de omologare nr. 727PC/ 07.12.2021).

21. La solicitarea companiei **GALENKA FITOFARMACIJA d.o.o., SLOVENIA**, a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *pirimetanil* aflată în compoziția produselor de protecție a plantelor **AVALON (PYROGAL** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 770PC/ 23.08.2022).

3h. AMBALAJE ADIȚIONALE:

20. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE ROMÂNIA SRL**, au fost aprobate noile specificații privind adaptarea dimensiunilor ambalajelor de 1L utilizate pentru comercializarea produsului de protecție a plantelor **ORONDIS** (a doua denumire comercială a **ZORVEC ZELAVIN**), (certificat de omologare nr.402PC/14.03.2019).

PREȘEDINTE

Paulina GABOR

