

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva dăunătorului/bolii:

Făinarea (*Uncinula n.*), **Putragai cenușiu** (*Botrytis c.*), **Mana** (*Plasmopara v.*), Putregaiul negru (*Guignardia bidwellii*), Excorioza vitei de vie (*Phomopsis viticola*) **Moliile strugurilor** (*Lobesia b*, *Eupoecillia a.*) **G2**, **Cicade** (*Scaphoideus t.*, *Empoasca vitis*), **Acarieni** (*Tetranychus u.*, *Panonychus u.*, *Eriophyes v.*)

Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **vița de vie**

pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: preventiv și curativ.

numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PED moli G2** = 10 larve/ 100 ciorchini sau peste 5% ciorchini atacați; **PED Panonychus** = 3 – 5 acarieni/frunză, sau 30 % frunze cu simptome de atac, în perioada estivală.

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Universalis 593 SC = 2 l/ha + Exirel = 0,75 – 1 l/ha + Nissorun 10 WP = 0,5 l/ha sau

2. Flint Max 75 WG = 0,160 kg/ha + Melody Compact 49 WG = 1,5 kg/ha + Exirel = 0,5 – 0,9 l/ha + Ortus 5 SC = 0,5 l/ha.

Perioada optimă de tratament: fenofaza „creșterea boabelor”

Alte recomandări: Puteți folosi și alte produse de protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriu Romaniei

• **Atenție! Înainte de a aplica orice amestec de produse, testați combinația pe o mică parte din cultura care trebuie tratată, pentru a vă asigura că nu va produce reacții de fitotoxicitate.**

Alte măsuri de combatere: Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice;

• Metodele durabile de combatere: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

• **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate și depozitate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Dr. Ing. Carmen Miroiu