

19802
31 12 2025

**MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

**1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA
DIN DATA DE 02.12.2025**

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI OMOLOGATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ (art.33-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)					
ERBICIDE					
1.	BOZON 100 g/L mezozonă	Galenika-Fitofarmacija d.o.o., Slovenia CO:1103PC/02.12.2025	SMRZ: AUSTRIA	PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate sensibile (<i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Ambrosia</i> <i>artemisiifolia</i> , <i>Capsella bursa-</i> <i>pastoris</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Datura</i> <i>stramonium</i> , <i>Matricaria</i> <i>chamomilla</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Fallopia convolvulus</i> , <i>Persicaria</i> <i>maculosa</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Viola arvensis</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria</i> <i>sanguinalis</i>) • 0,75 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent, între 2 - 8 frunze ale porumbului (BBCH 12-18).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
2.	RINPODE 25 g/L florpiauxifen- benzil	Corteva Agriscience România SRL CO:1104PC/02.12.2025	SMRZ: POLONIA	SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ FURAJERĂ*, SFECLĂ DE ZAHĂR CONVISO SMART*: Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Capsella</i> <i>bursa-pastoris</i> , <i>Chenopodium</i> <i>album</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Lamium</i> <i>purpureum</i> , <i>Papaver rhoeas</i>) • 80 ml/ha (Doza unică - o singură aplicare) Se aplică 1 tratament. • Aplicare fracționată 2 aplicări fiecare cu 40 mL/ha la interval de 5-7 zile.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				• Aplicare fracționată 3 aplicări fiecare cu 26,8 mL/ha la interval de 5-7 zile. • Aplicare fracționată 4 aplicări fiecare cu 20 mL/ha la interval de 5-7 zile. Se aplică în postemergență de la apariția cotiledonelor până în faza de 9 frunze (BBCH10 - 19). *Utilizări minore în România, conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	TIMELINE FX/ (TRITIMAX - a doua denumire comercială) 1,75 g/L florasulam + 75 g/L fluroxipir-meptil + 30 g/L pinoxaden (conține 7,5 g/L cloquintocet-metil ca safener)	Syngenta Agro SRL, România CO: 909PC/07.03.2024	SMRZ: REPUBLICA CEHĂ	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>ORZ DE PRIMĂVARĂ ȘI DE TOAMNĂ:</u> <i>Apera spica-venti, Avena fatua</i> și buruieni dicotiledonate anuale • 1,5 L/ha Se aplică postemergent, primăvara din stadiul fenologic de 3 frunze până la apariția frunzei stindard (BBCH 13-37). <i>Alopecurus myosuroides, Lolium</i> sp. și buruieni dicotiledonate anuale • 2,0 L/ha Se aplică postemergent, primăvara din stadiul fenologic de 3 frunze până la apariția frunzei stindard (BBCH 13-37).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
4.	AMSTAF 800 EC 800 g/L prosulfocarb	Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia CO: 779PC/ 23.08.2022	SMRZ: ROMÂNIA	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>FLOAREA SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale (<i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Amaranthus hybridus</i> / <i>chlorastachys</i>, <i>Somanum nigrum</i>, <i>Ambrosia aremisiifolia</i>, <i>Chenopodium hybridum</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Abutilon</i> <i>theophrasti</i>, <i>Cannabis sativa</i>, <i>Datura stramonium</i>, <i>Mercurialis</i> <i>annua</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Panicum</i> <i>miliaceum</i>) • 3 - 5 L/ha Se aplică preemergent după semănat până când cotiledonele cresc spre suprafața solului (BBCH00-08).	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>

INSECTICIDE

1.	BUTEO START 480 FS 480 g/L flupiradifuron	BAYER SRL, România CO:676PC/22.04.2021	SMRZ: FINLANDA	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ DE ZAHĂR FURAJERĂ:</u> <i>Agriotes spp.</i>, <i>Atomaria linearis</i>,	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
----	---	---	---------------------------------	--	--



				<i>Pegomya hyoscyami</i> , <i>Chaetocnema tibialis</i> • 0,04167 L/100 000 semințe (maxim 0,062505 L/ha)	
2.	DECIS EXPERT 100 EC 100 g/L deltametrin	BAYER SRL, România CO:123PC/22.07.2015	SMRZ: ROMÂNIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: GRÂU DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ*, SECARA DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ *, GRÂU SPELTA DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ * <i>Zabrus tenebrioides</i> • 75 ml/ha Se aplică maxim 2 tratamente, de la 2 frunze până la începutul coacerii (BBCH 12-83).	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	MIMIC 240 g/L tebufenozid	Nisso Chemical Europe GmbH, Germania CO:838PC/25.04.2023	SMRZ: POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: POMI FRUCTIFERI (MĂR ȘI PĂR): <i>Cydia pomonella</i> , <i>Tortix</i> <i>(Pandemis spp., Archips</i> <i>spp., Adoxophyes orana,</i> <i>Argyrotaenia pulchellana)</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la umflarea mugurilor până la coacerea fructelor (BBCH 51-69). Se aplică 3 tratamente. VITĂ DE VIE: <i>Lobesia botrana</i> , <i>Sparganothis</i> <i>pilleriana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i> • 0,80 L/ha Se aplică de la umflarea mugurilor până la coacerea fructelor (BBCH 51-89). Se aplică 3 tratamente. PORUMB PENTRU NUTRET USCAT, PORUMB DULCE: <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la începutul coacerii (BBCH 30-79). Se aplică 1 tratament. PORUMB FURAJ VERDE/SILOZ: <i>Ostrinia nubilalis</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la începutul coacerii (BBCH 30-79). Se aplică 1 tratament.	ATENTIE UTILIZARE PROFESIONALĂ

FUNGICIDE

1.	REYONA MAX 100 g/L fluxapiraxad + 300 g/L mefentrifluconazol	BASF Agro B.V., ARNHEM (NL) – Freienbach Branch, Elveția CO:1105PC/02.12.2025	SMRZ: Republica Cehă	VITĂ DE VIE: <i>Erysiphe necator</i> , <i>Guignardia</i> <i>bidwellii</i> • 0,25 L/10 000 m ² suprafața peretelui foliar (maxim 0,33 L/ha)	ATENTIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	---	----------------------------	--	--------------------------------------



				Se aplică de la a-5-a frunză dezvoltată, până la coacerea strugurilor (boabele dezvoltă culoarea specifică) (BBCH 15-83).	
2.	AIRONE SC 272 g/L cupru (ca hidroxid de cupru și oxichlorură de cupru)	Gowan Crop Protection Ltd., Marea Britanie CO:376PC/28.02.2018	SMRZ: Republica Cehă	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola,</i> <i>Ramularia betae</i> 2,37 - 3,6 L/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	CHAMANE/ (AFFIX 250 SC - a doua de numire comercială) 250 g/L azoxistrobin	UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda CO: 357PC/ 29.11.2017	SMRZ: ROMÂNIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: FLOAREA SOARELUI: NU SE OMOLOGHEAZĂ	
4.	PROBLAD 1000 g/kg extract apos din semințele germinate de <i>Lupinus albus</i>	CEV S.A., Portugalia CO:1106PC/02.12.2025	SMRZ: OLANDA	TOMATE, VINETE* (SERE): <i>Botrytis cinerea, Leveillula taurica</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la apariția primului lăstar vizibil până la coacerea deplină (BBCH 20-89); max. 6 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. CÂPSUN (SERE, CÂMP): <i>Botrytis cinerea, Sphaerotheca macularis</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la începutul formării stolonilor până la uscarea frunzelor bătrâne (BBCH 40-94); max. 6 tratamente la interval de 8 zile între tratamente. VITĂ DE VIE: <i>Botrytis cinerea, Uncinula necator</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la formarea inflorescențelor până la coacerea boabelor (BBCH 55-89); max. 6 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. PIERSIC*, CIRES*, CAIS*, NECTARIN*: <i>Sphaerotheca pannosa</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la 10% flori deschise până la maturizarea fructelor (BBCH 61- 87); max. 3 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. NUC*, ALUN*, CASTAN*, KIWI: <i>Monilinia laxa, Phyllactinia corylea</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la 10% flori deschise până la maturizarea fructelor (BBCH 61-87); max. 3 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. FASOLE VERDE* (SERE ȘI CÂMP), MAZĂRE VERDE* (SERE ȘI CÂMP), BOB (SERE)*: <i>Sclerotinia sclerotiorum, Erysiphe polygoni</i>	UTILIZARE PROFESIONALĂ



				• 3,2 L/ha Se aplică de la mai mulți lăstari vizibili până la maturizarea păstăilor (BBCH 40-94); max. 6 tratamente la interval de 8 zile între tratamente. PLANTE AROMATICE* (EX.: ANASON, CHIMEN, HASMATUCHI, TARHON, CAPERE, VALERIANĂ, CIMBRU, BUSUIOC, ETC.) (SERE): <i>Botrytis cinerea, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cruciferarum</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la îngroșarea și extinderea frunzelor bazale (BBCH 40-94); max. 6 tratamente la interval de 8 zile între tratamente. VARZĂ BRUXELLES, VARZĂ CHINEZEASCA, KALE* (SERE): <i>Botrytis cinerea, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cruciferarum</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la îngroșarea și extinderea frunzelor bazale (BBCH 40-94); max. 6 tratamente la interval de 8 zile între tratamente. DOVLECEL* (SERE), PEPENE GALBEN* (SERE), DOVLEAC* (SERE), ARDEI IUTE* (SERE): <i>Botrytis cinerea, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula Taurica</i> • 3,2 L/ha Se aplică de la apariția celei de a-20-a frunză până la coacerea deplină (BBCH 20-89); max. 6 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. *Utilizări minore în România, conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
5.	RECUDO 275 g/L cupru din oxiclорură de cupru	Kwizda Agro GmbH, Austria CO:1107PC/02.12.2025	SMRZ: Republica Cehă	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 1 -1,5 L/ha Se aplică de la apariția condițiilor favorabile de infecție. Tratamentele se vor efectua la intervale de o săptămână; max.14 aplicări/sezon. SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola</i> • 1 - 2 L/ha Se aplică de la BBCH 39 (cultura acoperă solul) până la BBCH 49 (rădăcinile au atins dimensiunile de recoltare); max.7-14 aplicări/sezon. Doza redusă se va utiliza în cazul amestecurilor cu alte fungicide.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				MĂR: <i>Venturia</i> spp. • 1 - 1,7 L/ha Se va aplica săptămânal, de la BBCH 59 (floare închisă) până la BBCH 85 (coacere); max.14 aplicări/sezon. Se va utiliza cu precauție pe soiurile sensibile la cupru. Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	
6.	ORONDIS FORTE 40 g/L oxatiapiprolin + 140 g/L amisulbrom	Syngenta Agro SRL, România CO:1108PC/02.12.2025	SMRZ: SLOVENIA	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 0,5 L/ha Se aplică preventiv de la a-3-a frunză desfăcută până la începutul colorării boabelor (BBCH 13-83); 2 tratamente la un interval de minim 10 zile.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
7.	UPSIDE 325,6 g/L ABE-IT 56	Kwizda Agro GmbH, Austria CO:1109PC/02.12.2025	SMRZ: GERMANIA	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 2,5 L/ha (10 000 m ² suprafața foliară tratată)-maxim 4 L/ha Se aplică de la BBCH 13 (3 frunze vizibile) până la BBCH 79 (Compactarea ciorchinului, majoritatea boabelor se ating între ele); max. 8 tratamente la interval de 7 zile între tratamente.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
8.	SCENIC GOLD 350 FS 200 g/L fluopicolid + 150 g/L fluoxastrobin	BAYER SRL, România CO: 516PC/12.07.2019	SMRZ: POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Aphanomyces cochlioides</i> , <i>Neocamarosporium betae</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma betae</i> • 0,022 L/ha sau 0,02 L /unitate de semănat (1 unitate de semănat = 100.000 semințe Densitatea de însămânțare: 1-1,1 unitate/ha) Tratament sămânță (BBCH 00)	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ

OMOLOGARE ZONALĂ (art.34-39 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

ERBICIDE

1.	CLEMENT 120 g/L cletodim	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:1110PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	------------------------------------	--	-------------------------	--	---



				buruienilor (5 frunze). <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la 3 frunze până la începutul înfloririi (BBCH 13-60). CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i>, <i>Agropyron repens</i> • 1,6 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la apariția celei de-a 3 a frunze - apariția celei de-a 6 a inflorescențe (BBCH 13-60). RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,8 L/ha Se aplică postemergent, în perioada de creșteri active ale buruienilor până la maxim faza de 2 internoduri vizibile a culturii (BBCH 32). SOIA: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunză -începutul înfloritului (apariția sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). MAZĂRE FURAJERĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6-1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (3-5 frunze), înainte de BBCH 50 (butoni floralii formați
--	--	--	--	---



				acoperiți de frunze). <u>MAZĂRE (URCĂTOARE, VERDE, PĂSTAI)*:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6-1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (15-20 cm), înainte de BBCH 50 (butoni florali formați acoperiți de frunze). <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5-2,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni florali formați acoperiți de frunze). <u>FASOLE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din samanta) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni florali formați). <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni florali formați). <u>LUCERNĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). <u>SFECLĂ FURAJERĂ, SFECLĂ DE ZAHĂR*, SFECLĂ ROȘIE*:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în
--	--	--	--	--



				perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). NĂUT*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din samanta) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5-2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). ARBUȘTI FRUCTIFERI*: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5-2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm. CAPȘUN*: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5-2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) BBCH 13-60. PEPINIERE POMICOLE: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5-2,0 L/ha Se aplică postemergent când
--	--	--	--	---



				buruienile au 15-20 cm. *Utilizări minore în România, conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
2.	DEDALUS 120 g/L cletodim	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irlanda CO:1111PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (5 frunze) <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la 3 frunze până la începutul înfloririi BBCH (13-60). CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i>, <i>Agropyron repens</i> • 1,6 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la apariția celei de-a 3 a frunze până la apariția celei de-a 6 a inflorescente (BBCH 13-60). RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,8 L/ha Se aplică postemergent, în perioada de creșteri active ale buruienilor până la maxim faza de 2 internoduri vizibile a culturii (BBCH 32). SOIA: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60).	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



				MAZĂRE FURAJERĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (3-5 frunze), înainte de BBCH 50 (butoni florali formați acoperiți de frunze). MAZĂRE (URCĂTOARE, VERDE, PĂSTAI)*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (15-20 cm), înainte de BBCH 50 (butoni florali formați acoperiți de frunze). <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni florali formați acoperiți de frunze). FASOLE: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din samanta) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni florali formați). <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni florali formați). LUCERNĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) BBCH 13-60.	
--	--	--	--	--	--



				SFECLĂ FURAJERĂ, SFECLĂ DE ZAHĂR*, SFECLĂ ROȘIE*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). NĂUT*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din samanta) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). ARBUȘTI FRUCTIFERI*: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm. CAPȘUN*: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60).
--	--	--	--	--

				PEPINIERE POMICOLE: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm. *Utilizări minore în România, conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	V-DIM 120 EC 120 g/L cletodim	VEXTACHEM S.r.l., Italia CO:1112PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (5 frunze) <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la 3 frunze-începutul înfloririi (BBCH 13-60). CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale • 0,8 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i>, <i>Agropyron repens</i> • 1,6 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la apariția celei de-a 3 a frunze-apariția celei de-a 6 a inflorescente (BBCH 13-60). RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,8 L/ha Se aplică postemergent, în perioada de creșteri active ale buruienilor până la maxim faza de 2 internoduri vizibile a culturii (BBCH 32). SOIA: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria spp.</i>, <i>Sorghum</i>	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



				<i>halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). MAZĂRE FURAJERĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (3-5 frunze), înainte de BBCH 50 (butoni floriali formați acoperiți de frunze). MAZĂRE (URCĂTOARE, VERDE, PĂSTAI)*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor (15-20 cm), înainte de BBCH 50 (butoni floriali formați acoperiți de frunze). <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni floriali formați acoperiți de frunze). FASOLE: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din samanta) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni floriali formați). <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor, înainte de BBCH 50 (butoni floriali formați).
--	--	--	--	---



				LUCERNĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) BBCH 13-60. SFECLĂ FURAJERĂ, SFECLĂ DE ZAHĂR*, SFECLĂ ROȘIE*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). NĂUT*: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din samanta) • 0,6 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). ARBUȘTI FRUCTIFERI*: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm.
--	--	--	--	---



				CAPSUN*: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent în perioada de creștere activă a buruienilor. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm, de la a 3 a frunza până la începutul înfloritului (aparitia sporadică a primelor flori) (BBCH 13-60). PEPINIERE POMICOLE: Buruieni monocotiledonate anuale • 1,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm. Buruieni monocotiledonate perene • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm. *Utilizări minore în România, conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
4.	CROZIER 800 g/L prosulfocarb	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irlanda CO:1113PC/02.12.2025	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (inclusiv <i>Apera spica-venti</i>) și dicotiledonate anuale • 2,0 – 3,0 L/ha Se aplică preemergent MORCOV : Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3,0 – 3,5 L/ha Se aplică preemergent CEAPĂ: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3,0 – 5,0 L/ha Se aplică preemergent CARTOF: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 3,0 – 5,0 L/ha Se aplică preemergent.	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
5.	EVERDEX 40 g/L imazamox	SYNGENTA AGRO SRL CO:1114PC/02.12.2025	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	FLOAREA-SOARELUI (HIBRIZI A.I.R.™): Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 1,0 - 1,25 Lha Se aplică postemergent în stadiul de 2-8 frunze al culturii (BBCH 12-18), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				FLOAREA-SOARELUI (HIBRIZI A.I.R.™): <i>Orobanche cumana</i> • 1,0 - 1,25 L/ha Se aplică postemergent în stadiul de 2-8 frunze al culturii (BBCH 12-18), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). SOIA: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 0,75 - 1,00 L/ha Se aplică postemergent în stadiul (BBCH 12-14) al culturii (2-4 frunze), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). MAZĂRE (CÂMP): Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene • 0,75 - 1,00 L/ha Se aplică postemergent în stadiul BBCH 12-14 al culturii (2-4 frunze), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze).	
6.	FENSAR 40 g/L nicosulfuron	Rainbow Agrosiences Co., Ltd., Irlanda CO:1115PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	PORUMB: Buruieni sensibile: <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Viola arvensis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Polygonum convolvulus</i>. Buruieni moderat sensibile: <i>Chenopodium album</i>. • 1,0 L/ha Se aplică în stadiul de 2-7 frunze desfăcute (BBCH 12-17).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
7.	CATHEDRAL 240 g/L isoxaflutol + 240 g/L ciprosofamidă (safener)	Globachem NV, Belgia CO:1116PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	PORUMB : Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 0,3 - 0,41 L/ha Se aplică preemergent PORUMB : Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale • 0,41 L/ha Se aplică postemergent . Cultura: În stadiul de 2 - 3 frunze (BBCH 12 - 13). Buruieni: În stadiul de 2 - 3 frunze frunze (BBCH 12 - 13).	ATENȚIE CATEGORIA DE UTILIZARE
8.	BILLOUX 50 EC 50 g/L quizalofop-p-etil	JT AGRO Europe sp. z.o.o., Polonia CO:1117PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria viridis</i>, <i>Setaria glauca</i>, <i>Echinochloa spp.</i>) • 0,7 - 0,1 L/ha Se aplică postemergent, de la prima pereche de frunze până la 90% din teren acoperite de frunze (BBCH 10-39). CARTOF: Buruieni monocotiledonate perene (<i>Sorghum halepense</i>, <i>Agropyron Repens</i>)	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



				• 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent, de la prima pereche de frunze până la 90% din teren acoperite de frunze (BBCH 10-39). <u>FASOLE DE CÂMP PENTRU BOABE ȘI PĂSTĂI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (Exemplu: <i>Setaria glauca</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>) • 0,8 - 1,25 L/ha Se aplică postemergent de la apariția cotiledoanelor până la 9-10 lăstari laterali vizibili (BBCH 10-39). <u>FASOLE DE CÂMP PENTRU BOABE ȘI PĂSTĂI:</u> Buruieni monocotiledonate perene • 1,25 - 2,5 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția cotiledoanelor până la 9-10 lăstari laterali vizibili (BBCH 10-39). <u>FLOAREA SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate perene <i>Sorghum halepense</i> din rizomi, <i>Agropyron repens</i> • 1,5 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția cotiledoanelor până la 9-10 internodii vizibile (BBCH 10-39). <u>FLOAREA SOARELUI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> spp., <i>Digitaria</i> spp., <i>Echinochloa</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> din semințe) • 0,7 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția cotiledoanelor până la 9-10 internodii vizibile (BBCH 10-39). <u>MAZĂRE USCATĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>) • 0,8 - 1,25 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția primei perechi de frunze până la 9-10 internodii vizibile (BBCH 10-39). <u>MAZĂRE USCATĂ:</u> Buruieni monocotiledonate perene (<i>Sorghum halepense</i>, <i>Agropyron repens</i>, etc.) • 1,25 - 2,5 L/ha	
--	--	--	--	--	--

				Se aplică postemergent, de la apariția primei perechi de frunze până la 9-10 internodii vizibile (BBCH 10-39). MAZĂRE VERDE* (BOABE): Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, etc.) • 0,8 - 1,25 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția primei perechi de frunze până la 9-10 internodii vizibile (BBCH 10-39). MAZĂRE VERDE* (BOABE): Buruieni monocotiledonate perene (<i>Sorghum</i>, <i>Agropyron repens</i>, etc.) • 1,25 - 2,5 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția primei perechi de frunze până la 9-10 internodii vizibile (BBCH 10-39). MORCOV: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, etc.) • 1,0 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția cotiledoanelor până la 9-10 frunze desfacute (BBCH 10-39). MORCOV: Buruieni monocotiledonate perene (<i>Sorghum halepense</i>, <i>Agropyron repens</i>, etc.) • 2,0 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția cotiledoanelor până la 9 până la 10 frunze desfacute (BBCH 10-39). RAPITĂ: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>), inclusiv samulastra de cereale. • 1,0 L/ha Se aplică postemergent, de la apariția cotiledoanelor până la 9 până la 10 internodii vizibile (BBCH 10-39). SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Sorghum halepense</i> din rizomi • 2,0 L/ha Se aplică postemergent SFECLĂ DE ZAHĂR: Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, etc.) • 1,0 L/ha
--	--	--	--	--

				Se aplică postemergent, de la apariția cotiledonelor până la 9 până la 10 frunze desfăcute (BBCH 10-39). <u>TOMATE TRANSPLANTATE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, etc.) • 1,0 L/ha Se aplică postemergent, de la prima pereche de frunze vizibile până la 9 lăstari laterali vizibili (BBCH 10-39). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
9.	RAMSY 75 g/kg piroxulam + 75 g/kg cloquintocet-mexil (safener)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Olanda CO:1118PC/02.12.2025	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>GRÂU:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (Apera spica venti) • 110 g/ha + 0,5 L/ha adjuvant (Dassol 26-2N) Se aplică de la 2 frunze până la apariția celui de-al doilea nod (BBCH 12-32). Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Avena fatua</i>) și unele dicotiledonate (<i>Matricaria sp.</i>, <i>Anthemis sp.</i>, <i>Galium sp.</i>, <i>Galeopsis</i>, <i>Capsella sp.</i>, <i>Raphanus sp.</i>, <i>Adonis sp.</i>) • 250 g/ha + 0,5 L/ha adjuvant (Dassol 26-2N) Se aplică de la 2 frunze până la apariția celui de-al doilea nod (BBCH 12-32).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
10.	BEDOUIN 05 EC 50 g/L quizalofop-p-etil	ProAgri Crop Protection SRL CO:1119PC/02.12.2025	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>RAPITĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (ex: <i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa spp.</i>, etc), inclusiv samulastră de cereale • 0,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 11-21). Buruieni monocotiledonate perene (ex: <i>Agropyrum repens</i>, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi, etc.) • 1,50 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 11-21). <u>SOIA:</u> Buruieni monocotiledonate anuale (ex: <i>Setaria spp.</i>, <i>Echinochloa spp.</i>, etc) • 0,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 11-21).	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				Buruieni monocotiledonate perene (ex: <i>Agropyrum repens</i>, <i>Sorghum halepense</i> inclusiv din rizomi etc.) • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 11-21). FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale (ex: <i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa</i> spp., etc.) • 0,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 10-16). Buruieni monocotiledonate perene (ex: <i>Agropyrum repens</i>, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi, etc.) • 1,50 - 1,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 10-16). CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale (ex: <i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa</i> spp., etc.) • 0,7 - 1,0 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 20-34). Buruieni monocotiledonate perene (ex: <i>Sorghum halepense</i> inclusiv din rizomi, <i>Elymus repens</i>, etc.) • 1,50 - 2,0 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 20-34). SFECLĂ DE ZAHĂR: Buruieni monocotiledonate anuale (ex: <i>Setaria</i> spp., <i>Echinochloa</i> spp., etc) • 0,75 L/ha Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 20-34), de la 9 - 10 frunze desfăcute până când 40% din plante acoperă distanța dintre rânduri. Buruieni monocotiledonate perene inclusiv costrei din rizomi (ex: <i>Agropyrum repens</i>, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi, etc.) • 2,0 L/ha	
--	--	--	--	--	--



				Se aplică postemergent în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, (BBCH 20-34), de la 9 - 10 frunze desfăcute până când 40% din plante acoperă distanța dintre rânduri. OBSERVAȚIE: Pentru buruienile monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea până în faza de înfrățire iar pentru cele perene în momentul când au ajuns la o înălțime de 15 - 20 cm.	
--	--	--	--	--	--

INSECTICIDE

1.	FORIBA 500 g/kg flonicamid	Rainbow Agrosciences Co., Ltd., Irlanda CO:1120PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	MĂR: <i>Dysaphis plantaginea</i> • 0,01% (0,15 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi și până la dezvoltarea fructelor (BBCH 69 - 75). PIERSIC*: <i>Myzus persicae</i> • 0,012 - 0,014% (0,12 - 0,14 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi și până la dezvoltarea fructelor (BBCH 69 - 75), în funcție de gradul de infestare. PRUN: <i>Hyalopterus pruni</i> • 0,012 - 0,014% (0,12 - 0,14 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi și până la dezvoltarea fructelor (BBCH 69 - 75), în funcție de gradul de infestare. ARDEI (CÂMP): <i>Myzus persicae</i> • 0,012 - 0,014% (0,12 - 0,14 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul primăverii până la începutul verii la dezvoltarea frunzelor până la recoltarea fructelor (BBCH 16/18-99). CARTOF (INDUSTRIE, AMIDON, CONSUM): <i>Aphis spp.</i> • 0,160 kg/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la înflorire (de la BBCH 10-11 până la BBCH 15). CARTOF (SĂMÂNTĂ): <i>Aphis spp.</i> • 0,160 kg/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la apariția celei de-a 5-a frunza (de la BBCH 10-11 până la BBCH 15).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--------------------------------------	--	--------------------------------	--	---



				PLANTE ORNAMENTALE* DIN PARCURI ȘI GRĂDINI: <i>Macrosiphon rosae</i> • 0,012 - 0,014% (0,120 - 0,140 kg/ha) Se aplică de funcție de gradul de infestare. CAIS*: <i>Myzus persicae</i>, <i>Brachycaudus schwartzi</i>, <i>Myzus varians</i> • 0,140 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71). CIREȘ*: <i>Myzus cerasi</i>, <i>Myzus persicae</i> • 0,140 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71). VARZĂ ALBĂ, VARZĂ DE BRUXELLES*: <i>Aphis</i> spp. • 0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71). MAZĂRE VERDE*: <i>Myzus persicae</i> • 0,140 kg/ha Se aplică din aprilie până în iunie, de la sase frunze formate (cu stipele) sau trei cărcei dezvoltate până la 10% din păstai au atins mărimea caracteristică (BBCH 16-71). ORZ, OVĂZ, SECARĂ*: <i>Aphis</i> spp. • 0,140 kg/ha <u>Toamna</u>: Se aplică de la prima frunză desfăcută până la înfrățire (BBCH 11-25). <u>Primăvara</u>: Se aplică de la stadiul de frunză stindard complet dezvoltată până la maturitate în lapte (BBCH 39-77). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
2.	MARS 200 g/L clorantianiliprol	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO:1121PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF : <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare, 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tuberculilor (BBCH 31-48).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



			MĂR: <i>Cydia pomonella</i>, <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). MĂR : <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis spp.</i>, <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). PĂR*: <i>Cydia pomonella</i>, <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Leucoptera scitella</i>, <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis spp.</i>, <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). PRUN : <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN* <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). VITĂ DE VIE : <i>Lobesia botrana</i>, <i>Eupoecilia ambiguella</i> • 150-175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85). TOMATE, VINETE* : <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Tuta absoluta</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89). MORCOV, TELINA* : <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87).
--	--	--	--

				CONOPIDĂ*, BROCCOLI*, VARZĂ : <i>Mamestra brassicae, Plutella xylostella, Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare(BBCH 12-49). PORUMB, PORUMB ZAHARAT*: <i>Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la 4 frunze până la recoltare(BBCH 14-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	NOCORON 200 g/L clorantraniliprol	Globachem NV, Belgia CO:1122PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare din momentul în care 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tuberculilor (BBCH 31-48). MĂR: <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). MĂR: <i>Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). PĂR*: <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella, Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). PRUN: <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN* <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). VITĂ DE VIE: <i>Lobesia botrana</i>, <i>Eupoecilia ambiguella</i> • 150-175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85). TOMATE, VINETE* : <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Tuta absoluta</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89). MORCOV, TELINA* : <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87). CONOPIDĂ*, BROCCOLI*, VARZĂ: <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 12-49). PORUMB, PORUMB ZAHARAT*: <i>Ostrinia nubilalis</i>, <i>Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
4	LS CHLORANTRA 200 200 g/L clorantraniliprol	LIFE SCIENTIFIC Ltd., Irlanda CO:1123PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF : <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare din momentul în care 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tubercuilor (BBCH 31-48). MĂR: <i>Cydia pomonella</i>, <i>Phyllonorychter blancardella</i>, <i>Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). MĂR : <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis</i> spp., <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină(BBCH 70-87). PĂR*: <i>Cydia pomonella</i>, <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Leucoptera scitella</i>, <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis</i> spp., <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină(BBCH 70-87). PRUN : <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN* <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină(BBCH 70-87). VITĂ DE VIE : <i>Lobesia botrana</i>, <i>Eupoecilia ambiguella</i> • 150 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85). TOMATE, VINETE* : <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Tuta absoluta</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89). MORCOV, TELINA* : <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87). CONOPIDĂ*, BROCCOLI*,VARZĂ <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Pieris brassicae</i>
--	--	--	--	--

				• 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 12-49). <u>PORUMB, PORUMB ZAHARAT*:</u> <i>Ostrinia nubilalis,</i> <i>Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare (BBCH 14-87), de la 4 frunze până la recoltare. *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
5.	OpteraPro 200 g/L cloranthraniliprol	Nufarm România SRL CO:1124PC/02.12.2025	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>CARTOF :</u> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare din momentul în care 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tuberculilor (BBCH 31-48). <u>MĂR:</u> <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>MĂR :</u> <i>Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină BBCH 70-87). <u>PĂR*:</u> <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella, Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>PRUN :</u> <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN*</u> <i>Cydia molesta, Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				<u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Lobesia botrana</i>, <i>Eupoecilia ambiguella</i> • 150 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85). <u>TOMATE, VINETE* :</u> <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Tuta absoluta</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89). <u>MORCOV, TELINA* :</u> <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87). <u>CONOPIDĂ*, BROCCOLI*, VARZĂ:</u> <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 12-49). <u>PORUMB, PORUMB ZAHARAT*:</u> <i>Ostrinia nubilalis</i>, <i>Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
6.	SOLONTUS 200 g/L clorantraniliprol	JT AGRO Europe sp. z.o.o., Polonia CO:1125PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	<u>CARTOF:</u> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare din momentul în care 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tubercuilor (BBCH 31-48). <u>MĂR:</u> <i>Cydia pomonella</i>, <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87) . <u>MĂR:</u> <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis spp.</i>, <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



			Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>PĂR*:</u> <i>Cydia pomonella</i>, <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Leucoptera scitella</i>, <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis</i> spp., <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>PRUN:</u> <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>CAIS*, PIERȘIC*, NECTARIN*:</u> <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Lobesia botrana</i>, <i>Eupoecilia ambiguella</i> • 150-175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85). <u>TOMATE, VINETE*:</u> <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Tuta absoluta</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89). <u>MORCOV, TELINA*:</u> <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87). <u>CONOPIDĂ*, BROCCOLI*, VARZĂ:</u> <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 12-49). <u>PORUMB, PORUMB ZAHARAT*:</u> <i>Ostrinia nubilalis</i>, <i>Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha
--	--	--	--



				Se aplică la avertizare de la 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
7.	REVOGEN 200 g/L clorantraniliprol	Millenium City Group SRL CO:1126PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF : <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare din momentul în care 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tubercuilor (BBCH 31-48). MĂR: <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 31-48). MĂR : <i>Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 31-48). PĂR*: <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella, Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). PRUN: <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN* <i>Cydia molesta, Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). VITĂ DE VIE: <i>Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella</i> • 150 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				<u>TOMATE, VINETE*:</u> <i>Helicoverpa armigera, Tuta absoluta</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89). <u>MORCOV, TELINA* :</u> <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87). <u>CONOPIDĂ*, BROCCOLI*, VARZĂ:</u> <i>Mamestra brassicae, Plutella xylostella, Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 12-49). <u>PORUMB, PORUMB ZAHARAT*:</u> <i>Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
8.	PILARFLAM 200 g/L cloranthraniliprol	AJ-Agro-Grup SRL CO:1127PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	<u>CARTOF :</u> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare din momentul în care 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tuberculilor (BBCH 31-48). <u>MĂR:</u> <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>MĂR :</u> <i>Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>PĂR* :</u> <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella, Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i>	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



			• 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). PRUN : <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN* <i>Cydia molesta, Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). VITĂ DE VIE : <i>Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella</i> • 150 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85). TOMATE, VINETE* : <i>Helicoverpa armigera, Tuta absoluta</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89). MORCOV, TELINA* : <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87). CONOPIDĂ*, BROCCOLI*, VARZĂ : <i>Mamestra brassicae, Plutella xylostella, Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 12-49). PORUMB, PORUMB ZAHARAT*: <i>Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	---	--

9.	CATANGA 200 SC 200 g/L cloranthraniliprol	INNVIGO Sp.z.o.o., POLONIA CO:1128PC/02.12.2025	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>CARTOF :</u> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha Se aplică la avertizare din momentul în care 10% din plante acoperă distanța dintre rânduri până la dezvoltarea completă tubercuilor (BBCH 31-48). <u>MĂR:</u> <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>MĂR :</u> <i>Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 150 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>PĂR*:</u> <i>Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella, Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87) . <u>PRUN :</u> <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN*</u> <i>Cydia molesta, Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la căderea petalelor până la coacerea deplină (BBCH 70-87). <u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella</i> • 150-175 mL/ha Se aplică la avertizare de la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57-85). <u>TOMATE, VINETE* :</u> <i>Helicoverpa armigera, Tuta absoluta</i> 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor flori până la coacerea deplină (BBCH 51-89).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
----	--	---	-------------------------	--	--



				MORCOV, TELINA*: <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția a 5 frunze până la maturare (BBCH 15-87). CONOPIDĂ*, BROCCOLI*,VARZĂ: <i>Mamestra brassicae,</i> <i>Plutella xylostella, Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la apariția primelor frunze până la recoltare (BBCH 12-49). PORUMB, PORUMB ZAHARAT*: <i>Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha Se aplică la avertizare de la 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87). *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	---	--

FUNGICIDE

1.	FIBONSAD 500g/kg fenhexamid	Rainbow Agrosciences Co., Ltd., Irlanda CO:1129PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CĂPSUN: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,5 L/ha CASTRAVETI (SPATII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 L/ha TOMATE (SPATII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea</i> • 1,2 L/ha CIREȘ, VIȘIN: <i>Monilinia spp.</i> • 0,8 L/ha PRUN: <i>Monilinia spp.</i> • 0,8 L/ha CRIZANTEME, LALELE <i>Botrytis spp.</i> • 0,8 L/ha VITĂ DE VIE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,0 L/ha	UTILIZARE PROFESIONALĂ
2.	LAVANI 62,5 g/L fluopicolid + 625 g/L clorhidrat de propamocarb	UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A., OLANDA CO:1130PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 1,4 L/ha Se aplică preventiv, la suprapunerea lăstarilor din același	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				bilon, maxim 3 tratamente. CASTRAVETI: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 1,4 L/ha Se aplică preventiv, de la apariția lăstarilor laterali, maxim 2 tratamente. SALATĂ: <i>Bremia lactucae</i> • 1,4 L/ha Se aplică preventiv, până la căpățâna formată 70%, maxim 2 tratamente. CEAPĂ: <i>Peronospora destructor</i> • 1,4 L/ha Se aplică preventiv, de la apariția frunzei a 9-a până la culcarea a 50% din frunze, maxim 2 tratamente.	
3.	DIFER 250 g/L difenoconazol	Rainbow Agrosciences Co., Ltd., Irlanda CO:1131PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	CAIS*: <i>Monilinia laxa</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Se aplică primul tratament la deschiderea primelor flori (BBCH 60), iar al 2-lea până la 7 zile înainte de recoltare, maxim 2 tratamente. CĂPSUN*: <i>Mycosphereella fragariae</i> • 0,3 L/ha (0,03%) Se aplică de la deschiderea primelor flori până la 3 zile înainte de recoltare (BBCH 60-89), maxim 2 tratamente. CIRES*: <i>Monilia spp., Blumeriella jaapii</i> • 0,2 L/ha (0,03%) Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85), maxim 3 tratamente. VIȘIN*: <i>Monilinia spp.</i> • 0,15 L/ha (0,015%) Se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85), maxim 2 tratamente. MĂR: <i>Venturia inaequalis,</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,2 L/ha (0,027%) Se aplică de la începutul înfloririi - până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 61-84), maxim 3 tratamente.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ

				PIERSIC*: <i>Monilinia</i> spp. • 0,15 L/ha (0,015%) Se aplică de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare, maxim 2 tratamente. <i>Taphrina deformans, Coryneum beijerinckii, Spaerotecha pannosa var.persicae, Monilia</i> spp. • 0,2 L/ha (0,02%) Se aplică de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare, maxim 2 tratamente. RAPITĂ: <i>Phoma lingam, Alternaria brassicae, Erysiphe communis</i> • 0,5 L/ha Se aplică: Toamna în stadiul de 1-8 frunze (BBCH 11-18). Primavara de la apariția primului internod până la apariția mugurilor flori (BBCH 31-55). 2 aplicări, 1 aplicare în toamnă și 1 în primăvară. SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Cercospora beticola, Erysiphe betae</i> • 0,3 L/ha Se aplică din faza în care frunzele încep să acopere solul până când rădăcina de sfeclă ajunge la dimensiunea recoltabilă (BBCH 31-49), maxim 2 tratamente. TOMATE: <i>Alternaria solani</i> • 0,5 L/ha (0,05%) Se aplică de la începutul formării lăstarilor - până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică pentru coacere (BBCH 20-87), maxim 2 tratamente. *Utilizări minore în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
4.	LS FLUOP PROTHIO 125 g/L fluopiram + 125 g/L protioconazol	LIFE SCIENTIFIC Ltd., Irlanda CO:1132PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	RAPITĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicae</i> • 1 L/ha Se aplică primăvara de la formarea primilor boboci individuali (inflorescențe secundare) vizibili, dar încă închiși (BBCH 57) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69); max.1 tratament.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				FLOAREA SOARELUI: <i>Phoma macdonaldii</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Phomopsis helianthi</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 - 1,0 L/ha (În funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la fenofaza de 6 frunze (BBCH 16) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69); max. 2 tratamente, interval minim între tratamente 14 zile. PORUMB: <i>Helminthosporium turcicum</i> • 0,8 - 1,0 L/ha (În funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la începutul alungirii tulpinii (BBCH 30) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69); max. 2 tratamente, interval minim între tratamente 14 zile. CARTOF: <i>Alternaria spp.</i> • 0,3 - 0,5 L/ha (În funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la începutul formării tuberculilor (BBCH 40) până când fructele de pe prima fructificație se înnegresc (BBCH 89); max. 3 tratamente, interval minim între tratamente 10 zile.	
5.	PROPEL 250 SE 125 g/L fluopiram + 125 g/L prothioconazol	SHARDA CROP-CHEM ESPAÑA S.L., Spania CO:1133PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	RAPITĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Alternaria brassicae</i> • 1 L/ha Se aplică primăvara de la formarea primilor boboci individuali (inflorescențe secundare) vizibile, dar încă închiși (BBCH 57) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69), max.1 tratament. FLOAREA SOARELUI: <i>Phoma macdonaldii</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Phomopsis helianthi</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 - 1,0 L/ha (În funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la fenofaza de 6 frunze (BBCH 16) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69), max. 2 tratamente, interval minim între tratamente 14 zile. PORUMB: <i>Helminthosporium turcicum</i> • 0,8 - 1,0 L/ha (În funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la începutul alungirii	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				tulpinii (BBCH 30) până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 69), max. 2 tratamente, interval minim între tratamente 14 zile. CARTOF: <i>Alternaria spp.</i> • 0,3 - 0,5 L/ha (în funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la începutul formării tuberculilor (BBCH 40) până când fructele de pe prima fructificație se înnegresc (BBCH 89), max. 3 tratamente, interval minim între tratamente 10 zile.	
6.	PUSKAS 125 g/L fluopiram + 125 g/L protioconazol	Globachem NV, Belgia CO:1134PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	RAPITĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicae</i> • 1 L/ha Se aplică primăvara de la formarea primilor boboci individuali (inflorescențe secundare) vizibili, dar încă închiși (BBCH 57) până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 69), max.1 tratament. FLOAREA SOARELUI: <i>Phoma macdonaldii, Alternaria brassicae, Phomopsis helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea</i> • 0,8 - 1,0 L/ha (în funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la fenofaza de 6 frunze (BBCH 16) până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 69), max. 2 tratamente, interval minim între tratamente 14 zile. PORUMB: <i>Helminthosporium turcicum</i> • 0,8 - 1,0 L/ha (în funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la începutul alungirii tulpinii (BBCH 30) până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 69), max. 2 tratamente, interval minim între tratamente 14 zile. CARTOF: <i>Alternaria spp.</i> • 0,3 - 0,5 L/ha (în funcție de presiunea de infecție) Se aplică de la începutul formării tuberculilor (BBCH 40) până când fructele de pe prima fructificație se înnegresc (BBCH 89), max. 3 tratamente, interval minim între tratamente 10 zile.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
7.	TEBUCARE 250 g/L tebuconazol	AGROCARE CHEMICALS KFT, Ungaria CO:1135PC/02.12.2025	SMRZ: ROMÂNIA	RAPITĂ DE TOAMNĂ PENTRU ULEI: <i>Erysiphe communis, Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum</i>	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ

				• 1,0 L/ha Se aplică 1 singur tratament primăvara de la deschiderea primei flori până la mijlocul înfloritului (BBCH 60-65). Creșterea rezistenței plantelor la iernare <i>Phoma lingam</i> • 0,5 L/ha Se aplică 1 singur tratament toamna, în faza de 4- 6 frunze (BBCH 14-16). CIREȘ*: <i>Monilinia</i> spp. • 0,75 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente pe sezon, primul în intervalul deschiderea sealelor (BBCH 57) până în faza de sfârșit de înflorit (BBCH69), iar al doilea tratament în intervalul cuprins între BBCH 70 (începutul creșterii fructelor) până la BBCH 89 (coacerea fructelor). PRUN: <i>Monilinia</i> spp. • 0,75 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente pe sezon, primul în intervalul deschiderea sealelor (BBCH 57) până în faza de sfârșit de înflorit (BBCH69), iar al doilea tratament în intervalul cuprins între BBCH 70 (începutul creșterii fructelor) până la BBCH 89 (coacerea fructelor). MĂR: <i>Podosphaera leucotricha</i>, <i>Venturia inaequalis</i> • 0,6 L/ha Se aplică începând cu fenofaza de buton roz (BBCH 57) până la fenofaza de fruct cu diametrul de 4 cm (BBCH 74) ;maxim 2 tratamente pe sezon la interval de 12 zile. VITĂ DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,4 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente la un interval minim de 10 zile între tratamente: primul la fenofaza 3 frunzulițe nepliate (BBCH13), iar celelalte în intervalul inflorescențe clar vizibile până la începutul colorării boabelor (BBCH 53 -83). *Utilizare minoră în România conform ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	--	--

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 – 42 – Reg.(CE) nr.1107/2009)

ERBICIDE

1.	BEHEMOT 500 SC 500 g/L diflufenican	ProAgri Crop Protection Romania S.R.L. CO:1136PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>GRÂU DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ*, SECARĂ DE TOAMNĂ*</u>: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate: <i>Viola arvensis, Veronica persica, Capsella bursa-pastoris, Geranium pusillum, Stellaria media, Lamium purpureum L., Apera spica -venti, Centaurea cyanus L, Matricaria chamomilla</i> • 0,2 – 0,3 L/ha Se aplică toamna, imediat după răsărirea cerealelor, până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29); max. 1 tratament/ perioada de vegetație. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
2.	BRODAL 500 SC 500 g/L diflufenican	BAYER SRL, Romania CO:1137PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	<u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM, GRÂU SPELTA, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE, SECARĂ*</u>: <i>Apera spica-venti, Poa annua, Buruieni dicotiledonate anuale: Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Stellaria media, Viola arvensis</i> • 0,20 L/ha Se aplică preemergent de la semănat până la răsărire (BBCH 00 – 09); max. 1 tratament/sezon. <u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM, GRÂU SPELTA, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE, SECARĂ:</u> <i>Poa annua</i> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Centaurea cyanus, Matricaria chamomilla, Galium aparine, Papaver rhoeas, Stellaria media, Viola arvensis</i> • 0,14 L/ha Se aplică preemergent de la semănat până la răsărire (BBCH 00 – 09); max. 1 tratament/sezon. <u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM, GRÂU SPELTA, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE, SECARĂ:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Centaurea cyanus, Lamium purpureum, Stellaria media, Viola arvensis</i> • 0,10 L/ha	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				Se aplică preemergent de la semănat până la răsărire (BBCH 00 – 09); max. 1 tratament/sezon. <u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM, GRÂU SPELTA, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE, SECARĂ:</u> <i>Apera spica-venti, Poa annua,</i> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Lamium purpureum, Matricaria chamomilla, Stellaria media, Veronica hederifolia</i> • 0,20 L/ha Se aplică postemergent după răsărire până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29); max. 1 tratament/sezon. <u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM, GRÂU SPELTA, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE, SECARĂ:</u> <i>Poa annua</i> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Capsella bursa-pastoris, Galium aparine, Lamium purpureum, Matricaria chamomilla, Stellaria media</i> • 0,14 L/ha Se aplică postemergent după răsărire până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29); max. 1 tratament/sezon. <u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM, GRÂU SPELTA, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE, SECARĂ:</u> <i>Buruieni dicotiledonate anuale:</i> <i>Galium aparine, Lamium purpureum, Matricaria chamomilla, Stellaria media</i> • 0,10 L/ha Se aplică postemergent după răsărire până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29); max. 1 tratament/sezon. <u>RAIGRAS DE PAJISTE* (LOLIUM PRATENSE), RAIGRAS ITALIAN (LOLIUM MULTIFLORUM), RAIGRAS PEREN (LOLIUM PERENNE)/ (pentru producția de seminte):</u> <i>Apera spica-venti, Poa annua</i> • 0,20 L/ha Se aplică postemergent după răsărire până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29); max. 1 tratament/sezon. <u>RAIGRAS DE PAJISTE* (LOLIUM PRATENSE), RAIGRAS ITALIAN (LOLIUM MULTIFLORUM), RAIGRAS</u>
--	--	--	--	--

				<u>PEREN (LOLIUM PERENNE)</u> <u>/(pentru producția de semințe):</u> <i>Poa annua</i> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine, Lamium purpureum, Matricaria chamomilla, Stellaria media</i> • 0,14 L/ha Se aplică postemergent după răsărire până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29); max. 1 tratament/sezon. <u>RAIGRAS DE PAJISTE*</u> <u>(LOLIUM PRATENSE),</u> <u>RAIGRAS ITALIAN (LOLIUM MULTIFLORUM), RAIGRAS PEREN (LOLIUM PERENNE)/</u> <u>(pentru producția de semințe):</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine, Lamium purpureum, Matricaria chamomilla, Stellaria media</i> • 0,10 L/ha Se aplică postemergent după răsărire până la sfârșitul fazei de înfrățire (BBCH 10-29); max. 1 tratament/sezon. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	METROPOLITAN 500 g/L metazaclor	Sharda Cropchem Espana S.L., Spania CO:1138PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	<u>RAPITĂ DE TOAMNĂ, RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale: <i>Anthemis arvensis, Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Lamium purpureum, Matricaria spp., Papaver spp., Stellaria media, Poa annua, Galium aparine, Viola arvensis</i> • 1,5 L/ha Se aplică preemergent de la semănat până la răsărire (BBCH 00-09). <u>RAPITĂ DE TOAMNĂ, RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale: <i>Anthemis arvensis, Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Lamium purpureum, Matricaria spp., Papaver spp., Stellaria media, Poa annua, Galium aparine, Viola arvensis</i> • 1,5 L/ha Se aplică postemergent după răsărire până la stadiul de 9 frunze (BBCH 10-19).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



4.	NIANTIC OD 2 g/L Iodosulfuron-metil-sodiu + 10 g/L mezosulfuron-metil + 30 g/L mefenpir dietil (safener)	Life Scientific Ltd, Irlanda CO:1139PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ, TRITICALE*: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate : Exemple de buruieni: <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Stelaria media</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Bromus sterilis</i> , <i>Myosotis arvensis</i> , <i>Anthemis arvensis</i> , <i>Brassica napus</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Bromus secalinus</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> • 0,45 - 1,20 L/ha Se aplică în primăvară de la începutul fazei de înfrățire până la faza în care primul nod se află la cel puțin 1 cm deasupra nodului de înfrățire (BBCH 21-31); max. 1 tratament/sezon. SECARĂ*: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate : Exemple de buruieni: <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Stelaria media</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Bromus sterilis</i> , <i>Myosotis arvensis</i> , <i>Anthemis arvensis</i> , <i>Brassica napus</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Bromus secalinus</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> • 0,45 L/ha Se aplică în primăvară de la începutul fazei de înfrățire până la faza în care primul nod se află la cel puțin 1 cm deasupra nodului de înfrățire (BBCH 21-31); max. 1 tratament/sezon. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
5.	HUKKATA 500 SC 500 g/L diflufenican	QEMETICA Agricultural Solutions, Polonia CO:1140PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ*, SECARĂ DE TOAMNĂ*: Buruieni dicotiledonate anuale și perene: (Exemple de buruieni: <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Viola odorata</i> , <i>Apera spica-venti</i> , <i>Stellaria media</i>), <i>Lamium purpureum</i> , <i>Lamium album</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Veronica persica</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Brassica napus</i>). • 0,375 L/ha Se aplică toamna, imediat după însămânțarea cerealelor până la sfârșitul stadiului de înfrățire (BBCH 00-29); max. 1 tratament/sezon. *Utilizări minore în România	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
6.	PLANET 275 g/L 2,4-D (sub formă de sare DMA) + 275 g/L MCPA (sub formă de sare DMA)	Sharda Cropchem España S.L., Spania CO: 1141PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ: Buruieni dicotiledonate anuale și perene: Exemple de buruieni: <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> . • 1,5 L/ha Se aplică de la faza de 5 frați până la nodul 2, la cel puțin 2 cm deasupra nodului 1 (BBCH 25-32); max. 1 tratament. ORZ DE PRIMĂVARĂ: Buruieni dicotiledonate anuale și perene: Exemple de buruieni: <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Cirsium discolor</i> . • 1,3 L/ha Se aplică de la faza de 5 frați până la nodul 2, la cel puțin 2 cm deasupra nodului 1 (BBCH 25-32); max. 1 tratament.	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>

INSECTICIDE


1.	APIS 200 SE / (ACEPTIR 200 SE - a doua denumire comerciala) 200 g/L acetamiprid	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 405PC/ 28.02.2018	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Ceutorhynchus assimilis</i> , <i>Dasineura brassicae</i> • 0,12 - 0,25 L/ha RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Athalia rosae</i> , <i>Psylliodes chrysocephala</i> , <i>Delia radicum</i> , <i>Aphidula</i> sp. • 0,25 L/ha + 0,1 L/ha Asystent+/ Silitop Se aplică de la începutul apariției frunzelor până la apariția celei de-a 7-a frunze (BBCH 10-17). <i>Ceutorhynchus pallidactylus/ quadridens</i> • 0,2 - 0,25 L/ha Se aplică de la 50% păstăi formate până la semințe coapte (BBCH 55-67). GRÂU DE TOAMNĂ: <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i> • 0,2 L/ha sau 0,2 L/ha + 0,1 L/ha Asystent + Se aplică de la apariția celei de a 3 - a frunze - până la începutul înfloririi (BBCH 13-21).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
----	---	---	---	---	---



				<i>Sitobion avenae</i>, <i>Oulema melanopa</i> • 0,2 L/ha sau 0,2 L/ha +0,1 L/ha <i>Asystent</i> + Se aplică de la începutul apariției spicului până la maturitatea boabelor (în lapte) (BBCH 51-77). MĂR: <i>Aphis pomi</i>, <i>Dysaphis plantagines</i> • 0,125 L/ha <i>Cydia pomonella</i> • 0,2 L/ha CIREȘ*, VISIN*: <i>Rhagoletis cerasi</i> • 0,125 L/ha TOMATE (SERĂ), VINETE* (SERĂ): <i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 0,24 L/ha – 0,3 L/ha (1 aplicare) • 0,12 L/ha – 0,2 L/ha (2 aplicări) *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
2.	LUMIPOSA 625 FS/ (LUMIPOSA Xtra OSR - a doua denumire comercială) 625 g/L ciantraniliprol	CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL CO: 363PC/ 29.11.2017	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PORUMB, PORUMB ZAHARAT*: <i>Agriotes</i> spp. • 90 mL/90 000 de seminte/ ha (625 µg s.a./sămânță) Tratament la sămânță (BBCH 00). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALA

FUNGICIDE

1.	POLYVERSUM OD 1 x 10 ⁹ oospori/L <i>Pythium oligandrum</i> M1	Biopreparáty, spol. s r.o., Republica Cehă CO:1142PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	RAPITĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică: - toamna în faza de 2-9 frunze (BBCH 12-19); - primăvara de la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea completă (BBCH 30-65). Max. 3 tratamente/sezon la interval de 14 zile între tratamente. RAPITĂ: <i>Verticillium</i> spp • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică: - toamna în faza de 2-9 frunze	UTILIZARE PROFESIONALA
----	--	---	--	---	--------------------------------------



				(BBCH 12-19) - primăvara de la începutul alungirii tulpinii, până în faza de 10 internoduri vizibile (BBCH 30-40). Max. 2 tratamente/sezon la interval de 14 zile între tratamente. <u>GRAU DE TOAMNA, SECARA*, TRITICALE*:</u> <i>Fusarium sp.</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică: - toamna în faza de 3-5 frunze (BBCH 13-15); - primăvara în stadiul de 5 frați vizibili până la apariția frunzei standard (BBCH 25-37); - pentru spice de la mijlocul fazei de înspicare până la înflorirea deplină (BBCH 55-65). Max. 3 tratamente/sezon la interval de 14 zile între tratamente. <u>GRÂU DE TOAMNĂ, SECARĂ*, TRITICALE*:</u> <i>Septoria tritici</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii, până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69); max. 3 tratamente/sezon la interval de 14 zile între tratamente. <u>ORZ DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Fusarium sp.</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică: - în stadiul de 5 frați vizibili până la apariția frunzei standard (BBCH 25-37) - pentru spice, de la mijlocul fazei de înspicare până la înflorirea deplină (BBCH 55-65). Max. 2 tratamente/sezon la interval de 14 zile între tratamente. <u>SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ FURAJERĂ*, SFECLĂ ROȘIE*:</u> <i>Cercospora beticola</i> • 0,2 L/ha Se aplică când frunzele acoperă 90% din suprafața solului până la stadiul în care rădăcina de sfeclă a atins dimensiunea recoltabilă (BBCH 39-49); max. 3 tratamente/sezon la interval de 14 zile între tratamente. <u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,1 – 0,3 L/ha Se aplică după înflorirea deplină, când 80% din flori au căzut, până la stadiul în care boabele
--	--	--	--	---



			sunt coapte pentru recoltare (BBCH 68-89); max. 4 tratamente/sezon la interval de 5 zile între tratamente. <u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Candida</i> spp., <i>Kloeckera</i> spp., <i>Acetobacter</i> spp., <i>Gluconobacter</i> spp. • 0,1 – 0,3 L/ha Se aplică după înflorirea deplină cand 80% din flori au căzut, până la stadiul în care boabele sunt coapte pentru recoltare (BBCH 68-89); max. 4 tratamente/sezon la interval de 5 zile între tratamente. <u>LUPIN*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică de la apariția primului lăstar lateral până la dezvoltarea păstăilor (BBCH 21-79); max. 2 tratamente/sezon la interval de 7 zile între tratamente. <u>CĂPSUN*:</u> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică de la sfârșitul fazei de butonizare până la a doua recoltă (BBCH 59-89); max. 8 tratamente/sezon la interval de 5 zile între tratamente. <u>HAMEI*:</u> <i>Fusarium</i> sp. • 0,1 – 0,3 L/ha Se aplică înainte și după plantare; max. 4 tratamente/sezon la interval de 5 zile între tratamente. <u>MUSTAR*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică de la 2 frunze desfăcute până la înflorire completă (BBCH 12-65); max. 2 tratamente/sezon la interval de 5 zile între tratamente. <u>RIDICHE OLEAGINOASĂ</u> <u>FURAJERĂ*:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,1 – 0,2 L/ha Se aplică din stadiul de 2 frunze până la începutul dezvoltării tulpinilor și fomarea internodurilor (BBCH 12-39); max. 2 tratamente/sezon la interval de 14 zile între tratamente. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al	
--	--	--	--	--

				MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
2.	PROTIOSTAR PLUS 250 g/L protioconazol	FINCHIMICA S.p.A, Italia CO:1143PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	GRÂU DE TOAMNĂ: <i>Zymoseptoria tritici</i>, <i>Blumeria graminis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Puccinia striiformis</i> • 0,8 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la începutul înfloririi (BBCH 30-61); max. 3 tratamente/ cultură la interval de 14-21 zile între tratamente. <i>Fusarium spp</i> • 0,8 L/ha Se aplică de la sfârșitul înspicării până la sfârșitul înfloririi (BBCH 59-69); max. 3 tratamente/ cultură la interval de 14-21 zile între tratamente. SECARĂ*, TRITICALE*: <i>Zymoseptoria tritici</i>, <i>Blumeria graminis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Puccinia striiformis</i> • 0,8 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la începutul înfloririi (BBCH 30-61); max. 3 tratamente/ cultură la interval de 14-21 zile între tratamente. RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Plenodomus lingam</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,7 L/ha Se aplică când mugurii floralii sunt crescuți deasupra celor mai tinere frunze, până la stadiul în care primele petale sunt vizibile dar mugurii floralii încă închiși); max. 1 tratament/ cultură. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	ASCERNITY 23,6 g/L benzovindiflupir + 78,8 g/L difenoconazol	Syngenta Agro SRL, România CO:1144PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN FRANTA	GAZON: <i>Colletotrichum cereale</i> <i>Sclerotinia homoeocarpa</i> Fuzarioze și complex de helmintosporioze • 3 L/ha Se aplică max. 2 tratamente/ an la interval de 14 zile între tratamente.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



4.	GENERAL 300 EC 300 g/L protioconazol	ProAgri Crop Protection Romania S.R.L. CO:1145PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>Republica Cehă</u>	GRĂU DE TOAMNĂ, GRĂU DE PRIMAVARĂ*, TRITICALE*: <i>Septoria tritici, Blumeria graminis</i> • 0,50 - 0,65 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățiului până la începutul înfloririi (BBCH 29-61); max. 2 tratamente. ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMAVARĂ*: <i>Pyrenophora teres</i> • 0,50 - 0,65 L/ha Se aplică de la sfârșitul înfrățiului până la începutul înfloririi (BBCH 29-61); max. 2 tratamente. RAPITĂ: <i>Leptosphaeria maculans</i> • 0,60 L/ha Se aplică de la 3 la 9 sau mai multe frunze desfăcute (BBCH 13-19); max. 2 tratamente. <i>Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,50 - 0,65 L/ha Se aplică din faza în care 10% din florile de pe racemul principal sunt deschise până la sfârșitul înfloririi (BBCH 61-69); max. 2 tratamente. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALA
----	---	--	--	--	--

ELICITOR VEGETAL AL MECANISMELOR DE AUTOAPĂRARE

1.	VACCIPLANT 45 g/L laminarină	Laboratoires Goëmar SAS, Franța CO:1146PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>OLANDA</u>	POMI FRUCTIFERI (MĂR, PĂR): <i>Venturia inaequalis, Venturia pyrina</i> • 1 - 2 L/ha Se aplică de la apariția primelor frunze, până la stadiul în care fructele au gust și fermitate tipică (BBCH 10-89); max. 20 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <i>Erwinia amylovora</i> • 0,75 L/ha Se aplică de la stadiul de mugur verde, până la sfârșitul înfloririi: toate petalele sunt căzute (BBCH 56-69); max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <i>Gloeosporium album</i> • 1 - 2 L/ha Se aplică cu o lună înainte de recoltare; max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALA
----	---------------------------------	--	--	--	--

			POMI FRUCTIFERI (CIRES*, VISIN*, CAIS*, PIERISIC*, NECTARIN*): <i>Venturia inaequalis, Gloeosporium album</i> • 1 - 2 L/ha Se aplică de la apariția primelor frunze, până la stadiul în care fructele au gust și fermitate tipică (BBCH 10-89) (aprilie - octombrie); max. 30 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. CAPSUN: <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1 - 2 L/ha Se aplică începând cu a doua pereche de frunze până la începutul repausului vegetativ când încep să apară frunze noi (BBCH 12-92); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. COACĂZE* ȘI FRUCTE DE PĂDURE (AGRIȘ*, AFINE*, MURE*, ZMEURĂ*, ZMEUR URIȘ*): <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la începutul repausului vegetativ când frunzele încep să se decoloreze (BBCH 12-92); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. FASOLE VERDE: <i>Botrytis cinerea</i> • 3 L/ha Se aplică de la prima pereche de frunze până la coacerea deplină (BBCH 12-89); max. 7 tratamente la interval de 21 zile între tratamente CUCURBITACEAE CU COAJA COMESTIBILĂ ȘI NECOMESTIBILĂ (CASTRAVETE, ZUCCHINI, DOVLECEL*, PEPENE GALBEN*): <i>Botrytis cinerea, Pseudoperonospora cubensis, Erysiphe cichoracearum/ Sphaerotheca fuliginea</i> • 3 L/ha Se aplică de la a 2-a frunză adevărată până la coacerea deplină (BBCH 12-89); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. TOMATE, ARDEI, VINETE: <i>Botrytis cinerea</i> • 3 L/ha
--	--	--	---

			Se aplică de la a 2-a frunză adevărată desfăcută până la coacerea deplină (BBCH 12-89) (ianuarie - decembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>TOMATE, VINETE:</u> <i>Leveillula taurica</i> • 1 L/ha Se aplică de la a 2-a frunză adevărată desfăcută, până la coacerea deplină (BBCH 12-89) (ianuarie- decembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <i>Pseudomonas syringae pv tomato</i> • 2 L/ha Se aplică de la stadiul în care cotiledoanele sunt complet desfăcute, până la coacerea completă (BBCH 10-89) (ianuarie - decembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>SFECLA FURAJERA*:</u> <i>Podosphaera aphanis</i> • 1,5 – 2 L/ha Se aplică de la prima pereche de frunze desfăcute, până la începutul decolorării frunzelor (BBCH 12-92) (aprilie - septembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>VARZA DE BRUXELLES*, CONOPIDA*, BROCCOLI*, VARZA CHINEZEASCA*, KALE*, GULIE*, RIDICHI*, Sium sisarum*, PATRUNJEL PENTRU RADACINA*, PASTARNAC*, ALTE LEGUME RADACINOASE SI TUBERCULI (SFECLA ROŞIE*, TOPINAMBUR*, ANGHINARE CHINEZEASCA*, CARTOF DULCE*, TELINA DE RADACINA*, SCORTONERA*, BARBA-CAPREI*, HREAN*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică de la prima pereche de frunze desfăcute, până la începutul decolorării frunzelor (BBCH 12-92) (aprilie - septembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>ARPAGIC*, CEAPA DE PRIMAVARA*, USTUROI*, SPARANGHEL*, TELINA*, ANGHINARE*, RUBARBA*, FENICUL*, PRAZ*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha
--	--	--	---



			Se aplică de la a 2-a frunză vizibilă clar, până la stadiul în care frunzele și lăstarii încep să se decoloreze (BBCH 12-92) (aprilie - septembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>IARBA SARATA* (Salicornia europaea):</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică de la a 2-a frunză vizibilă clar, până la stadiul în care frunzele și lăstarii încep să se decoloreze (BBCH 12-92) (aprilie - septembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>BULBI DE FLORI ȘI TUBERCULI DE FLORI*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică de la a 2-a frunză vizibilă clar, până la stadiul în care frunzele și lăstarii încep să se decoloreze (BBCH 12-92) (aprilie - septembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>PLANTE DE GHIVECI*, FLORI TAIATE*, CULTURI DE FLORI DIN SEMINTE*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică de la a 2-a frunză vizibilă clar, până la stadiul în care frunzele și lăstarii încep să se decoloreze (BBCH 12-92) (aprilie - septembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>PLANTE PERENE*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1 - 2 L/ha Se aplică de la primele frunze separate până la coacerea completă (BBCH 10-89) (aprilie - octombrie); max. 33 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>CULTURI PENTRU PRODUCEREA DE HIBRIZI ȘI DE SEMINTE*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică de la prima pereche de frunze până la începutul repausului vegetativ (BBCH 12-	
--	--	--	--	--

				92) (aprilie - septembrie); max. 7 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>SALATĂ VERDE*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis. Bremia lactucae</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică la a 2-a frunză adevărată, până la stadiul în care frunzele și lăstarii încep să se decoloreze (BBCH 12-92) (aprilie - septembrie, ianuarie - decembrie); max. 6 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>ANDIVE*, SPANAC*, IARBA-GRASA*, NASTUREL*, FETICA*, RUCOLA*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 1,5 - 2 L/ha Se aplică de la prima frunză adevărată, până la stadiul în care frunzele și lăstarii încep să se decoloreze (BBCH 11-92) (ianuarie - decembrie); max. 6 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>FASOLE PĂSTĂI*, MAZARE PĂSTĂI*:</u> <i>Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis</i> • 3 L/ha Se aplică la prima pereche de frunze desfăcute, până la coacere deplină (BBCH 12-89) (ianuarie - decembrie); max. 7 tratamente la interval de 21 zile între tratamente. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.
--	--	--	--	--

REGULATORI DE CREȘTERE

1.	ATONIK MAX 3 g/L 5-nitroguaiacolat de sodiu + 6 g/L ortonitrofenolat de sodiu + 9 g/L paranitrofenolat de sodiu	Asahi Chemical Europe s.r.o, Republica CEHA CO:1147PC/02.12.2025	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>RAPITĂ DE TOAMNĂ:</u> • 0,2 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii (fără internoduri/ rozetă) până la sfârșitul etapei de înflorire (BBCH 30-69); max. 2 tratamente / cultura / sezon la interval de min. 7 zile între tratamente. <u>GRÂU DE TOAMNĂ:</u> • 0,2 L/ha Se aplică de la începutul etapei de înfrățire (1 lăstar vizibil) până când teaca frunzei standard se deschide (BBCH 21-49); max. 1 tratament / cultura/sezon. <u>SFECLĂ DE ZAHĂR:</u> • 0,2 L/ha	UTILIZARE PROFESIONALĂ/ NEPROFESIONALĂ
----	---	---	---	---	---



			Se aplică de la stadiul primei perechi de frunze adevărate până la stadiul în care rădăcina atinge dimensiunea de recoltare (BBCH 12-49); max. 2 tratamente/cultura/sezon la interval de min. 7 zile între tratamente. MUSTAR ALB*, MUSTAR NEGRU*, MUSTAR BRUN*, CAMELINA*, RIDICHE OLEAGINOASĂ*, MAC MEDICINAL*, IN PT SEMINTE*, CÂNEPĂ*, IERBURI (LIMBA-MIELULUI*): • 0,2 L/ha Se aplică de la sfârșitul fazei de formare a lăstarilor laterali sau de la începutul alungirii tulpinii (la începutul creșterii tulpinii principale) până la sfârșitul înfloririi; (BBCH 29/30-69); max. 2 tratamente/cultura/sezon la interval de min. 7 zile între tratamente. GRÂU SPELTA*, GRÂU EMMER*, ALAC*, GRÂU DURUM*, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*: • 0,2 L/ha Se aplică de la începutul etapei de înfrățire (1 lăstar vizibil) până când teaca frunzei stindard se deschide; (BBCH 21-49); max. 1 tratament/cultura/sezon. SFECLĂ FURAJERĂ*, NAP*: • 0,2 L/ha Se aplică de la stadiul primei perechi de frunze adevărate până în stadiul în care rădăcina atinge dimensiunea de recoltare; (BBCH 12-49) ; max. 2 tratamente/cultura/sezon la interval de min. 7 zile între tratamente. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	---	--

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR – (ART.43– Reg.(CE) nr.1107/2009)

ERBICIDE

1.	CLERANDA 17,5 g/L imazamox + 375 g/L metazaclor	Basf Agrochemical Products B.V., Puerto Rico Branch CO:008 PC/ 28.05.2012	SMRZ: Republica CEHĂ	RAPITĂ DE TOAMNĂ (HIBRIZI CLEARFIELD): Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate: <i>Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia elatior, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galium aparine, Xanthium strumarium, Matricaria spp.,</i>	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	--	----------------------------	--	--



				<i>Veronica persica</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Setaria viridis</i> etc. • 1,4 L/ha + (1,0 - 1,4 L/ha) adjuvant DASH HC Se aplică postemergent când culturile de rapiță se află în faza de cotiledoane dezvoltate până în faza de 8 frunze BBCH (10-18). Buruienile dicotiledonate au 2-4 frunze iar buruienile monocotiledonate 1-3 frunze. RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ (HIBRIZI CLEARFIELD): Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate: <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Abutilon theophrasti</i>, <i>Amaranthus</i> spp., <i>Ambrosia elatior</i>, <i>Capsella bursa pastoris</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Datura stramonium</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Xanthium strumarium</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Veronica persica</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Setaria viridis</i> etc. • 1,5 - 2,0 L/ha + 1,0 L/ha adjuvant DASH HC HC Se aplică postemergent când culturile de rapiță se află în faza de cotiledoane dezvoltate până în faza de 8 frunze BBCH (10-18). Buruienile dicotiledonate au 2-4 frunze iar buruienile monocotiledonate 1-3 frunze.	
2.	ACTIVUS 400 SC 400 g/L pendimetalin	Adama Agricultural Solutions SRL, Romania CO: 327PC/ 29.06.2017	<u>SMRZ:</u> OLANDA	GRĂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ: Buruieni anuale dicotiledonate și monocotiledonate: <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Apera spica-venti</i>, <i>Brassica napus</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Lamium</i> sp., <i>Myosotis arvensis</i>, <i>Poa annua</i>, <i>Tripleurospermum inodorum</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Veronica persica</i>, <i>Viola arvensis</i> etc. • 2,8 L/ha Se aplică postemergent timpuriu (toamna în septembrie-noiembrie) în faza de 1-3 frunze ale cerealelor (BBCH 10-13).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	DANEVA / (DANZIG - a doua denumire comercială) 100 g/L mezotrionă	Albaugh TKI d.o.o., Slovenia CO:320PC/ 29.06.2017	<u>SMRZ:</u> GERMANIA	PORUMB BOABE SI SILOZ: Buruieni dicotiledonate anuale (ex. <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Capsella</i>	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



				<i>bursa-pastoris, Galium aparine</i>) și Buruieni monocotiledonate sensibile (ex. <i>Echinochloa crus-galli, Poa annua</i>) • 0,75 - 1,5 L/ha Se aplică postemergent (o singură aplicare). BBCH porumb: 12-18 (2 - max.8 frunze) Buruieni dicotiledonate anuale: (2 - 4 frunze) Buruieni monocotiledonate anuale: (1-3 frunze) PORUMB BOABE ȘI SILOZ (aplicare fracționată): Buruieni dicotiledonate anuale (ex. <i>Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Galium aparine</i>) și Buruieni monocotiledonate sensibile (ex. <i>Echinochloa crus-galli, Poa annua</i>) • 0,75 + 0,75 L/ha Se aplică postemergent (2 aplicări secvențiale). BBCH porumb: 12-18 (2 - max.8 frunze). Buruieni dicotiledonate anuale: (2 - 4 frunze) Buruieni monocotiledonate anuale: (1-3 frunze)	
--	--	--	--	--	--

FUNGICIDE

1.	VIDERYO F 40 g/L ciazofamid + 400 g/L folpet	ISK Biosciences Europe N.V., Belgia CO: 208PC/ 20.10.2016	SMRZ: Republica Cehă	VITĂ DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 2,5 L/ha Tratament preventiv se aplică de la a 5-a frunză până la intrarea în părgă (BBCH 15-85).	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
2.	TRIUMF 40 WG 400 g/kg cupru - sub formă de hidroxid de cupru	Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA Summit Agro Romania SRL, ROMANIA CO: 2752/ 27.03.2008	SMRZ: AUSTRIA	CAIS, CIRES, PIERȘIC, NECTARIN, PRUN: <i>Taphrina</i> spp., <i>Monilinia</i> spp. <i>Stigmia carpophila, Pseudomonas</i> spp., <i>Blumeriella</i> spp., <i>Cytospora leucostoma</i> • 2,5 kg/ha Se aplică când 50 % din frunze au căzut până la apariția mugurilor floralii (BBCH 95-53). Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. MĂR, PĂR, GUTUI, MOSMON, MOSMONUL JAPONEZ: <i>Venturia</i> spp., <i>Nectria</i> spp., <i>Monilinia</i> spp., <i>Erwinia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp. • 2,5 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor până la apariția mugurilor floralii (BBCH 91-53).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>VITA DE VIE:</u> <i>Plasmopara viticola</i>, <i>Elsinoe</i> sp., <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 2,5 kg/ha Se aplică începând cu apariția celei de a 5-a frunze până când ciorchinii au început să se coloreze și după recoltare până la sfârșitul maturării lemnului BBCH (15-81 și 89); Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>TOMATE, VINETE (CÂMP ȘI SERE):</u> <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 2,5 kg/ha Se aplică de la stadiul de 5 frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 15-89); Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>CASTRAVETI, DOVLECEI (ZUCCHINI), CASTRAVECIORI (CORNICHON) (CÂMP ȘI SERE):</u> <i>Pseudoperonospora</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 2,5 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 10-89); Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	
3.	CUPERTINE SUPER/ (COMBIDUO COBRE – a doua denumire comercială) 225 g/kg cupru sub forma de amestec bordelez + 30 g/kg cimoxanil	Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA CO: 2195/ 27.03.2003	<u>SMRZ:</u> AUSTRIA	<u>VITA DE VIE:</u> <i>Plasmopara viticola</i>, <i>Elsinoe ampelina</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Xanthomonas ampelina</i>. • 4,0 kg/ha Se aplică începând cu apariția celei de a 4-a frunze până când ciorchinii au început să se coloreze (în culoarea specifică varietății/ soiului) (BBCH 14-81). Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>TOMATE, VINETE (CÂMP ȘI SERE):</u> <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp.,	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 3,5 kg/ha Se aplică de la stadiul de 4 frunze adevărate pe tulpina principală până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică de coacere completă (BBCH 14-87). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. ARDEI (CÂMP ȘI SERE): <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 3,5 kg/ha Se aplică de la stadiul de 4 frunze adevărate pe tulpina principală până 70% din fructe prezintă culoarea tipică de coacere completă (BBCH 14-87); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 3,5 kg/ha Se aplică de la a cincea frunză a tulpinii principale desfășurate (> 4 cm) până când boabele în prima fructificare au culoarea ocră sau maronie (BBCH 15-85); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	
4.	ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comercială) 200 g/kg cupru sub formă de amestec bordelez	Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA CO: 2333/ 14.06.2005	SMRZ: AUSTRIA	MĂR, PĂR, GUTUI, MOȘMON MOSMONUL JAPONEZ: <i>Venturia</i> spp., <i>Nectria galigena</i>, <i>Monilinia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Erwinia amylovora</i> • 3,75 - 5,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor până la apariția mugurilor floralii (BBCH 91-53). Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i>, <i>Elsinoe ampelina</i>, <i>Xanthomonas ampelina</i> • 3,75 - 5,0 kg/ha Se aplică începând cu apariția celei de a 5-a frunze până când ciorchinii au început să se coloreze și după recoltare până la sfârșitul maturării lemnului (BBCH15-81 și 91). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				<u>TOMATE, VINETE (SERE):</u> <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 3,75 - 5,0 kg/ha Se aplică de la stadiul de 5 frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 15-89). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	
5.	ALCUPRAL 50 PU 500 g/kg cupru metalic - sub forma de oxiclorig de cupru	Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA CO: 1945/ 22.06.2000	<u>SMRZ:</u> AUSTRIA	<u>CAIS, CIRES, PIERSIC, NECTARIN, PRUN:</u> <i>Taphrina</i> spp., <i>Monilinia</i> spp., <i>Stigmata carpophila</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>, <i>Blumeriella jaapii</i>, <i>Cytospora leucostoma</i>, <i>Polystigma rubrum</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică când 50 % din frunze au căzut până la apariția mugurilor floralii (BBCH 95-53). Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>MĂR, PĂR, GUTUI, MOȘMON, MOȘMONUL JAPONEZ:</u> <i>Venturia</i> spp., <i>Nectria galigena</i>, <i>Monilinia</i> spp., <i>Erwinia amylovora</i>, <i>Pseudomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor până la apariția mugurilor floralii (BBCH 91-53). Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>VITA DE VIE:</u> <i>Plasmopara viticola</i>, <i>Elsinoe ampelina</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Xanthomonas ampelina</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică înainte de înflorit până la coacerea în părgă și după recoltare la sfârșitul maturării lemnului BBCH (15-81 și 91). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>TOMATE, VINETE (SERE):</u> <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la stadiul de 5 frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 15-89).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>

				Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. CASTRAVETI, DOVLECEI (ZUCCHINI), CASTRAVETI (CORNICHON) (CÂMP ȘI SERE): <i>Pseudoperonospora</i> spp. <i>Alternaria</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 10-89). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la stadiul de 5 frunze până la suberificarea tubercuilor (BBCH 15-85). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. CEAPĂ: <i>Peronospora destructor</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la stadiul de 4 frunze până când începe boltirea, adică 10% din frunze sunt aplecate (BBCH 14-47). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. FASOLE: <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la stadiul de 4 frunze (formarea celei de-a doua frunză trifoliată) până la maturitatea păstăilor (BBCH 14-89). Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	
--	--	--	--	---	--

**EXTINDEREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU UTILIZĂRI MINORE
(ART.51 - Reg.(CE) nr.1107/2009)**

1.	APIS 200 SE / (ACEPTIR 200 SE - a doua denumire comerciala) 200 g/L acetamiprid	INN VIGO Sp.z.o.o., Polonia CO: 405PC/ 28.02.2018	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	PĂR: <i>Aphis pomi</i>, <i>Dysaphis plantaginea</i> • 0,125 L/ha - 0,2 L/ha (2 aplicări) SECARĂ: <i>Afide (Aphids)</i>, <i>Oulema melanopa</i> • 0,2 L/ha sau • 0,2 L/ha + 0,1 L/ha adjuvant Asysent+	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	---	--	--	---



				ARONIA, MĂCEȘ, PĂDUCEL, DUD, SOC, MERISOR: <i>Hypera variabilis</i>, <i>Otiiorhynchus</i> <i>sulcatus</i>, <i>Anthonomus rubi</i>, <i>Archips</i> <i>rosanus</i>, <i>Othiorhynchus ligustici</i>, <i>Archips rosanus</i>, <i>Archips</i> sp., <i>Hyphantria cunea</i>, Afide (<i>Myzus</i> <i>persicae</i>, <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i>), <i>Phyllopertha</i> <i>horticola</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Thrips fuscipennis</i>, <i>Conotrachelus</i> <i>nenuphar</i>, <i>Acrobasis vaccini</i> • 0,2 L/ha COACĂZ NEGRU, COACĂZ ROȘU, COACĂZ ALB: <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Archips</i> <i>rosanus</i>, <i>Archips</i> sp., <i>Hyphantria</i> <i>cunea</i>, Afide (<i>Myzus persicae</i>, <i>Macrosiphum euphorbiae</i>), <i>Incurvaria capitella</i>, <i>Synanthedon</i> <i>tipuliformis</i>, <i>Bacconematus</i> <i>pumilio</i>, <i>Lampronia capitella</i>, <i>Dasineura telensi</i>, <i>Pachinematus pumilio</i> • 0,2 L/ha sau • 0,2 L/ha + 0,2 L/ha adjuvant Asystent+ MERISOR CU TUFISURI ÎNALTE: <i>Archips podana</i>, <i>Adoxophyes</i> <i>orana</i>, <i>Archips rosanus</i>, <i>Archips</i> sp., <i>Hyphantria cunea</i>, Afide (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), <i>Phyllopertha horticola</i>, <i>Dasineura</i> <i>vaccinii</i> • 0,15 L/ha sau • 0,15 L/ha + 0,2 L/ha adjuvant Asystent+ CĂPSUN, FRAGI: <i>Aphis forbesi</i>, <i>Myzus persicae</i>, <i>Anthonomus rubi</i>, <i>Lygus</i> <i>hesperus</i>, <i>Phyllopertha horticola</i>, <i>Aphelia viburniana</i>, <i>Otiiorhynchus</i> <i>sulcatus</i>, <i>Aphelia viburmana</i>, <i>Acleris comariana</i> • 0,15 L/ha sau • 0,15 L/ha + 0,2 L/ha adjuvant Asystent+ AGRIȘ, AFIN: <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Archips</i> <i>rosanus</i>, <i>Archips</i> sp., <i>Hyphantria</i> <i>cunea</i>, Afide (<i>Aphis</i> sp.), <i>Synanthedon tipuliformis</i>, <i>Cryptomyzus ribis</i> • 0,2 L/ha sau • 0,2 L/ha + 0,2 L/ha adjuvant Asystent+
--	--	--	--	---

			MUR, ZMEUR: <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Archips rosanus</i>/<i>Archips</i> sp., <i>Hyphantria cunea</i>, <i>Afide</i> (<i>Aphis</i> sp.), <i>Lampronia capitella</i>, <i>Anthonomus rubi</i>, <i>Byturus tomentosus</i>, <i>Synanthedon tipuliformis</i>, <i>Pennisetia hylaeiformis</i> • 0,2 L/ha sau • 0,2 L/ha + 0,2 L/ha adjuvant Asystent+ NUC: <i>Afide</i> (<i>Aphis</i> sp.) • 0,2 L/ha ALUN: <i>Afide</i>(<i>Corylobium avellanae</i>, <i>Myzocallis coryli</i>), <i>Balaninus nucum</i>/<i>Curculio nucum</i>, <i>Oberea linearis</i>, <i>Parthenolecanium corni</i>, <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Archips rosanus</i>/<i>Archips</i> sp., <i>Cydia</i> sp. • 0,2 L/ha TUTUN: <i>Thrips tabaci</i>, <i>Afide</i> (<i>Aphis fabae</i>, <i>Myzus persicae</i>) • 0,2 L/ha IN PENTRU FIBRE: <i>Aphthona euphorbiae</i>, <i>Longitarsus parvulus</i>, <i>Thrips linarius</i> • 0,25 L/ha CÂNEPĂ PENTRU FIBRE: <i>Afide</i> (<i>Aphis</i> sp., <i>Myzus persicae</i>) • 0,25 L/ha USTUROI, ȘALOTĂ: <i>Ceutorhynchus suturalis</i>, <i>Acrolepia assectella</i>, <i>Thrips</i> sp., <i>Delia florilega</i>, <i>Delia platura</i>, <i>Delia antiqua</i> • 0,2 L/ha sau • 0,2 L/ha + 0,2 L/ha adjuvant Asystent+ SFECLĂ FURAJERĂ: <i>Bothynoderes punctiventris</i> • 0,25 L/ha SFECLĂ ROSIE: <i>Chaetocnema concinna</i>, <i>Atomaria linearis</i>, <i>Afide</i> (<i>Aphis</i> sp.) • 0,25 L/ha TELINĂ DE RĂDĂCINĂ: <i>Pieris brassicae</i>, <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Psila rosae</i>, <i>Phyllotreta nemorum</i>, <i>Phyllotreta</i> sp., <i>Graphosoma lineatum</i>, <i>Spodoptera littoralis</i>, <i>Afide</i> (<i>Aphis</i> sp., <i>Dysaphis crataegi</i>) <i>Athalia rosae</i>, <i>Euleia heracleid</i>,
--	--	--	---

			<i>Lygus</i> sp., <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Autographa gamma</i> • 0,25 L/ha <u>HREAN, RUBARBĂ, PĂSTĂRNAC, RIDICHII, SCORTONERA (CULTIVATE PENTRU RĂDĂCINI):</u> <i>Pieris brassicae</i>, <i>Autographa gamma</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Phyllotreta nemorum</i>, <i>Phyllotreta undulata</i>, <i>Phyllotreta atra</i>, <i>Phyllotreta nigripes</i>, <i>Phyllotreta</i> sp., Afide (<i>Aphis</i> sp.) • 0,25 L/ha <u>NAP SUEDEZ, NAPI:</u> <i>Pieris brassicae</i>, <i>Autographa gamma</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Phyllotreta</i> sp., Afide (<i>Aphis</i> sp.) • 0,25 L/ha <u>CICOARE DE RĂDĂCINĂ:</u> <i>Autographa gamma</i>, <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, Afide (<i>Aphis</i> sp.) • 0,25 L/ha <u>PLANTE ORNAMENTALE:</u> Afide (<i>Aphis</i> sp.), <i>Coleophora laricella</i> • 0,2 L/ha <u>MOSMON:</u> Afide (<i>Aphis</i> sp.) • 0,2 L/ha <u>MĂR PĂDURET, GUTUI:</u> <i>Aphis pomi</i>, <i>Dysaphys plantaginea</i>, Afide (<i>Aphis</i> sp.), <i>Cydia pomonella</i> • 0,2 L/ha <u>PĂR ASIATIC:</u> <i>Aphis pomi</i>, <i>Dysaphys plantaginea</i> • 0,125 L/ha - 0,2 L/ha <u>LUPIN ALB, LUPIN GALBEN:</u> <i>Bruchus pisorum</i>, <i>Sitona lineatus</i>, Afide (<i>Aphis</i> sp.), <i>Thrips tabaci</i>, <i>Lygus</i> sp., <i>Cydia nigricana</i> • 0,2 L/ha <u>BOB, FASOLE VERDE, LINTE:</u> <i>Delia platura</i>, <i>Delia florilega</i>, <i>Bruchus pisorum</i>, Afide (<i>Aphis</i> sp.), <i>Myzus persicae</i>, etc.) • 0,2 L/ha <u>MAZĂRE FURAJERĂ:</u> <i>Bruchus pisorum</i>, <i>Delia platura</i>, <i>Delia florilega</i>, <i>Kakothrips robustus</i>, <i>Thrips tabaci</i>, Afide (<i>Aphis fabae</i>, <i>Myzus persicae</i>) • 0,2 L/ha
--	--	--	--

				RĂCHITĂ ROȘIE PENTRU IMPLETITURI: <i>Afide (Aphis fabae, Myzus persicae, etc.), Chrisomela populi, Phratora/Phytodecta sp.)</i> • 0,2 L/ha (2 tratamente)	
2.	ELATUS PLUS/ (VANOSTA- a doua denumire comercială) 100 g/L benzovindiflupir	Syngenta Agro SRL, România CO: 343PC/29.11.2017	SMRZ: ROMÂNIA	SECARĂ: <i>Septoria sp.</i> • 0,5 - 0,75 L/ha Se aplică maxim 1 tratament de la primul internod până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-69).	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ

B. APROBAREA CELEI DE - A DOUA DENUMIRI COMERCIALE

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALĂ	A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ	NR. CERTIFICAT DE OMOLOGARE/ DATA	DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII
1.	VextaDim 240 EC	GRASP OLEO+	471PC/15.11.2018	Vextachem Srl, Italia
2.	IMPRUS	IMPROXO	1077PC/16.06.2025	Albaugh TKI d.o.o, Slovenia
3.	BLUSKY 500 WG	BOUDHA	798PC/23.08.2022	Albaugh TKI d.o.o, Slovenia
4.	BRIXTON	GRASIDIM	868PC/28.09.2023	Sipcam Oxon SpA, Italia
5.	MOSPILAN MIZU	MOSPILAN SUPER	857PC/25.04.2023	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, GERMANIA
6.	SCOTIA	ZIPAK	1085PC/16.06.2025	UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda
7.	INCELO 172,5 WG	ATEVIOR	726PC/07.12.2021	BAYER SRL, România
8.	DECIS EXPERT 100 EC	NUYARD	123PC/22.07.2015	BAYER SRL, România
9.	METODUS 650WG	UNDITO 650WG	1093PC/16.06.2025	INNVIGO Sp. z.o.o., Polonia
10.	ETIUDA 250EC	FERMATA 25EC	1012PC/07.11.2024	INNVIGO Sp. z.o.o., Polonia
11.	AMPLIGO	CAREXO	186PC/03.06.2016	Syngenta Agro SRL, România
12.	Clinic Xtreme 540 SL	URAGANE	947PC/ 07.03.2024	Nufarm Polska Sp.z.o.o., Polonia
13.	OBELISK	CURRENT	967PC/25.04.2024	Ascenza Agro S.A., Portugalia
14.	FOUNTAIN 5 SC	ACORD 5 SC	980PC/07.11.2024	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
15.	AZUBA	AZOXIPRO 250 SC	876PC/28.09.2023	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
16.	PROTOS 25 EC	KOLERON 250 EC	647PC/24.11.2020	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
17.	ASSET	TURENIX SG	1096PC/16.06.2025	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
18.	CLOWN 600 SC	SEGMENTUM	949PC/07.03.2024	Sharda Cropchem Espana SL, Spania
19.	FELOMINA	PRETHCOT	986PC/07.11.2024	Rainbow Agrosociences Europe S.A.U., Spania
20.	BROKPAK	STEMBOLK	968PC/19.07.2024	Rainbow Agrosociences Europe S.A.U., Spania
21.	AFUPET XTRA	SWIFT	999PC/07.11.2024	Rainbow Agrosociences Europe S.A.U., Spania
22.	METONARY	STALLONE	1039PC/17.03.2025	Rainbow Agrosociences Europe S.A.U., Spania
23.	CONSPICUO	ROGILITY	990PC/07.11.2024	Rainbow Agrosociences Europe S.A.U., Spania



24.	ROMBLE	WITHABLE	988PC/07.11.2024	Rainbow Agrosciences Europe S.A.U., Spania
25.	RAMESTON	DICOSUN IMX	1037PC/17.03.2025	Rainbow Agrosciences Co., Ltd., Irlanda
26.	OBTEMIL	ERBISTAR SEL	977PC/07.11.2024	Rainbow Agrosciences Co., Ltd., Irlanda
27.	BOSKET	SAGARIS 50WG	1057PC/17.03.2025	Rainbow Agrosciences Co., Ltd., Irlanda
28.	ITAPLE 306 SE	DICOTON PLUS	1091PC/ 16.06.2025	Rainbow Agrosciences Co., Ltd., Irlanda

C. APROBAREA PERMISELOR DE COMERT PARALEL CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT	NR. PERMIS DE COMERT PARALEL (PCP)	CULTURI	AGENȚI DE DĂUNARE	DOZA DE APLICARE
1.	FARIK 240 g/L tau-fluvalinat	S.C. AGROVENA S.R.L.	PCP NR. 45/02.12.2025	RAPIȚĂ	<i>Brevicorine brassicae</i> <i>Melighethes aenneus</i> <i>Athalia rosae</i> <i>Ceutorrhynchus napi</i>	0,2 L/ha
				ORZ	<i>Afide (Macrosiphum avenae,</i> <i>Rhapalosiphum maidis,</i> <i>Rhapalosiphum padi,</i> <i>Schizaphis graminum)</i>	0,2 L/ha
				GRÂU	<i>Eurygaster integriceps</i>	0,2 L/ha
				CĂPȘUN	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apă)
				CARTOF	<i>Leptinotarsa ecemlineata</i> <i>Aphis spp.</i>	0,2 L/ha
				CASTRAVEȚI SOLARII	<i>Cerosipha gossypii</i>	0,05%
				VARZĂ	<i>Brevicorine brassicae</i> <i>Mamestra brassicae</i>	0,05%
				CEAPĂ	<i>Trips tabaci</i>	0,05%
				TOMATE CÂMP	<i>Helicoverpa armigera</i> <i>Macrosiphon euphorbiae</i>	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apă)
				PLANTE ORNAMENTALE (DIN SPAȚII DESCHISE: PARCURI, SERE ȘI SOLARII)	<i>Trips spp.</i>	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apă)



				PLANTE ORNAMENTALE (MATERIAL SĂDITOR) DIN CULTURI DE SERĂ	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0,04% (0,4 L/ha în 1000 L apă)
				PLANTAȚII DE MĂR ȘI PEPINIERE	<i>Aphis pomi</i> <i>Eriosoma lanigerum</i>	0,05% (0,75 L/ha în 1500 L apă)
				PLANTAȚII DE PRUN	<i>Hyalopterus pruni</i>	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apă)
				LIVEZI DE PIERȘIC	<i>Mysodes persicae</i>	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apă)
				FLOAREA SOARELUI	<i>Afide</i> (<i>Aphis fabae</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i>)	0,2 L/ha
2.	VALMEC PLUS 18 g/L abamectin	S.C. NETagro S.R.L.	PCP NR. 46/02.12.2025	TOMATE ÎN SERĂ	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Aculus lycopersici</i>	0,15 L/ha - 1,0 L/ha (50 mL/hL - 100 mL/hL) Se aplică la apariția primelor forme mobile.
					<i>Liriomyza trifolii</i>	0,15 L/ha - 1,0 L/ha (50 mL/hL - 100 mL/hL) Se aplică înaintea clozării primelor ouă.
				VINETE (SERĂ)	<i>Tetranychus urticae</i>	0,15 L/ha - 0,8 L/ha (50 mL/hL - 80 mL/hL) Se aplică la apariția primelor forme mobile.
				PEPENI GALBENI, PEPENI VERZI, DOVLEAC (SERĂ)	<i>Tetranychus urticae</i>	0,15 L/ha - 1,0 L/ha (50 mL/hL - 100 mL/hL) Se aplică la apariția primelor forme mobile.
					<i>Liriomyza trifolii</i>	0,15 L/ha - 1,0 L/ha (50 mL/hL - 100 mL/hL) Se aplică înaintea eclozării primelor ouă.
					<i>Tetranychus urticae</i>	0,15 L/ha - 1,0 L/ha (50 mL/hL - 100 mL/hL) Se aplică la apariția primelor forme mobile.



7. Regulamentul (UE) 2025/1212 al Comisiei din 24 iunie 2025 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acetamiprid din sau de pe anumite produse;
8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1879 al Comisiei din 16 septembrie 2025 de reînnoire a aprobării uleiului de rapiță ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2027 al Comisiei din 9 octombrie 2025 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește perioada de aprobare a substanței active pentiopirad;
10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2068 al Comisiei din 15 octombrie 2025 de reînnoire a aprobării substanței active milbemectină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
11. Rectificare la Regulamentul (UE) 2025/146 al Comisiei din 29 ianuarie 2025 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de zoxamid din sau de pe anumite produse;
12. Regulamentul (UE) 2025/2274 al Comisiei din 12 noiembrie 2025 de modificare a Regulamentului (UE) 2024/1487 în ceea ce privește adoptarea programului de lucru pentru revizuirea treptată a agenților fitoprotectori și a agenților sinergici;
13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2272 al Comisiei din 12 noiembrie 2025 de reînnoire a aprobării substanței active gibereline ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2313 al Comisiei din 17 noiembrie 2025 de reînnoire a aprobării substanței active acid giberelic ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;
15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2316 al Comisiei din 17 noiembrie 2025 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active silicat de aluminiu, difenoconazol, diflufenican, fosfonat de disodiu, extract din arbore de ceai, flurocloridonă, acid indolil butiric, maltodextrină, fosfan, uleiuri vegetale/ulei de cuișoare, uleiuri vegetale/ulei de mentă verde, fosfonați de potasiu și triclopir.

3. DIVERSE

1. CNOPPP a respins solicitarea **El Pinar Agricultura SRL** privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru utilizarea produselor **TELONE II** (1,3-dicloropropenă), ca insecticid/ nematocid, precum și a produsului **TRIPICRIN** (cloropicrină), ca fungicid, pentru tratarea solului înainte de plantarea culturii de căpsun.
2. CNOPPP a aprobat solicitarea **BRAICOOP COOPERATIVA AGRICOLĂ** privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru utilizarea produsului de protecție a plantelor **SOLYSTRA** (50 g/L methyl anthranilate) în tratarea semințelor de porumb, având rol de repelent împotriva păsărilor granivore *Corvus frugilegus*.
3. CNOPPP a respins solicitarea **Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR)** privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009 pentru utilizarea produsului de protecție a plantelor **NERMADY** (0,0375 g/kg



pherolit®-d (8-metildecen-2-il propanoat)), ca insecticid tip feromon pentru controlul *Diabrotica virgifera virgifera* la cultura de porumb.

4. CNOPPP a aprobat solicitarea **Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR)** privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru utilizarea produsului de protecție a plantelor **SCENIC GOLD 350 FS** (certificat de omologare nr. 516PC/ 12.07.2019) la tratarea semințelor de floarea - soarelui pentru controlul putrezirii plăntuțelor (*Pythium sp.*), a fuzariozei (*Fusarium sp.*) și a manei (*Plasmopara halstedii*).

5. CNOPPP a respins solicitarea **Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR)** privind acordarea unei autorizații de urgență în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru tratarea semințelor de porumb și porumb dulce cu produsul **IBISIO** (400 g/L oleorășină de piper negru), având rol de repelent împotriva păsărilor granivore *Corvus frugilegus*.

6. CNOPPP a aprobat solicitarea **Sipcam Oxon SpA, Italia**, privind modificarea dozei produsului de protecție a plantelor **ARTEMIDE** (certificat de omologare nr. 757PC/24.03.2022), de la 90 mL/25000 seminte (3,6 mL/1000 seminte) la intervalul de **25 - 50 mL/ 25000 seminte (1-2 mL/1000 seminte)** pentru tratament samântă **porumb** pentru combaterea *Agriotes* spp. și *Diabrotica virgifera virgifera*, respectiv de la 270 mL/75 000 seminte (3,6 mL/1000 seminte) la intervalul de **75 - 150 mL/75000 seminte (1-2 mL/1000 seminte)** și de la 235 mL/65000 seminte (3,6 mL/1000 seminte) la intervalul de **65-130 mL/65000 seminte (1-2 mL/1000 seminte)** pentru tratament samântă **floarea – soarelui** pentru combaterea *Agriotes* spp.

7. CNOPPP a respins solicitarea **GALENKA FITOFARMACIJA d.o.o., SLOVENIA**, privind reexaminarea dosarului biologic al produsului de protecție a plantelor **BONACA** (certificat de omologare nr. 528PC/12.07.2019) în vederea aprobării extinderii la cultura de porumb.

8. Ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1092 al Comisiei din 2 iunie 2025 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în vederea **actualizării listei substanțelor active aprobate sau considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului**, certificatele de omologare ale produselor de protecție a plantelor **SONATA** (certificat de omologare nr. 550PC/ 20.11.2019) și **PROLECTUS** (certificat de omologare nr. 052PC/ 29.09.2014) se retrag cu data de **02.12.2025, fără acordarea unei perioade de grație**.

9. Ca urmare a nesustențării, conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, a produsului de protecție a plantelor **LS MEPI PLUS**, de către deținătorul omologării, certificatul de omologare nr. 983PC/ 07.11.2024 se retrage de la data de **01.03.2026**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o **perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.09.2026)**, la care se adaugă o **perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de 01.09.2027)**.

10. CNOPPP a retras omologarea produsului de protecție a plantelor **TESSIOR** (certificat de omologare nr. 634PC/ 24.11.2020) cu data de **02.12.2025, fără acordarea unei perioade de grație**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.

11. CNOPPP a retras omologarea produsului de protecție a plantelor **STROBY DF** (certificat de omologare nr. 1807/ 04.12.1997) cu data de **02.12.2025, fără acordarea unei perioade de grație**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.

12. CNOPPP a retras omologarea produsului de protecție a plantelor **BRIVELA** (certificat de omologare nr. 673PC/ 22.04.2021) cu data de **02.12.2025, fără acordarea unei perioade de grație**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF AGRO BV, Arnhem (NL), Freienbach Branch, Elvetia**.



13. CNOPPP a retras omologarea produsului de protecție a plantelor **BUTISAN 400 SC** (certificat de omologare nr. 2076/ 02.11.2000) cu data de **02.12.2025**, fără acordarea unei perioade de grație, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.

14. CNOPPP a retras omologarea produsului de protecție a plantelor **PULSAR START** (certificat de omologare nr. 843PC/ 25.04.2023) cu data de **02.12.2025**, fără acordarea unei perioade de grație, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF AGRO BV, PUERTO RICO**.

15. Ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **Sharda Cropchem Espana SL, Spania**, CNOPPP a retras omologarea produsului de protecție a plantelor **BENTA 480 SL/ (BASICO 480 SL - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 103PC/ 21.01.2015) cu data de **02.12.2025**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **02.06.2026**), la care se adaugă o perioadă de grație de 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de **02.12.2026**).

16. Ca urmare a nesustențării substanței active **pentiopirad**, de către notificator, în cadrul procesului de reînnoire a aprobării la nivelul CE, pentru produsul de protecție a plantelor **Fontelis**, certificatul de omologare nr. 2866/ 14.12.2012 se retrage de la data de **31.10.2025**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **30.04.2026**), la care se adaugă o perioadă de grație de 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de **31.10.2026**).

17. CNOPPP a retras a doua denumire comercială (**KEFER**) a produsului de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **CYCLO-R LIQUIDO** (certificat de omologare nr. 305PC/ 10.04.2017), ca urmare a solicitării companiei **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia**.

18. CNOPPP a retras a doua denumire comercială (**SAGARIS**) a produsului de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **ROYALTY 50 WG** (certificat de omologare nr. 609PC/ 30.06.2020), ca urmare a solicitării companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania**.

19. CNOPPP a luat nota de notificările companiilor și a stabilit că vor fi respectate prevederile **REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2023/707 AL COMISIEI** din 19 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 în ceea ce privește clasele de pericol și criteriile pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, respectiv **produsele de protecție a plantelor existente pe piață trebuie să fie reclasificate până în 2028, astfel că deținătorii de omologare pot folosi vechea etichetă în perioada 2026 - 2028**.

20. CNOPPP a luat nota de solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind retragerea documentației depuse la ANF pentru extinderea omologării produsului de protecție a plantelor **ELATUS ERA/(APROVIA - a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 342PC/ 29.11.2017).

21. CNOPPP a respins solicitarea companiei **SUMMIT AGRO ROMANIA SRL**, privind aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2025/158 al Comisiei din 29 ianuarie 2025 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acetamiprid din sau de pe anumite produse, pentru stocurile existente de produse.

22. CNOPPP a aprobat solicitarea **Bird & Bird, Belgia**, privind acordarea unei perioade de grație conform art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pentru stocurile de produse și etichetele vechi, ca urmare a transferului de la deținătorul de omologare actual **HELM AG, Germania** către noul deținător de omologare **CAC CHEMICAL GmbH, Germania**, respectiv se acordă o perioadă de grație de 6 luni de la data sedinței (până la data de **02.06.2026**).



23. CNOPPP a luat nota de solicitarea companiei **Sharda Cropchem Espana SL, Spania**, privind prelungirea certificatului de omologare al produsului de protecție a plantelor **AZA 10 EC** (certificat de omologare nr. 943PC/ 07.03.2024), omologat prin procedura de recunoaștere reciprocă și a decis să nu se mai prelungească certificatul de omologare din momentul în care acesta a expirat, deoarece statul membru de referință Polonia, a retras autorizația;

24. CNOPPP a luat nota de solicitarea companiei **Chromosome Dynamics SA**, privind omologarea în România a anumitor produse ce conțin substanțe active de tip low-risk și a precizat faptul că omologarea produselor de protecție a plantelor se face conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, iar aprobarea produselor folosite în agricultura ecologică, nu intră în competența CNOPPP.

25. CNOPPP a aprobat **certificarea/recertificarea** laboratoarelor de bune practici experimentale (BPE) pentru institutele/companiile **Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Pitești, S.C. Eurofins Agroscience Services S.R.L., Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București - Laboratorul de Testare Biologică și Evaluare a Eficacității Produselor Fitosanitare, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni și S.C. STAPHYT S.R.L..**

3a. SCHIMBĂRI DE DENUMIRI COMERCIALE

26. CNOPPP a aprobat schimbarea celei de - a doua denumiri comerciale **TERCERO**, a produsului **FLAME DUO 354 SG** (certificat de omologare nr. 944PC/07.03.2024), în **BIATHLON FLEX**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia**.

27. CNOPPP a aprobat schimbarea celei de - a doua denumiri comerciale **PROCER XTRA**, a produsului **PROMINO XTRA** (certificat de omologare nr. 904PC/07.03.2024), în **AMISTAR Era 240 EC**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **CAC Chemical GmbH, Germania**.

28. CNOPPP a aprobat schimbarea celei de - a doua denumiri comerciale **LISTEGO PLUS**, a produsului **PULSAR PLUS** (certificat de omologare nr. 282PC/28.02.2017), în **FASTICO PLUS**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.

29. CNOPPP a aprobat schimbarea celei de - a doua denumiri comerciale **AFRASA 360**, a produsului **SATELITE** (certificat de omologare nr. 135PC/22.07.2015), în **DOMINATOR EXTRA**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia**.

30. CNOPPP a aprobat schimbarea denumirii comerciale a produsului **PULSAR PLUS** (certificat de omologare nr. 282PC/28.02.2017) în **PASSAT PLUS**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.

3b. SCRISORI DE REPREZENTARE

31. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **CROPTECH SRL**, privind desemnarea companiei **SC ATOZ STYLE SRL, România**, prin doamna **Andreea Irina ION ZAMFIRESCU**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

32. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **ORO AGRI EUROPE S.A., Portugalia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

33. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **SML France**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a două produse de protecție a plantelor.

34. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **SAN Agrow Holding GmbH, Austria**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.



- 35.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Lallemand Finland Oy**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a unui produs de protecție a plantelor.
- 36.CNOPPP a luat notă de informările companiei **Syngenta Agro SRL, România**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a trei produse de protecție a plantelor.
- 37.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc, Japonia**, privind desemnarea domnului **Marc Pascal HUOT**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.
- 38.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irlanda**, înregistrată la ANF cu nr. 10885/21.07.2025, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.
- 39.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Polonia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a trei produse de protecție a plantelor.
- 40.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **2022 Environmental Science FR SAS**, privind desemnarea companiei **ERM Ltd, Regatul Unit (Environmental Resources Management Limited)**, precum și birourile sale afiliate, prin doamnele **Rusalina LUPU, Iulia IVAN și Nora GOGONCEA**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.
- 41.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Agronaturalis Ltd, Anglia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare pentru produsul de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **KARBICURE/ (IDEUS - a doua denumire comercială)**, conform certificatului de omologare nr. 600PC/ 30.06.2020.
- 42.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Caf KARYON S.L., Spania**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.
- 43.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irlanda**, privind desemnarea companiei **AGRICONNECT SRL, România**, prin doamna **Zamfira IOSIF**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a unui produs de protecție a plantelor, precum și pentru produsul de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **KINVARA/(ARRVA - a doua denumire comercială)**, conform certificatului de omologare nr. 560PC/20.11.2019.
- 44.CNOPPP a luat notă de informările companiei **Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irlanda**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare pentru produsul de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **VALENTIA**, (certificat de omologare nr. 680PC/22.04.2021 și pentru încă două produse de protecție a plantelor aflate în curs de omologare.
- 45.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **TAMINCO BV, Belgia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare pentru produsul de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **NEMASOL 510**, conform certificatului de omologare nr. 2275/27.05.2004.

46.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **W. Neudorff GmbH KG, Germania**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare pentru produsul de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **SPRUZIT**, conform certificatului de omologare nr. 657PC/24.11.2020.

47.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Sigrun Agriculture OU, Estonia**, privind desemnarea companiei **SC ATOZ STYLE SRL, România**, prin doamna **Andreea Irina ION ZAMFIRESCU**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

48.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **One Agriculture S.r.l., Belgia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a unui produs de protecție a plantelor.

49.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Max (Rudong) Chemicals Co., Ltd.**, privind desemnarea companiei **SC ATOZ STYLE SRL, România**, prin doamna **Andreea Irina ION ZAMFIRESCU**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

50.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Probelte S.A.U., Spania**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare pentru produsul de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **BELTANOL**, conform certificatului de omologare nr. 257PC/19.12.2016.

51.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **S.C. NETAGRO S.R.L.**, privind desemnarea companiei **NITA-DRAGOMIR Margarint P.F.A.**, prin domnul **Mărgărint NIȚĂ-DRAGOMIR**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de obținere a unui permis de comerț paralel.

52.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **AGRIA S.A., Bulgaria**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în ceea ce privește notificarea unei surse adiționale de substanță activă pentru produsele de protecție a plantelor omologate în România cu denumirea comercială **NASA/ (ZENEST - a doua denumire comercială)**, conform certificatului de omologare nr. 368PC/29.11.2017.

53.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd., Bulgaria**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române pentru notificarea unei surse adiționale de substanță activă pentru produsele de protecție a plantelor omologate în România cu denumirea comercială **NASA MAX/ (GLYKING - a doua denumire comercială)**, conform certificatului de omologare nr. 738PC/07.12.2021.

54.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irlanda**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în vederea prelungirii administrative a certificatelor de omologare ale produselor de protecție a plantelor omologate în România cu denumirea comercială **HUDSON/(ARBITER - a doua denumire comercială)** (certificatul de omologare nr. 039PC/ 27.02.2014) și **GALISTOP** (certificatul de omologare nr. 1015PC/07.11.2024).

55.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Quimica de Mungia S.A., Spania**, privind desemnarea companiei **NITA-DRAGOMIR Margarint P.F.A.**, prin domnul **Mărgărint NIȚĂ-DRAGOMIR**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.



56.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Evergreen Garden Care Poland Sp. z.o.o., Polonia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în vederea prelungirii administrative a certificatelor de omologare ale produselor de protecție a plantelor omologate în România cu denumirea comercială **POLYSECT NATURAL** (certificatul de omologare nr. 888PC/28.09.2023), **ANTIBURUIENI** (certificatul de omologare nr. 801PC/23.08.2022) și **ANTIBURUIENI FORTE** (certificatul de omologare nr. 802PC/23.08.2022).

57.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Doff Portland Limited**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare pentru produsul de protecție a plantelor omologat în România cu denumirea comercială **Bio Plantella Arion împotriva melcilor**, conform certificatului de omologare nr. 1074PC/17.03.2025.

58.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **CLAYTON PLANT PROTECTION LTD, IRLANDA**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a unui produs de protecție a plantelor.

59.CNOPPP a luat notă de informarea companiei **CAC Chemical GmbH, Germania**, privind desemnarea companiei **ANTARIPA PPP S.R.L.**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare pentru următoarele produse de protecție a plantelor omologate în România:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare
1.	RIMURON 25 WG/(ZEPELIN - a doua denumire comercială)	628PC/30.06.2020
2.	HELMSTAR 75 WG/(TRIMEO - a doua denumire comercială)	2596/14.12.2005
3.	SIMBA/(FALSTAR - a doua denumire comercială)	334PC/28.08.2017
4.	DIGATOR/(GHEPARD FORTE - a doua denumire comercială)	664PC/24.11.2020
5.	ALTIVATE	953PC/07.03.2024

60. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Adama Agricultural Solutions S.R.L., România**, privind desemnarea domnului **Nicușor-Viorel NĂSTASE**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

61. CNOPPP a luat notă de informarea companiei **Nufarm România SRL**, privind desemnarea domnului **Silviu CAIMAC**, pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor.

3c. NOTIFICĂRI TRANSFER PRODUSE

62. La solicitarea companiei **HELM AG, GERMANIA**, următoarele produse de protecție a plantelor, vor fi transferate de la deținătorul de omologare actual **HELM AG, Germania** către noul deținător de omologare **CAC CHEMICAL GmbH, Germania**:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare
1.	RIMURON 25 WG/(ZEPELIN - a doua denumire comercială)	628PC/30.06.2020
2.	HELMSTAR 75 WG/(TRIMEO - a doua denumire comercială)	2596/14.12.2005



3.	SIMBA/(FALSTAR - a doua denumire comercială)	334PC/28.08.2017
4.	DIGATOR/(GHEPARD FORTE - a doua denumire comercială)	664PC/24.11.2020
5.	ALTIVATE	953PC/07.03.2024

63. La solicitarea companiei **FMC**, ca urmare a schimbării denumirii entității legale în Europa, următoarele produse de protecție a plantelor, vor fi transferate de la deținătorul/producătorul actual după caz, **FMC International Switzerland Sarl (FISSA)**, către noul deținător/producător **FMC IP Technology LLC, Vernier Branch (FIT-V)**:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare	Detinător de omologare	Producător
1.	BENEVIA	501PC/14.03.2019	FMC Agro Operational Romania	FMC International, Switzerland Sarl
2.	CORAGEN/(VOLIAM - a doua denumire comercială)	2724/25.10.2007	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
3.	EVORELLE EXPRESS	506PC/14.03.2019	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
4.	EXIREL/(IRAZU - a doua denumire comercială)	686PC/22.04.2021	FMC Agro Operational Romania	FMC International, Switzerland Sarl
5.	EXPRESS 50 SG/(FLUENCE - a doua denumire comercială)	2603/14.12.2004	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
6.	GRANSTAR SUPER 50 SG/(CAMEO MAX - a doua denumire comercială)	2674/19.12.2006	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
7.	HARMONY 50 SG	2602/14.12.2005	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
8.	LAREN PRO 20 SG	2604/14.12.2005	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
9.	OMNERA/(PROVALIA - a doua denumire comercială)	335PC/28.08.2017	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
10.	SETRALLAS/(AMPATO - a doua denumire comercială)	912PC/07.03.2024	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
11.	SHENZI 200 SC/(SUVISIO - a doua denumire comercială)	839PC/25.04.2023	FMC Agro Operational Romania	FMC International, Switzerland Sarl
12.	TRIPALI/(CELEXIUM - a doua denumire comercială)	181PC/16.03.2016	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl



13.	VENZAR 500SC	2777/27.03.2008	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl
14.	VERIMARK	404PC/28.02.2018	FMC International, Switzerland Sarl	FMC International, Switzerland Sarl

64. La solicitarea companiei **BASF**, ca urmare a schimbării denumirii companiei, următoarele produse de protecție a plantelor, vor fi transferate de la deținătorul/producătorul actual după caz, **BASF Corporation**, către noul deținător/producător **BASF Agricultural Solutions US LLC**:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare	Deținător de omologare	Producător
1.	AKRIS	2742/19.12.2007	BASF SE, GERMANIA	BASF Corporation, USA
2.	BUTISAN AVANT	176PC/16.03.2016	BASF Corporation USA	BASF Corporation, USA
3.	BUTISAN DUO	172PC/16.03.2016	BASF Corporation USA	BASF Corporation, USA
4.	INTEGRAL PRO	437PC/15.11.2018	BASF SE, GERMANIA	BASF Corporation, USA
5.	SERIFEL	853PC/25.04.2023	BASF SE, Germania	BASF Corporation, USA
6.	WING P	021PC/11.07.2013	BASF SE, GERMANIA	BASF Corporation Crop Protection, SUA

65. La solicitarea companiei **Novozymes France SAS, Franța**, produsul de protecție a plantelor **TAEGRO** (certificat de omologare nr. 584PC/03.02.2020), va fi transferat de la deținătorul actual **Novozymes France SAS, Franța**, către noul deținător **Novonesis Plant Biosolutions A/S, Danemarca**.

3d. NOTIFICĂRI LOCAȚII DE FORMULARE

66. CNOPPP a aprobat trei noi locații de formulare pentru produsul **TOPREX** (certificatul de omologare nr. 040PC/ 27.02.2014).

67. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **AXIAL 050 EC** (certificatul de omologare nr. 2748/19.12.2007).

68. CNOPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsele **KARATE ZEON/(NINJA - a doua denumire comercială)** (certificatul de omologare nr. 1812/04.12.1997).

69. CNOPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsele **DIVIDEND M 030 FS/(SISTEMIO - a doua denumire comercială)** (certificatul de omologare nr. 1761/12.11.1996).

70. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **Clinic Xtreme 540 SL** (certificat de omologare nr. 947PC/07.03.2024).

71. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **KYLEO** (certificat de omologare nr. 862PC/25.04.2023).

72. CNOPPP a aprobat douăsprezece noi locații de formulare pentru produsele **PROXANIL/(COMBI DUO FORTE - a doua denumire comercială)** (certificatul de omologare nr. 423PC/05.06.2018).

73. CNOPPP a aprobat șase noi locații de formulare pentru produsul **SYLLIT 400 SC** (certificatul de omologare nr. 2154/11.10.2002).

74. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **DINOZYL** (certificatul de omologare nr. 991PC/07.11.2024).

75. CNOPPP a aprobat douăsprezece noi locații de formulare pentru produsele **SIGNAL 300 ES/(LANGIS - a doua denumire comercială)** (certificatul de omologare nr. 2198/ 27.03.2003).

76. CNOPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsele **SELECT SUPER/(CENTURION PLUS - a doua denumire comercială)**(certificatul de omologare nr. 1817/ 29.01.1998).



77. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **CHAMANE/ (AFFIX 250 SC** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 357PC/29.11.2017).
78. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **BISCONE** (certificatul de omologare nr. 989PC/ 07.11.2024).
79. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **SOCIETY** (certificatul de omologare nr.925PC/07.03.2024).
80. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **PROPIDIN ONE/ (SAGARIS PRO** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 931PC/07.03.2024).
81. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **ROYALTY 50 WG/ (SAGARIS** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 609PC/30.06.2020).
82. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **KARBICURE/ (IDEUS** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 600PC/30.06.2020).
83. CNOPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsele **APACHE/ (VERTAB** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 324PC/ 29.06.2017).
84. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **KALTOR/ (KINGSLEY** - doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 561PC/ 20.11.2019).
85. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **ROUBAIX/ (ZINGARO** - a doua denumire comercială) (certificatul de omologare nr. 879PC/28.09.2023).
86. CNOPPP a aprobat trei noi locații de formulare pentru produsul **IMPRUS** (certificatul de omologare nr. 1077PC/16.06.2025).
87. CNOPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **SPYRALE** (certificatul de omologare nr. 611PC/30.06.2020).
88. CNOPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsul **AZOXYCARE** (certificatul de omologare nr. 1049PC/17.03.2025).
89. CNOPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsul **PROTEB** (certificatul de omologare nr. 1056PC/17.03.2025).
90. CNOPPP a aprobat schimbarea denumirii locației de formulare **Syngenta Crop Protection Monthey SA** în **Syngenta Crop Protection AG** pentru toate produsele omologate în România.

3e.MODIFICĂRI MAJORE

91. CNOPPP a aprobat modificarea majoră în compoziția produselor **MAVRIK 2 F/(EVURE** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2126/ 18.12.2001).
92. CNOPPP a aprobat modificarea majoră în compoziția produselor **BARISTO 500 SC/ (INVENTOR 500 SC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 474PC/ 15.11.2018).
93. CNOPPP a aprobat modificarea majoră în compoziția produselor **ZOXIS 250 SC/ (NORIOS 250 SC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 562PC/ 20.11.2019);
94. CNOPPP a aprobat modificarea majoră în compoziția produsului **VERIMARK** (certificat de omologare nr. 404PC/ 28.02.2018).

3f. MODIFICĂRI MINORE:

- 95.CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **DAVAI/(SALTUS 80 SL** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.796PC/ 23.08.2022).
- 96.CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **WING P** (certificat de omologare nr. 021PC/ 11.07.2013).
- 97.CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **INFINITO 687,5 SC** (certificat de omologare nr. 2698/ 19.04.2007) și **INCELO 172,5 WG** (certificat de omologare nr. 726PC/07.12.2021).
- 98.CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **BRIVELA** (certificat de omologare nr. 673PC/ 22.04.2021).



99. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **DAGONIS** (certificat de omologare nr.438PC/15.11.2018).
100. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor de protecție a plantelor **MILDICUT/(YSAYO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2515/ 22.02.2005).
101. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **ELATUS ERA / (APROVIA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 342PC/ 29.11.2017) și **ELATUS PLUS/(VANOSTA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 343PC/29.11.2017).
102. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **PROXANIL/(COMBI DUO FORTE** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 423PC/05.06.2018) și **SELECT SUPER/(CENTURION PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.1817/29.01.1998).
103. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **REGALIS PLUS** (certificat de omologare nr. 417PC/ 28.02.2018).
104. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **AXIAL ONE/DUOZYM** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 040PC/ 27.02.2014).
105. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **VALENTIA** (certificat de omologare nr. 680PC/ 22.04.2021).
106. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **APIS 200 SE/(ACEPTIR 200 SE** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 405PC/28.02.2018) și **LOS OVADOS 200 SE/(BIATOX 200SE** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 794PC/23.08.2022).
107. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **CLARO 375 SC/(KIER PRO 375 SC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 898PC/17.11.2023) și **FLUTRIX 050 FS** (certificat de omologare nr.727PC/07.12.2021).
108. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **KARBICURE/(IDEUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 600PC/30.06.2020).
109. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **SARACEN/(FRAGMA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.132PC/ 22.07.2015).
110. CNOPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **APACHE/(VERTAB** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.324PC/29.06.2017).
111. CNOPPP a aprobat o modificare compoziție chimică a produselor **METAX 500 SC/(MEZOTOP 500 SC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 311PC/10.04.2017).

3g. SURSE DE SUBSTANȚE ACTIVE:

112. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produselor **ELATUS ERA/ (APROVIA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 342PC/ 29.11.2017).
113. CNOPPP a aprobat trei surse adiționale pentru substanța activă **ditianon** aflată în compoziția produselor **ASTRON 350 SE** (certificat de omologare nr. 603PC/30.06.2020).
114. CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **ditianon** aflată în compoziția produsului **DINOZYL** (certificat de omologare nr. 991PC/07.11.2024).
115. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produsului **QUEEN** (certificat de omologare nr. 970PC/07.11.2024).
116. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produsului **LS - AZOXY** (certificat de omologare nr. 745PC/24.03.2022).
117. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **trinexapac-etil** aflată în compoziția produselor **MODDUS 250 EC** (certificat de omologare nr. 2532 / 22.02.2005) și **MODDUS EVO** (certificat de omologare nr. 192PC/ 03.06.2016).



118. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **teflutrin** aflată în compoziția produselor **SOILGUARD 0,5 GR** (certificat de omologare nr. 687PC/22.04.2021), **SOILGUARD 1,5 GR/ (VIERMOCID 1,5 GR** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 615PC/30.06.2020) și **THRINTOBA 20 CS/ (IBRIDITRIN 20 CS**-a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 809PC/07.12.2022).
119. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **glifosat** aflată în compoziția produselor **Clinic Xtreme 540 SL**(certificat de omologare nr. 947PC/07.03.2024) și **KYLEO** (certificat de omologare nr. 862PC/25.04.2023).
120. CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **trinexapac-etil**, aflată în compoziția produsului **MOMOS 250EC** (certificat de omologare nr. 816PC/07.12.2022).
121. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **acid pelargonic** aflată în compoziția produselor **ANTIBURUIENI**(certificat de omologare nr. 801PC/ 23.08.2022), și **ANTIBURUIENI FORTE** (certificat de omologare nr. 802PC/ 23.08.2022).
122. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **rimsulfuron** aflată în compoziția produselor **ARIGO/(COLOMBUS**-a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 031PC/17.12.2013), **BASIS FORTE** (certificat de omologare nr. 973PC/07.11.2024), **PRINCIPAL/ (CORDUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2819/18.12.2008), **PRINCIPAL FORTE** (certificat de omologare nr. 811PC/07.12.2022), **PRINCIPAL PLUS/ (CORDUS PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 038PC/ 27.02.2014), **TITUS 25 DF/ (TAROT**- a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 1312/12.11.1991) și **TITUS PLUS** (certificat de omologare nr. 2108/11.04.2001).
123. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **nicosulfuron** aflată în compoziția produsului **TALISMAN** (certificat de omologare nr. 321PC/29.06.2019).
124. CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **metconazol** aflată în compoziția produsului **METKON 100 SL** (certificat de omologare nr. 654PC/ 24.11.2020).
125. CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **piraclostrobin** și o sursă adițională pentru substanța activă **boscalid** aflate în compoziția produsului **BISCONE** (certificat de omologare nr. 989PC/ 07.11.2024).
126. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **tribenuron** aflată în compoziția produselor **GALAXO 150 WG** (certificat de omologare nr.717PC/ 09.09.2021), **FUNDAMENTUM 700 WG/ (LOCUS 700 WG** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 741PC/ 07.12.2021) și **TORAYA 50 SG/ (TRISTAR 50 SG** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 054PC/ 29.09.2014).
127. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **fluxapiroxad** aflată în compoziția produsului **MIRALON** (certificat de omologare nr.1028PC/17.03.2025).
128. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **metconazol** aflată în compoziția produsului **LS METCO 60** (certificat de omologare nr. 872PC/ 28.09.2023).
129. CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **abamectin** aflată în compoziția produselor **APACHE/ (VERTAB** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 415PC/ 28.02.2018).
130. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **glifosat** aflată în compoziția produselor **AGROSAR 360 SL/ (AGRO-GLYFO GREEN** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 415PC/ 28.02.2018) și **HALVETIC** (certificat de omologare nr. 736PC/ 07.12.2021).
131. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **metconazol** și o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** , substanțe active aflate în compoziția produselor **LS METCO PLUS/ (METPRO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 940PC/07.03.2024).
132. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **cimonaxil** aflată în compoziția produselor **PROXANIL/ (COMBI DUO FORTE** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 423PC/ 05.06.2018).



133. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **boscalid** aflată în compoziția produsului **LS BOSCALID 500** (certificat de omologare nr. 871PC/28.09.2023).

134. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produsului **LS-AZOXY** (certificat de omologare nr. 745PC/24.03.2022).

135. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **imazamox** aflată în compoziția produselor **MOX 4 SL/ (VITORIOMOX 4 SL** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 331PC/ 29.06.2017), **MALA 4 SL/ (MOX PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 979PC/07.11.2024) și **MAZA 4 SL/ (CLARIMI 4 SL** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 389PC/28.02.2018).

136. CNOPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produselor **OSIRIS PRO/ (NAVURA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.1029PC/17.03.2025).

137. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **florasulam** aflată în compoziția produselor **TIMELINE FX/ (TRITIMAX** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 909PC/07.03.2024) și **AXIAL ONE/ DUOZYM** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2852/17.12.2009).

138. CNOPPP a aprobat surse adiționale pentru substanța activă **mezotriona** aflată în compoziția produselor **CALLISTO 480 SC/ (MERISTO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 2156/11.10.2002), **CALARIS PRO / (CLICK PRO** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 336PC/28.08.2017), **ELUMIS/ (ELIBRA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 006PC/20.12.2011), **EVOLYA** (certificat de omologare nr. 144PC/ 16.03.2016) și **MERISTO PLUS/ (CALLISTO PLUS** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.106PC/ 22.07.2015).

139. CNOPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produselor **AMISTAR/ (MIRADOR 250 SC** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr.1811/ 04.12.1997), **AMISTAR GOLD / (PRIORI GOLD** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 424PC/05.0.2018), **AMISTAR MAX** (certificat de omologare nr. 1023PC/31.01.2025), **ORONDIS EVO** (certificat de omologare nr.1030PC/17.03.2025) și **ORTIVA TOP/ (SIMPLA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 068PC/ 21.01.2015) și **UNIVERSALIS 593 SC** (certificat de omologare nr. 2612/02.03./2006).

140. CNOPPP a aprobat trei surse adiționale pentru substanța activă **acetamiprid** aflată în compoziția produsului **IMPRUS** (certificat de omologare nr. 1077PC/16.06.2025).

141. CNOPPP a aprobat schimbarea denumirii sursei pentru substanța activă **glifosat** aflată în compoziția produselor **RODEO PLUS** (certificat de omologare nr.841PC/25.04.2023), **ROUNDUP DYNAMIC** (certificat de omologare nr. 896PC/17.11.2023), **ROUNDUP POWERMAX 720** (certificat de omologare nr. 391PC/28.02.2018), **ROUNDUP ENERGY** (certificat de omologare nr. 009PC/28.05.2012) și **ROUNDUP CLASSIC PRO/ (ROUNDUP EXTRA** - a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 068PC/21.01.2015).

3i. NOTIFICĂRI SCHIMBARE PRODUCĂTOR PRODUSE:

142. La solicitarea companiei **FMC Agro Operational România**, următoarele produse de protecție a plantelor, vor fi transferate de la producătorul actual **Cheminova A/S, Danemarca** către noul producător **FMC Agricultural Solutions A/S, Danemarca**:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr certificat de omologare	Deținător de omologare	Producător
1.	AZAKA	055PC/29.09.2014	FMC Agro Operational Romania	Cheminova A/S, Danemarca
2.	BeFlex	177PC/16.03.2016	FMC Agro Operational Romania	Cheminova A/S, Danemarca



3.	FOXTROT 69 EW/ (FENOVA SUPER - a doua denumire comercială)	2772/27.03.2008	FMC Agro Operational Romania	Cheminova A/S, Danemarca
4.	GAJUS	440PC/15.11.2018	FMC Agro Operational Romania	Cheminova A/S, Danemarca
5.	INNOVATE 240 SC	2773/27.03.2008	FMC Agro Operational Romania	Cheminova A/S, Danemarca
6.	NERO	373PC/29.11.2017	FMC Agro Operational Romania	Cheminova A/S, Danemarca
7.	RIZA 200 EC	223PC/20.10.2016	FMC Agro Operational Romania SRL	Cheminova A/S, Danemarca
8.	SUCCESSOR PRO/ (DUAL NEXT - a doua denumire comercială)	191PC/03.06.2016	FMC Agro Operational Romania SRL	Cheminova A/S, Danemarca
9.	SUCCESSOR Tx/ (KOBAN Tx - a doua denumire comercială)	149PC/16.03.2016	FMC Agro Operational Romania SRL	Cheminova A/S, Danemarca

3j. NOTIFICĂRI MODIFICĂRI ADRESE COMPANII: -

3k. AMBALAJE ADIȚIONALE:

143. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **ARCHITECT/ (ARODARIS - a doua denumire comercială)**, omologate cu certificatul de omologare nr. 775PC/23.08.2022, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,15L; 0,25L; 0,5L; 1L	f-HDPE	sticla	0,15L; 0,25L; 0,5L; 1L	HDPE/PA	sticla
5L; 10L; 50L	f-HDPE	container	5L; 10L; 50L	HDPE/PA	container

144. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecția plantelor **BADGE WG/ (COPRANTOL DUO - a doua denumire comercială)**, omologate cu certificatul de omologare nr. 382PC/28.02.2018, prezentate în tabelul de mai jos:



AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
25g, 150g, 0,5kg, 1kg, 2kg, 2,5kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 10kg	Pungă poliester-aluminiu - polietilenă (119 g/m ²) Pungă poliester-aluminiu - poliamidă-polietilenă (156 g/m ²) Pungă din poliester- polietilenă (111 g/m ²) Pungă din poliamidă-aluminiu -polietilenă (128 g/m ²) Polietilenă (100 g/m ²) Folia de aluminiu poate fi înlocuită cu PET/MET și hârtie pentru straturi externe, se poate adăuga PP	pungă	30g, 50g, 300g, 500g	Multistrat: PET+ POLIETILEN	pungă

145. CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **AMINO 600 SL/ (PIMIENTO** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr. 2530/22.02.2005, prezentat în tabelul de mai jos :

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,5L; 1L; 10L; 20L	HDPE/PET	flacon	100mL	HDPE/PET	flacon
5L; 220L	HDPE				

146. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **ALLIANCE DELTA**, omologat cu certificatul de omologare nr. 894PC/28.09.2023, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
50 mL;100mL; 250mL;500mL; 1L	HDPE, COEX HDPE/PA, COEX HDPE/EVOH, sau fluorinate HDPE	flacon; bidon,	2L	HDPE, COEX HDPE/PA, COEX HDPE/EVOH, sau fluorinateHDPE	flacon; bidon
50 mL; 100mL; 250mL;500mL; 1L	HDPE, COEX HDPE/PA, COEX HDPE/EVOH, sau fluorinate HDPE	flacon; bidon	5L	HDPE	bidon

147. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **REDIGO 100 FS / (HILAGO 100 FS** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr. 452PC/15.11.2018, prezentate în tabelul de mai jos:



AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
15 L; 1000L	HDPE	-	50mL; 100 mL; 250mL; 500mL; 1L; 3L; 5L; 10L; 25L; 30L; 200L; 640L	HDPE; HDPE/PA ; HDPE/EV	-

148. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **REDIGO M 120 FS**, omologat cu certificatul de omologare nr. 514PC/12.07.2019, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
5L; 10L; 20L; 25L; 50L; 200L; 1000L	HDPE; DRUM PE; RIGID IBC PE	-	1L; 15L; 30L	HDPE- COEX/PA ; EVOH	-

149. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **REDIGO PRO 170 FS**, omologat cu certificatul de omologare nr. 070PC/ 21.01.2015, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
10L; 5L; 200L; 1000L	EVOH/ADEZIV/HDPE RIGID IBC PE	-	50mL; 100 mL; 250mL; 500mL; 1L; 3L; 5L; 15L; 25L; 30L; 640L	HDPE; COEX/PA COEX/EV; METAL/HDPE	-

150. CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsul de protecție a plantelor **BLOSSOM PROTECT**, omologat cu certificatul de omologare nr. 652PC/24.11.2020, prezentat în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1,5 KG	PET 12 µm-ALU 8 µm-PE 75 µm	pungă	1,5 KG	PE-HD	recipient cilindric
1,5 KG	PE-HD	recipient			

151. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **FORNET EXTRA 6 OD/ (SAMSON EXTRA 6 OD - a doua denumire comercială)**, omologate cu certificatul de omologare nr. 2706/11.06.2007, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip

0,5L, 0,7L, 1L, 2,5L, 3L, 3,5L, 4L, 5L, 10L, 15L, 20L	HDPE, COEX (PE/ PA), fHDPE	flacon, canistră	0,5L, 1L, 3L, 5L	HDPE EVOH	flacon, canistră
			0,5L	COEX(PE/PA)	flacon ø63mm

152. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **AXIAL ONE/ DUOZYM** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr. 2852/17.12.2009, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L	HDPE/PA	Bidon	1L;3L;5L;7,5L;10L	HDPE/EVOH	Bidon
5 L	f-HDPE	Bidon	1 L; 3L; 7,5L	f-HDPE	Bidon
			3 L; 5L; 7,5L;10L	HDPE/PA	Bidon

153. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **TIMELINE FX/ (TRITIMAX** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr. 909PC/07.03.2024, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	TIP	Capacitate	Material	TIP
1 L; 5L; 10L; 15L; 20L	HDPE/PA	Bidon	1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L	HDPE/EVOH	Bidon
1 L; 5L; 10L; 15L;20L	HDPE	Bidon	3 L; 7,5L	HDPE	Bidon
			3 L; 7,5L	HDPE/PA	Bidon

154. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **MERISTO PLUS/ (CALLISTO PLUS** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr.106PC/22.07.2015, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L; 5L; 20L	HDPE	Bidon	1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L	HDPE/EVOH	Bidon
1 L; 5L; 20L	HDPE/PA	Bidon	3 L; 7,5L; 10L	HDPE	Bidon
1 L	PET	Bidon	3 L; 7,5L; 10L	HDPE/PA	Bidon
5 L; 10L; 20L	f-HDPE	Bidon			



155. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **BOXER 800 EC/ (PIROSEO** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr. 2787/26.06.2008, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L; 5L; 10L; 20L	HDPE	Bidon	1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L	HDPE/PA	Bidon
			1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L; 20L	f-HDPE	Bidon
			1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L	HDPE/EVOH	Bidon
			3 L; 7,5L	HDPE	Bidon

156. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **AMISTAR GOLD/ (PRIORI GOLD** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr. 424PC/05.06.2018, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L; 5L; 10L; 20L	HDPE	Bidon	1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L	HDPE/PA	Bidon
			1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L	HDPE/EVOH	Bidon
			3 L; 7,5L	HDPE	Bidon

157. CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **AMISTAR/ (MIRADOR 250 SC** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr.1811/ 04.12.1997, prezentat în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
100 mL; 1L; 10 L; 20L; 5L	HDPE	Bidon	1 L	HDPE	Bidon cu pulverizator
10 mL	HDPE	Ampulă			
220 L	HDPE	Butoi			
10 mL; 20 mL; 25 mL	HDPE/PA	Ampulă			
100 mL	HDPE/PA	Bidon			

158. CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **ORTIVA TOP/ (SIMPLA** - a doua denumire comercială), omologate cu certificatul de omologare nr. 068PC/ 21.01.2015, prezentat în tabelul de mai jos:



AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
100 mL; 250 mL; 500 mL; 1L; 5L; 10L	HDPE	Bidon	1L	HDPE	Bidon cu pulverizator
10 mL	HDPE	Ampulă			
220 L	HDPE	Butoi			
100 mL; 250 mL	PET	Bidon			

159. CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsul de protecție a plantelor **TOPAS 100 EC**, omologat cu certificatul de omologare nr.1056/ 29.02.1984, prezentat în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
250 mL; 500 mL; 1L	HDPE/PA	Flacon	1 L	HDPE	Bidon cu pulverizator
250 mL; 500 mL; 1L	PET	Flacon			
5 L	f-HDPE	Canistră			
3 mL	PET laminat cu bariera PE	Fiolă			
20 mL; 25 mL; 50 mL; 100 mL	COEX HDPE/PA	Ampulă; Flacon			

160. CNOPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **ELATUS ERA/ (APROVIA - a doua denumire comercială)**, omologate cu certificatul de omologare nr. 342PC/29.11.2017, prezentate în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L	PET	Bidon	1 L; 3L; 5L; 7.5L; 10L	HDPE/EVOH	Bidon
1 L; 5L; 10L; 20L	HDPE/PA	Bidon	3 L; 7.5L	HDPE/PA	Bidon
1 L; 5L; 10L; 20L	f-HDPE	Bidon	3 L; 7.5L	f-HDPE	Bidon
			3 L; 7.5L	f-HDPE	Bidon

161. CNOPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsul de protecție a plantelor **LIBRETO**, omologat cu certificatul de omologare nr.1001PC/ 07.11.2024, prezentat în tabelul de mai jos:

AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
100 mL; 250 mL; 500 mL; 1L; 5L; 10L	HDPE	Bidon	1L	HDPE	Bidon cu pulverizator
10 mL	HDPE	Ampulă			
220 L	HDPE	Butoi			
100 mL; 250 mL	PET	Bidon			



AMBALAJE OMOLOGATE			AMBALAJE ADITIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
100 mL; 250mL; 1L	HDPE/ PA	Flacon; Bidon	5 L	HDPE/ PA	Bidon

PREȘEDINTE
ȘOLDEA Romeo

