

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 1 din 11.03.2026.**


În repaus vegetativ, după efectuarea tăierilor la pomii fructiferi pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare în pomicultură se recomandă efectuarea tratamentului de prevenire numit și îmbăierea pomilor.

- Pentru prevenirea și combaterea bolilor: *Venturia inaequalis* și *Venturia pirina* sau **rapănul la măr și păr**, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena* sau **monilioza sâmburoaselor**, *Erwinia amylovora* sau **focul bacterian al rosaceelor**, *Stigmina carpophila* (*Coryneum beijerinckii*) sau **ciuruirea frunzelor la sâmburoase**, *Podosphaera leucotricha* sau **făinarea mărului** se recomandă efectuarea tratamentului cu produse pe bază de cupru:
- **BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX** - a doua denumire comercială) în doză de 5 – 7,5 kg/ha (în concentrație de 0,5 – 0,75%) sau
- **CHAMP 77 WG (COPPERMAX** - a doua denumire comercială) în doză de 2 kg/ha (în concentrație de 0,2%) sau
- **FLOWBRIX (COPPER-FIELD** - a doua denumire comercială) în doză de 3,3 - 3,75 l/ha sau
- **TRIUMF 40 WG** în doză de 2 – 2,5 kg/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

În cazul în care anul anterior la pomi s-a manifestat făinarea, se recomandă folosirea produsului:

- **THIOVIT JET 80 WG** în doză de 5 – 8 kg/ha.

Tratamentul se va efectua la temperaturi ale aerului de peste 5°C, atunci când în timpul nopții temperaturile nu mai scad sub 0°C. De asemenea, tratamentul se va efectua când scoarța pomilor este uscată.



- Pentru combaterea formelor hibernante ale organismelor dăunătoare: afidelor, acarienilor și insectelor minatoare, **păduchelui din San José** (*Quadraspidiotus perniciosus*) se recomandă efectuarea tratamentelor cu insecticide:
- **MOSPILAN 20 SG**, în doză de 0,450kg/ha sau
- **JUVINAL 10 EC** în concentrație de 0,1% sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Ca adjuvant cu un insecticid de contact puteți utiliza uleiuri horticoale ex. **ESTIUOIL (YAGOS** - a doua denumire comercială) în doză de 3,75 – 15 l/ha în amestec (ex. ESTIUOIL + MOSPILAN 20 SG). Tratamentele se vor efectua la 2 – 3 săptămâni după cele cu produse cuprice.

Nu se combină produsele uleioase cu cele pe bază de cupru.

Aplicarea tratamentului de îmbăiere este optim la temperaturi ale aerului de peste 5°C, atunci când în timpul nopții temperaturile nu mai scad sub 0°C. De asemenea, tratamentul se va efectua când scoarța pomilor este uscată.

Lucrări de igienă culturală și agrotehnice:

- **tăierea și arderea lăstarilor** cu simptome de boli (rapăn, făinare, focul bacterian, fructe moniliate);
- **răzuirea trunchiului** pentru îndepărtarea celulelor moarte a lichenilor și mușchilor;
- **eliminarea și arderea pomilor uscați** neproductivi, ai celor afectați de focul bacterian, cancerul de scoarță, a cuiburilor de insecte defoliatoare;
- **strângerea și distrugerea fructelor mumificate;**
- **îmbăiere totală a pomilor**, de la vârf până la colet și stropirea zonelor din jurul pomilor;

Alte recomandări:

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiționalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor (conform modelului) și păstrate cel puțin 3 ani.

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Șef serviciu zonal HR-SV,
Romfeld Păunița Aurelia



Întocmit,
Molnar Zoltan