

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 4/17.03.2026

Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea organismelor dăunătoare din perioada înfloritului la piersic și cais: monilioza (*Monilinia laxa*), bășicarea frunzelor (*Taphrina deformans*), ciuruirea frunzelor (*Stigmata Carpophila*) și a dăunătorului molia vărgată a piersicului (*Anarsia lineatella*)

Monilioza (*Monilinia laxa*) este una dintre cele mai păgubitoare boli la speciile sămburoase în special la cais și piersic și poate duce la pierderi mari de flori și fructe tinere. Răspândirea infecției are loc în perioada înfloritului la temperaturi de 10-25 grade C cu perioade de umiditate crescută. Florile atacate se veștejesc iar lăstarii devin maronii și se usucă de la vârf spre bază, având aspect de arsură.

Ciuruirea frunzelor (*Stigmata Carpophila*) se transmite de la un an la altul prin miceliu din scoarța ramurilor bolnave și prin conidiile aflate pe gomele de pe ramuri. Pe lăstari și pe ramuri atacul se manifestă prin pete adâncite care cu timpul se necrozează, apoi apar crăpături pe scoarță și scurgeri de clei. Pe frunze apar la început pete circulare de 2-3 mm de culoare violacee care apoi devin cafeniu roșcate. La cais pe fructe atacul se manifestă prin apariția la început a unor pete mici circulare de 1-3 mm de culoare roșu închis care cu timpul se necrozează și capătă un aspect rugos.

Bășicare frunzelor (*Taphrina deformans*). Atacul ciupercii se manifestă prin apariția timpurie pe frunzele tinere a unor zone roșietice, după care întreaga frunză se îngălbenește, se deformează și devine carnoasă.

Molia vărgată a piersicului (*Anarsia lineatella*). Dăunătorul are trei generații pe an și iernează în stadiul de larvă pe tulpini, în crăpăturile scoarței și sub solzii mugurilor. Larvele își încep activitatea primăvara devreme și atacă atât mugurii tineri cât și lăstarii și fructele abia formate. Atacul se manifestă prin ofilirea lăstarilor care se îndoiește, se usucă și prezintă clei și excremente în jurul orificiilor de intrare.



Pentru combaterea acestora efectuați tratamentul folosind unul din amestecurile:

- **AFFIRM OPTI - 2,5 kg/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha sau**
- **CORAGEN - 175 ml/ha + SIGNUM – 0,5kg/ha**

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului - 10-15% petale scuturate.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate în România. Ca și măsuri mecanice de combatere se recomandă tăierea și eliminarea lăstarilor atacați precum și a fructelor mumificate care au rămas pe ramuri, lucrare care se efectuează odată cu tăierile de întreținere a coroanei.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului.

ALTE RECOMANDĂRI :

- Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.
- Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 127/1991 al ACA România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației.
- Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al ministrului Mediului, Apelor, și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor de sprijin și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare
ing. Virgil Iftu

