


AVERTIZAREA NR. 10 / 25 .03.2026

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Bășicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans)



Bășicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans) se manifesta primavara devreme si reprezinta o amenintare mare pentru piersic, afectand nu doar frunzele, ci si lastarii si, in cazuri mai rare, chiar si fructele. De asemenea, pe langa piersic, Taphrina deformans ataca si nectarinul (atacul fiind mult mai agresiv in cazul acestuia, comparativ cu piersicul) caisul si migdalul.

Suprafata tesuturilor afectate este acoperita de o pulbere fina si argintie, care reprezinta ascele cu ascospori. Frunzele afectate devin mai susceptibile la fainare si la atacurile de afide, iar consecintele sunt evidente prin brunificarea, rasicirea si caderea acestora la inceputul lunii iunie, marcand o defoliere semnificativa a pomilor.

COMBATERE

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Piersic	Boli	Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuirierea micotica a frunzelor), Minilinia spp. (moniliza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
---------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------	---

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	---------------------	-------------------------	---------	---

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor, monilioza, ciuirierea frunzelor, arsura bacteriana a samburoaselor, antracnoza, uscarea ramurilor	1,5-2,0 kg/ha	-	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor, monilioza, ciuirierea frunzelor, arsura bacteriana a samburoaselor, antracnoza, uscarea ramurilor	1,5-2,0 kg/ha	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).