

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 3/09.03.2026**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor dăunătoare la răsadurile de legume, flori si tutun:

Căderea plăntuțelor (*Pythium sp*)

Rizoctonioza (*Rhizoctonia sp*)

Mana de sol (*Phytophthora spp*)

Fuzarioza (*Fusarium spp*)

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare folosind unul din produsele de mai jos, astfel:

Amestecul de pământ folosit la producerea răsadului :

Se pregătește cu 5-7 zile înainte de semănat. La dezinsecția acestuia se poate folosi produsul **BASAMID GRANULE** 250-500kg/ha (s.a. *dazomet* 97%), omologat pentru combaterea manei la sol, fuzarioza, ofilirea vasculara cat si ca insecticid pentru combaterea coropișniței si a nematodului glicol al rădăcinilor.

Pentru dezinsecția solului din spatii protejate poate fi utilizat produsul **RAISAN 51** - 700 L/ha (înainte de semănat sau plantat), pentru combaterea nematozilor, insectelor, buruienilor si ciupercilor.

Plantele răsărite sau repicate se vor trata cu unul din produsele:

***PREVICUR ENERGY** – 3 litri/ha aplicat prin picurare, **sau**

***MERPAN 80 WDG / (FLO-CAPTAN** - a doua denumire comerciala)- (s.a. *captan* 80%) - 0,125%- preventiv sau 0.3% aplicat curativ , in doza de 4-5 litri soluție/ mp, **sau**

***BELTANOL** - 4,0 L/ha, **sau**

***ALCUPRAL 50 PU** -1.5- 2 kg/ha (s.a. *oxiclorura de cu* 50%), **sau**

***PROPLANT 72,2 SL** - 0,15-0,25 % (3-5 L soluție/m²) **sau**

***ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 SC-** a doua denumire comerciala)- 1 lit/ha, **sau**

***SERIFEL** - 5 g/m² (prin pulverizarea tulpinilor), **sau**

***T34 BIOCONTROL/ (IDEMIO)** – conf. rec de pe eticheta, **sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Primul tratament se efectuează în răsadnița, in intervalul semănat - răsărit.

Al doilea tratament in faza de răsad se efectuează cu cel mult o săptămâna înainte de transplantarea, la aceeași concentrație si același volum de soluție ca la primul tratament.

Al treilea tratament se realizează în fenofaza de repicare – plantare, cu 2 - 3 zile înainte sau imediat după repicare

Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice.

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Pot fi utilizate la tratamentele fitosanitare și alte produse omologate pentru combaterea acestor organisme dăunătoare, conform bazei de date PEST EXPERT care poate fi accesată pe site-ul www.anfdf.ro și www.madr.ro.



atac de căderea plăntuțelor (Pythium sp)

ALTE RECOMANDARI :

- Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.
- Suprafețele tratate se vor inscripționa cu tăblițe de avertizare „TEREN OTRĂVIT “.
- Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor
- Tratatamentul se va efectua pe timp liniștit.
- **Protejați familiile de albine** împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației.
- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor..
- Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru **protecția mediului înconjurător!**
- La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,

68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România

- Conform Reg. CE nr.1107/2009, art.67,(1) , aveți obligația sa completați si sa păstrați pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protecția plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protecția plantelor”, după modelul:

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și Locul unde este situat terenul	Timpul aplicării-fenofaza	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare : boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doză Omologată /doza folosită		Suprafața, (ha)	Cant. utilizate (kg, l)		

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL
PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognoză si Avertizare,

Ing. Aurelian Valentin UNTARU

