

AVERTIZAREA NR. 9 / 18 .03. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare in pomicultura pentru combaterea organismelor daunatoare cu urmatoarele produse de protectie a plantelor omolgate .

1.Focul bacterian(Erwinia amylovora)



Erwinia amylovora este o bacterie Gram-negativă extrem de contagioasă care cauzează „focul bacterian” al rozaceelor, o boală devastatoare pentru pomi fructiferi precum mărul, părul și gutuiul. Aceasta poate distruge livezi întregi într-un singur sezon, provocând ofilirea, înnegrirea și uscarea rapidă a florilor, lăstarilor și fructelor

Combatere

ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Erwinia spp. (focul bacterian)	7,5 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Venturia spp (rapan)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
gutui	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Par	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-

TRIUMF 40 WG

gutui	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapan, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapan, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	-	-
Par	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapan, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	-	-

ALCUPRAL 50 PU

gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	4,5 kg/ha (0,3%) Se aplica prefloral	-	-
gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	-	-
Mar	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului)	1,5-2,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	2,0 kg/ha (0,2%) Se aplica prefloral;	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	-	-
Par	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului); Erwinia amylovora (Focul bacterian)	3,0 kg/ha (0,3%) in 1000 L apa	-	-

2. Rapănul mărului (*Venturia inaequalis*)



Venturia inaequalis (rapănul mărului) este cea mai frecventă și gravă boală fungică a mărului, cauzând pete negre/cenușii pe frunze și fructe, ducând la deformarea și crăparea acestora. Ciuperca iernează pe frunzele căzute, eliberând spori primăvara (ascospori). Combaterea implică fungicide (la avertizare) și măsuri igienice (strângerea frunzelor)

Combatere

BOUILLIE BORDELAISE WDG/(BORDOMIX - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Venturia inaequalis (rapanul marului)	0,5% (7,5 kg/ha)	-	-
-----	------	---------------------------------------	------------------	---	---

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul	0,15% (2,250 kg/ha)	28 zile	Max. 10 tratamen
-----	------	---------	---------------------	---------	------------------

SERCADIS

Mar	Boli	Rapanul	0,25-0,3 l/ha se aplica de la faza de buton floral pana inceputul infloritului	35 zile	-
-----	------	---------	--	---------	---

Mar	Boli	Fainarea	0,25 l/ha se aplica de la faza de buton floral pana la inceputul infloritului	35 zile	-
-----	------	----------	---	---------	---

3. Făinarea mărului (*Podosphaera leucotricha*)



Patogenul iernează în solzii mugurilor sub formă de miceliu de rezistență sau sub formă de peritecii. Miceliul își începe activitatea primăvara, odată cu intrarea în vegetație a merilor. Pe acest miceliu se formează conidii, evidente odată cu înfrunzitul. Astfel, mugurii contaminați dau lăstari sau flori infectate. Acestea constituie primele focare de infecții.

Combatere

KUMULUS DF

Mar	Boli	Fainarea	0,3%	-	-
-----	------	----------	------	---	---

THIOVIT JET 80 WG

Mar	Boli	Fainarea, rapanul marului, rapanul parului (efect secundar asupra acarienilor)	5,0-8,0 kg/ha	7 zile	-
-----	------	--	---------------	--------	---

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

SERCADIS

Mar	Boli	Rapanul	0,25-0,3 l/ha se aplica de la faza de buton floral pana inceputul infloritului	35 zile	-
-----	------	---------	--	---------	---

Mar	Boli	Fainarea	0,25 l/ha se aplica de la faza de buton floral pana la inceputul infloritului	35 zile	-
-----	------	----------	---	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate. Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/2009; H.G. nr. 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Intocmit,

Coordonator OF Buzău

Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).