

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 5 din 24.03.2026

Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea **gărgăriței florilor de măr** (*Anthonomus pomorum*) la speciile de semințoase: măr, păr și gutui. Dăunătorul are o singură generație pe an. Primăvara o dată cu creșterea temperaturilor și începerea dezmușuriturii apar adulții dăunătorului din locurile de hibernare (sol și crăpăturile scoarței) care atacă mugurii vegetativi și floriferi unde își depun ouăle. După eclozare larvele consumă interiorul florilor (stamine, pistil) ducând la pagube însemnate de recoltă.

Rapănul (*Venturia inaequalis*) ciuperca iernează ca miceliu în frunzele căzute și infectate care rămân în preajma pomilor de unde se răspândește primăvara pe frunze, flori și lăstari tineri. Răspândirea sporilor ciupercii are loc în special cu ajutorul vântului în perioada cu umiditate ridicată și cu temperaturi mai mari de 10 grade Celsius.

Făinarea la măr (*Podosphaera leucotricha*) ciuperca iernează sub formă de miceliu în solzii mugurilor iar răspândirea bolii se face prin conidii care primăvara odată cu creșterea temperaturilor sunt purtate de vânt și împrăștiate producând noi infecții. Ciuperca atacă în mod semnificativ frunzele, florile și lăstarii tineri abia formați și se manifestă sub forma unei pulberi albicioase cu aspect făinos care acoperă cu timpul ambele fețe ale frunzelor atacate (tinere) precum și a lăstarilor abia formați.



Efectuați tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. POLECI – 0.05 % + LUNA EXPERIENCE - 0.75 l/ha sau
2. RAPTOL HP – 0,69 l/ha + DIFCOR 250 EC- 0.15 l/ha sau
3. POLECI – 0.05% + SCORE 250 EC – 0.2 l/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor cu efect similar, omologate în România.

Ca metode agrotehnice și biologice se recomandă adunarea frunzelor, prelucrarea solului de sub coroană și instalarea de brâie capcană pe trunchiul pomilor vara, la începutul lunii iunie. Brâiele capcană pot fi confecționate din paie, fân, carton gofrat sau alte materiale textile, având scopul de a captura adulții care se retrag pentru iernare. Toamna târziu acestea se vor aduna și se vor distruge prin ardere.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: mugurii floralii dez muguriți

Tratamentul se repetă la scuturarea petalelor (10-15% petale scuturate) utilizând un alt amestec din cele mai sus menționate.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului. De asemenea se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI :

- Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.
- Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 127/1991 al ACA Romania, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației.
- Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al ministrului Mediului, Apelor, și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor de sprijin și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare
ing. Virgil Itu

