


## Buletin de avertizare nr. 11 din 30.03.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **MĂR** împotriva gărgăriței florilor de măr și împotriva făinării.

### **GĂRGĂRIȚA FLORILOR DE MĂR (Anthonomus pomorum)**

#### **Simptome atac:**

Cel mai simplu simptom de observat în urma atacului gărgăriței florilor de măr rezultă din hrănirea larvelor în interiorul mugurelui de flori. Florile infestate au formă de cupolă, cu petale maronii care se închid. Pe lângă deteriorarea florilor, hrănirea cu plante gazdă de către adulții activi la începutul sezonului are ca rezultat și mici găuri circulare pe frunzele și mugurii nou creșcuți. Dăunătorul atacă și părul.



#### **Combatere:**


- **POLECI / (DECA 2,5 EC – a doua denumire comercială)** - 0,03-0,05% (30-50 ml /hl apă), 3 zile pauză.
- **RAPTOL HP** – 0,69 l/aplicare (0,46 l/10.000 mp suprafață foliară). Se aplică de la sfârșitul perioadei de umflare a mugurilor până la deschiderea primelor frunze.

Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele (pomii) unde există rezervă biologică (P.E.D. 1-2 adulți pe pom).

## FĂINAREA (*Podosphaera leucotricha*).

Este destul de ușor să observi făinarea la măr deoarece organele vor fi acoperite de o pulbere cu aspect făinos care, la început are culoarea albă, iar apoi devine verde-cenușie.

Frunzele atacate de această boală își vor îndoi vârfurile, iar apoi se vor usca și vor cădea. Lăstarii afectați vor căpăta o culoare maro, iar vârfurile se vor îndoi. Florile atacate se deformează și se vor usca. Legat de fructe, acestea nu vor mai crește și vor cădea din pom.



Tratamentul este curativ și se efectuează cu unul din următoarele fungicide:

- **KUMULUS DF** - 0,3%.
- **SERCADIS** - 0,25 l/ha. Se aplică de la faza de buton floral, 35 zile pauză.

PED pentru făinarea mărului este de 10-25 % frunze atacate.

Perioada optimă de tratament: când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezbuguriți.

Tratamentul se va încheia în 3 – 4 zile.

### Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,  
Micuț – Istrate Daniela