

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 5 din 16 .03. 2026

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorilor / bolilor :
Gărgârța florilor de măr(*Anthonomus pomorum*) care pot cauza pierderi importate la:

Cultura de Măr

Descriere: Adultul prezintă corp de 5-6 mm lungime, de culoare bruna-roscată. Capul este negru iar antenele și picioarele sunt brun-roșcate. Femurele sunt prevăzute cu pînți puternici. Elitrele sunt mai late în partea posterioară, pe care sunt prezente 2 benzi transversale oblice, de culoare mai închisă iar în spațiul dintre aceste benzi este prezentă o pubescență de culoare deschisă.

Larva are 7-8 mm lungime, de culoare alb-gălbui, prezintă capsula cefalică brună iar longitudinal, 8 rânduri de peri.

Biologie și ecologie: Gărgârța iernează ca adult în stratul superficial al solului, sub covorul de frunze de la baza trunchiului pomilor sau în crapăturile scoartei. În martie-aprilie, când temperatura ajunge la 5-6°C, apar adulții din locurile de hibernare. Momentul coincide cu aproximativ 8-10 zile înainte de dezmugurirea merilor. După o perioadă de aproximativ 10 zile de hranire, începe copulația după care femela depune câte 2-5 ouă într-o inflorescență, ajungând să depună în total până la 100 de ouă în decurs de 10-15 zile. Ouăle sunt apoi acoperite cu un clei, în vederea protejării acestora de inamici naturali.

Larvele se dezvoltă în interiorul bobocilor floralii, consumând organele interne, după care se transformă în pupă. Apariția noilor adulți are loc începând cu a doua jumătate a lunii mai (la caderea fiziologică a fructelor). Urmează o perioadă de 15-25 de zile de hranire după care adulții se retrag în diapauză de estivație, care se continuă în toamna cu iernarea.

Pentru tratament se vor folosi insecticidele:

RAPTOL HP - în concentrație de - 0,69L/ha sau

POLECI 2,5 EC - în concentrație de - 0,03% - 0,05 %

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului : **la începutul dezmuguririi**

Tratamentul se va face prin imbaierea trunchiului și coroanei pomilor .

In timpul tratamentului temperatura trebuie să fie peste 5 grade C , să nu plouă și să nu bată vântul .

Atenție ! În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnică securității muncii , protecția animalelor , albinelor și a mediului înconjurător împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RECOMANDĂRI: Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI:

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor” (SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT**.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată numai la avertizare.

3. Sa se asigure ca produsele de protecție a plantelor clasificate ca **foarte toxice (T+)** și **toxice (T)** vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care își desfășoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.(parcelele din zona de protecție au o fâșie înierbată de 1-3 m, în funcție de înclinația terenului 12%).

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara

6. Toți fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **Registrul cu evidența produselor de protecția plantelor pe care le utilizează**.

Normele privind ecocondiționalitate sunt obligatorii pentru toți fermierii care solicită plăți prin scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 si vor consulta Ghidul fermierului postat pe site : [http:// www.apia.org.ro/](http://www.apia.org.ro/)

Toți producătorii agricoli înscrși la APIA, care dețin suprafețe cu culturi agricole în câmp și spații protejate, indiferent de suprafața cultivată, sunt obligați să dețină un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat.

REGISTRU*

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratament (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunător i/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Intocmit
Ing. Ivanescu Camelia

Coordonator O.F.
Ing. Novacescu Maria

