

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 5 din 11. 03. 2026**

Schimbarile climatice din ultima perioada vor determina aparitia daunatorilor la cultura de: **RAPITA**.

Pentru protejarea culturii Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea organismelor daunatoare: **GARGARITA TULPINILOR DE RAPITA** (ceutorhynchus napi); **GARGARITA TULPINILOR DE VARZA** (ceutorhynchus pallidactylus); **AFIDE** (aphis sp.). Factorii climatici influenteaza foarte mult aparitia si activitatea gargaritelor in camp (temperatura, umiditatea, precipitatiile). Insa temperatura este cea mai importanta, gargaritele migreaza cand temperatura solului trece de 6 C si incepe zborul la 12 C.

Pentru monitorizarea eficienta a acestui daunator: Este necesar amplasarea capcanelor galbene cu apa (vase MOERINKE), clasice sau capcane „CSALOMON KLP+trap” cu atractant, acest tip de capcana poate fi amplasat langa vechea cultura de rapita. Momeala din capcane atrage toate speciile de gargarite din genul Ceutorhynchus napi.

Pentru combatere folositi unul din produsele de mai jos:

1. **MAVRIK 2F – 0.2 l/ha sau**
2. **MOSPILAN 20 SG/KRIMA 20 SG -0.2 kg./ha sau**
3. **SCATTO / DEMETRINA 25 EC – 0,2 l/ha sau**
4. **DelCaps 050 CS /Deltop 050 CS - 0,08-0,1 l/ha sau**
5. **DELTAGRI / FASTER DELTA – 0,3 l/ha sau**
6. **SUMI ALPHA 5 EC / WIZARD – 0,250 l/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu unul din fungicidele de mai jos, pentru combaterea bolilor:

ALTERNARIOZA (alternaria br.); **SCLEROTINIA** (Sclerotinia sc.) ; **PUTREGAIUL NEGRU AL TULPINILOR DE RAPITA** (phoma lingam) .

- 1 **CHAMANE/AFFIX 250EC -1.0 l/ha sau**
2. **DIFCOR 250EC - 0,5 l/ha sau**
3. **PROPULSE 250 SE - 1,0 l/ha. sau**
4. **PROTECTOR SUPER /VIP SUPER – 1.0 l/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

PERIOADA OPTIMA DE TRATAMENT: Tratamentului se va efectua, imediat dupa ce trei zile consecutiv temperatura diurna a depasit 8-9 C. In momentul in care apar capturi de 10-20 adulti pe/in capcane, este necesar aplicarea tratamentului fitosanitar. Daca se rateaza acest moment al zborului, nu mai putem combate eficient acest daunator, care produce mari pagube culturii prin larve ce apar in urma atacului. Larve ce **NU POT FI COMBATUTE** cu niciun insecticid aplicat ulterior.

TR. nr. 2 se va efectua in faza fenologica de formare a tulpinei.

Alte recomandari:

Recomandam monitorizarea zilnica a culturii.

Tratamentul trebuie efectuat impotriva adultilor inainte ca acestia sa depuna ponta.

Perioada de maxima sensibilitate pentru cultura este inainte ca ea sa ajunga la 20 cm. inaltime. Atunci trebuie combinate gargaritele, odata patrunse in tulpina, practic combaterea larvelor este aproape imposibila.

Pentru aderarea solutiei pe planta, in solutia de stropit se adauga (SILWET GOLD -0,1% sau ARACET – 0,2%;

Verificati,cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Cititi cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii,de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului,Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare

Maria BOGDAN