

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr.14 din 25. 03.2026**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de: **CIREȘ, VIȘIN.**

Pentru prevenirea si combaterea bolilor: **MONILINIA LAXA** (monilioza); **COCOMYCES HIEMALIS** (antragnoza sau patarea purpurie frunzelor de cireș).

Pentru efectuarea tratamentului fitosanitar, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- 1. LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,5 l / ha. sau**
- 2. SCORE 250 EC/ MAVITA - 0,2 l/ha. cires**
- 0.15 l/ha visin sau
- 3. CUPROXAT FLOWABLE / KUPFEROL – 3,5 l/ha. sau**
- 4. SIGNUM / SYREK STAR - 0,5 kg. /ha sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

MONILINIA LAXA (monilioza), boala se manifesta pe flori, ramurile tinere si fructe. Cel mai periculos atac este acela produs pe flori. Buchetele de flori sunt infectate inainte de deschiderea petalelor si, cel mai tarziu, cand florile sunt deschise. Buchetul floral se usuca repede. Frunzele se vestejesc, luand aspectul unui buchet uscat. Infectia poate ajunge si pe ramuri, pe care uneori apar gome. Cand atacul este tarziu, petele se detaseaza de pericarpul fructului in curs de formare.

COCOMYCES HIEMALIS, (antragnoza sau patarea purpurie frunzelor de cireș).
sunt atacate in special frunzele si intr-o mica masura ramurile. Pe frunze, atacul se manifesta prin aparitia pe fata superioara a limbului numeroase pete punctiforme, de culoare purpurie, care cu timpul se maresc. Pe fata inferioara a limbului, petele sunt mai delimitate, iar coloratia este mai palida. Frunzele infectate incep sa se usuze, devin fragile, se rasucesc si cad prematur. Pomii ramanand cu ramurile defoliate.
Pe ramuri inainte de infrunzirea pomilor apar numeroase fructificatii ale ciupercii, care erup prin leziunile produse pe scoarta. Portiunile de ramuri se usuca repede, iar frunzele cad.

Perioada optimă de tratament:

Tr. nr. 1- se va efectua cand 10% din mugurii floriali sunt dezmuguriti;

Tr. nr. 2- in faza fenologica de „Buton alb”- „Deschiderea primelor flori”(tratament obligatoriu);

Tr. nr. 3 – la 15-20 % flori cu petale scuturate.

Alte recomandari:

La prepararea solutiei se vor respecta toate instructiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN