

**Buletin de avertizare nr. 8 din 30.03.2026**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

**MONILIOZA (MONILINIA SPP) + BĂȘICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC (TAPHRINA D.) + MOLIA VĂRGATĂ A PIERSICULUI (ANARSIA L.)**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului II în plantațiile de piersic numai pe parcelele în care s-au realizat următoarele condiții: FAZA FENOLOGICĂ DE „BUTON ROZ - ÎNFOIEREA COROLEI,,

**MONILIOZA (MONILINIA SPP).**


Simptomele tipice produse de Monilinia spp. sunt: ofilirea inflorescențelor, uscarea lăstarilor și putrezirea fructelor.

Pe inflorescențe și lăstari ramurile purtătoare de flori infectate sunt invadate de miceliul ciupercii, formându-se la suprafața lor leziuni de culoare brună, concave (răni cancerigene), asociate adesea cu o gomă superficială. În condiții de umiditate, pe țesuturile infectate se formează fructificații conidiene de culoare gri. De obicei, cancerele afectează numai lăstarii tineri, fără a se extinde asupra lemnului matur, se extind de la un sezon la altul. Atacul pe lăstarii tineri conduce la ofilire, îndoirea vârfului în jos și uscarea lor.

Pe Frunze: atacul pe frunzele tinere conduce la defolierea pomilor.

Florile se brunifică și se ofilesc. Din peduncul se poate scurge un exudat gomos. În final, florile se usucă și cad sau pot rămâne pe ramuri.

Pe fructe: Pe fructe apar mai întâi pete de culoare brună, de formă rotundă. În condiții de umiditate mare, petele se extind cu repeziciune și cuprind tot fructul. Pe fructele care suferă o putrezire moale se formează fructificațiile conidiene, de culoare gri. În condiții de umiditate scăzută, pustulele conidiene nu apar, iar fructul se usucă și se mumifică.


**BĂȘICAREA FRUNZELOR (Taphrina d.)**

Boala se manifestă pe frunze, flori, fructe și ramuri. Frunzele atacate pe anumite porțiuni sau pe toată suprafața, hipertrofii ale parenchimului foliar, au aspectul bășicat, cu umflături pe suprafața superioară și adâncituri pe cea inferioară, unde apare o pulbere albă. În cazul unui atac puternic, pomii rămân fără frunze de timpuriu.

**MOLIA VARGATĂ A PIERSICULUI (ANARSIA L.)**

În stadiul de larvă atacă lăstarii și fructele plantelor. Imediat după dez mugurirea piersicului, larvele pătrund în lăstari. Lastarii mai mici de 2-3 cm se usucă.

Dejecțiile au forma unui strat de mazăgă lipicioasă. După ce copacul intră în stadiul de vegetație, larvele atacă lăstarii mai mari și fructele. În fruct sapă galerii care se umplu cu dejecții, iar pe suprafață lasă un strat de mazăgă. Fructele atacate cad.



### **Folosii unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

BOUILLIE BORDELAISE WDG - 0,5% (5 KG/HA), pauza 3 zile, pentru monilioza, basicarea frunzelor.

CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL - a doua denumire comerciala) - 2,6 l/ha, se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inflorescentelor, 21 zile pauza, pentru monilioza, basicarea frunzelor.

AIRONE SC - 3,5 l/ha, se aplica toamna la caderea frunzelor si primavara, 21 zile pauza, pentru monilioza, basicarea frunzelor.

BADGE WG (COPRANTOL DUO - a doua denumire comerciala) - 3,5 kg/ha, 21 zile pauza, se aplica toamna la caderea frunzelor si primavara, pentru monilioza, basicarea frunzelor.

BIGALO - 0,5 kg/ha, de la deschiderea primelor flori pana la coacerea fructelor, pentru monilioza.

### **Pentru combaterea daunatorului ANARSIA L., tratamentul se va efectua cu:**

AFFIRM OPTI - 2,5 kg/ha, pauza 7 zile.

CORAGEN (VOLIAM - a doua denumire comerciala) - 175 ml/ha, 14 zile pauza.

VOCASAD - 175 ml/ha, se aplica la avertizare, de la dezvoltarea fructului (cand toate petalele au cazut) pana la fructul copt pentru cules.

### **Tratamentul se va efectua in perioada avertizata si pe timp liniștit, fara vant.**

#### **Alte recomandari:**

Verificati cu mare atentie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine, in conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si complearile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si Ordinul nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum si in conformitate cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor si Padurilor si al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,  
Micuț - Istrate Daniela

