


BULETIN DE AVERTIZARE NR. 3 din 13.03.2026
TRATAMENT PENTRU COMBATerea FORMELOR HIBERNANTE ALE DĂUNĂTORILOR, ÎN LIVEZI

Pentru combaterea stadiilor hibernante ale dăunătorilor, care iernează pe ramuri, pe scoarță și în crăpăturile ei, în solzii mugurilor, se recomandă efectuarea unui tratamentului fitosanitar, care să contribuie la diminuarea rezervei biologice a acestora și reducerea numărului de tratamente din timpul perioadei de vegetație.

AGENȚII DE DĂUNARE COMBĂTUȚI

Păduchele din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*) - larve hibernante; Păianjenul roșu al pomilor (*Panonychus ulmi*) - ouă hibernante; Acarianul roșu comun (*Tetranychus urticae*); Acarianul filocoptid (*Aculus schlechtendali*, *A. fockeui*); Acarianul galicol al frunzelor de păr (*Eriophyes pyri*); Păduchele lănos (*Eriosoma lanigerum*); Afide (*Aphis pomi*) - ouă hibernante; Puricele melifer (*Psylla pyri*, Păduchele testos al prunului (*Parthenolecanium corni*) și alți dăunători.



păduchele din San Jose
atac pe ramuri



păianjenul roșu
Panonychus u.- ouă



păduchele lănos
Eriosoma lanigerum



păduchele testos al prunului
Parthenolecanium corni

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, utilizând unul dintre produsele:

JUVINAL 10 EC - 0,1 % - omologat pentru combaterea păduchelului din San Jose sau

MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) - 0,450 kg/ ha + un adjuvant- TOIL - 0,5 %) sau **N-OIL** sau
produsele pe baza de ulei de parafina

ESTIUOIL (YAGOS) - 0,75 - 1 l/ 100 litri apă (3,75 - 15 l/ha) sau

OVIPRON TOP (VERNOIL) - 2,5 l/ 100 l apă atunci când se aplică singur și sau
- **1,5 l/ 100 l apă** în amestec cu un insecticid. sau

PLANTOIL/MIDOS OIL - 0,75 - 1 l/ 100 litri apă (3,75- 15 l/ha)

Produsele pe baza de ulei formează o peliculă continuă pe plantă , acționează prin contact, blochează respirația insectelor producând moartea acestora prin asfixiere. Pentru o eficacitate maximă, este recomandată aplicarea uleiurilor parafinice în amestec cu un insecticid. Ex: **MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) - 0,450 g/ha (0,03 %)**

Produsele pe bază de ulei de parafină nu sunt compatibile cu produse puternic alcaline, sulf, captan, folpet.

Nu se aplica timp de 30 de zile înainte sau după aplicarea sulfului sau a polisulfurii de calciu. Acolo unde aplicarea este urmată de aplicarea unor produse care conțin captan sau folpet, trebuie respectat un interval de cel puțin 20 de zile între aplicarea acestora și utilizarea produselor cu ulei de parafină la măr și păr și 7 zile pentru alte culturi. Pentru eficiența tratamentului, nu amestecați produsele pe bază de ulei cu produsele pe bază de cupru.

Pot fi utilizate și alte produse omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest)

MOMENTUL EFECTUĂRII TRATAMENTULUI

Tratamentul se va aplica la: - sfârșitul repausului vegetativ - până la „urechiușe de șoarece” la semănătoare
- sfârșitul repausului vegetativ - până la buton verde la sămburoase.



dezbugurit



urechiușe de șoarece



buton verde

Aplicarea tratamentului cu ulei horticol, după fenofazele menționate mai sus, poate afecta lăstarii tineri. Tratamentul se va efectua în zile cu temperaturi mai mari de 5 - 6°C, fără vânt (pentru evitarea driftului), atunci când nu există condiții de precipitații în timpul sau imediat după aplicare sau condiții de îngheț. Se vor utiliza aparate de stropit reglate pentru o pulverizare cât mai fină a soluției și se execută astfel încât toată suprafața pomilor să fie acoperită (îmbăiere).

Metode durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Alte recomandări

- ◆ Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- ◆ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- ◆ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);
- ◆ Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.
- ◆ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.
- ◆ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **Adresa de informare nr. 136 din 05.02.2026 a Oficiului Fitosanitar Suceava.**

Responsabil Prognoza și Avertizare
ing. Maria Platon