

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 5 din 13. 03. 2026

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ sunt aplicate atât împotriva dăunătorilor cât și pentru combaterea bolilor.

Incalzirea vremii, odata cu venirea primăverii, face ca organismele dăunatoare sa-si facă apariția, ieșind din locurile care le-au oferit adăpost pe parcursul iernii. Livezile și plantațiile de viță de vie sunt primele vizate, deoarece acestea fiindu-le gazdă în perioada rece, le va oferi în continuare condițiile de dezvoltare și înmulțire, dacă nu se intervine la timp și nu se vor lua măsurile de prevenție. Prevenția este cea mai buna modalitate de a tine sub control, de a diminua și chiar eradica rezervele biologice ale celor mai periculoase organisme daunatoare. Intervenind la timp, cand este momentul oportun, pentru a obține rezultate foarte bune cu eforturi minime și fara a face risipa de produse de protecție a plantelor, protejând astfel și mediul înconjurător.

Aceste tratamente sunt foarte importante deoarece reduc considerabil rezerva formelor hibernante ale Păduchelului din San-Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*), păduchelului lănos, omizilor defoliatoare, insectelor minatoare, acarienilor (ouă considerabilă a numărului de tratamente în perioada de vegetație și asigurând în același timp un start corect în perioada de vegetație a pomilor.

Pentru toate speciile pomicole și plantațiile de viță de vie, aflate în perioada de repaus vegetativ se recomandă măsuri de igienă culturală și tratamente fitosanitare pentru combaterea principalilor dăunători și boli.

Este indicat ca tratamentul să se execute cu puțin timp înainte de reluarea vegetației, perioadă în care formele de iernare ale insectelor devin active și sunt mai vulnerabile.

Se recomandă un tratament cu produse cuprice, urmat de tratamentul cu **ulei horticol și insecticid.**

În perioada de vegetație se vor monitoriza livezile și plantațiile de viță de vie, pentru a controla și combate organismele dăunătoare care apar în diferitele faze de dezvoltare a acestora.

Pentru combaterea rezervei de boli se recomandă unul din următoarele produse:

1. FUNGURAN–OH 300 SC (KOCIDE FLOW a 2 a denumire)

- Prun: 1,6-2.5 l / ha

- Vita de vie: 1.0-1.5 l/ha

2. ZEAMA BORDELEZA (BOUILLIE BORDELAISE) = 0,5%.

- Gutui: 3.75-5.0 kg/ha

- Mar : 3.75- 5.0 kg/ha

- Par : 3.75- 5.0 kg/ha

- Vita de vie: 3.75- 5.0 kg/ha

Combate pătarea, ciuruirea frunzelor și monilioza la cireși, vișin, prun și bășicarea, ciuruirea și monilioza la piersic, mana vitei de vie

3. CHAMP 77 WG(COPPERMAX a 2 a denumire)

- Mar: 2 kg/ ha

- Vita de vie: 2.0 kg/ha

4. ALCUPRAL 50 PU

- Gutui: 4.5kg/ha

- Mar, Prun, Cires, Visin : 2.0 kg/ha

- Par: 3.0 kg/ha

- Vita de vie: 1.5- 2 kg/ha

Pentru combaterea rezervei de dăunători se recomandă următoarele produse:

1. MOSPILAN 20 SG(Krima a2 a denumire)

- Prun ,Mar: 0.450kg/ha +0.5% adjuvant

- Par: 0.200 kg/ha +0.5 % adjuvant



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str.Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anfof.ro, cod poștal 080583,

- Vita de vie: 0.250 kg/ha+ 0.5% adjuvant

Combate Păduchele din San-Jos (larve hibernante), păianjenul roșu, afide.molia vitei de vie.

. OVIPRON TOP / VERNOL (s.a. -ulei de parafina 800g/l) - 2500 ml / 100/ l apa sau (1500 ml / 100 l apa in amestec cu un insecticid) la speciile de: Mar, par, prun, cais, piersic, nectarin, cires sau

3. JUVINAL 10 EC - 0,1% (larve hibernante in perioada de iarna) – speciile: Măr, prun sau

4. PLANTOIL / MIDOS OIL- 3,75—15 l/ha.(Păduchele din San Jose- larve hibernante perioada de iarnă) sau alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României

Aplicarea se face în luna martie, la dezmugurit , până la urechiușă de șoarece la sămânțoase și buton verde la sămburoase, pentru a proteja pomii de eventualele infestari din primavară.

Aceleași tratamente se pot aplica și în plantațiile de vita de vie, pentru controlul și diminuarea rezervei de boli și dăunători.

Tratamentele se aplică pe scoarța uscată, în zile cu temperaturi pozitive, ideal peste 5-6°C, în zile însorite, cu tendință de creștere, fără vânt.

Pulverizarea trebuie realizată uniform pe întreaga suprafață a trunchiului și ramurilor, începând din interiorul coroanei și mergând către exterior, de sus în jos. Tratamentele se execută prin îmbăierea pomilor (1.500 l soluție/ha).

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Avizat,
Coordonator OF Giurgiu
Țăranu Mihaela

Elaborat,
Cojocar Mariana

Imagini din data de 13.03.2026 Giurgiu

