

NR. 251 DATA 24.03.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 10 din 24.03.2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea buruienilor, bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la următoarele culturi de cereale păioase:

GRAU, ORZ SI TRITICALE

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene, daunători și boli foliare. Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele de protecție a plantelor -erbicide, după caz:

- DICOPUR TOP 464 SL (CEREDIN FORTE 464 SL) = 0,8 - 1 l/ha sau
- DICOPUR M = 1 l/ha sau
- ATLANTIS FLEX = 0,2 l/ha - 0,33 l/ha (în funcție de gradul de îmburuienare și buruienile rezistente - iarbă vântului, odos, coada vulpii, muștel se va da doza maximă) sau
- GRANSTAR SUPER 50 SG (CAMEO MAX) = 40 g/ha când e deficit hidric se aplică adjuvant TREND în doza 250 ml/ha se aplică de la înfrățit până la apariția frunzei standard iar apa se va folosi 500 l/ha) sau
- HELMSTAR 75 WG (TRIMEO) = 10-20 g/ha (15-20 g/ha la grau, triticale - și 10-15 g/ha la orz)

Dacă în cultura și-au făcut apariția :

Boli foliare: Făinare (*Erysiphe graminis*), Fuzarioza (*Giberella zeae*), Pătarea brună (*Septoria tritici*)
Daunători: Păduchele verde al cerealelor (*Schizaphis graminum*), Muștele cerealelor (*Oscinella frit* și *Delia coarctata*)

Concomitent cu erbicidatul puteți aplica pentru infecția primară la boli și prezenta daunătorilor următoarele amestecuri de fungicide și insecticide:

KING 250 EW = 0,5 L/HA + DELTAGRI (FASTER DELTA) = 0,3 L/HA sau
NATIVO 300SC (TWIST PLUS) = 0,8 L/HA + CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC) = 0,1 L/HA sau
FALCON PRO (IMPULSE PRO 425 EC) = 0,6 L/HA + REXARIS 25 WG = 0,3 KG/HA

Perioada optimă de tratament: înfrățire păioaselor până la formarea primului internod și altele până la apariția frunzei standard iar palamida să nu depășească 10-15 cm înălțime.
Cantitatea de apă folosită la hectar variază între 200-400 l.

***SE VA RESPECTA CU STRICTETE PERIOADA DE ERBICIDARE RECOMANDATA A PRODUSULUI FOLOSIT.** Se vor folosi numai produse de protecția plantelor omologate.

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe: <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html> - <https://aloe.anfd.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA-guest și dați căutare în PEST-EXPERT. Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, manși, manși) la manuirea produselor de protecția plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de betoni. Aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploi cu temperaturi pozitive peste 8 -10 grade Celsius..Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatatii agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitară și Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016) privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.;A.F; I.I)-----
Sediul(adresa)-----
Ferma-----


REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuarii tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recolta rii produs ului agricol	Nr. si Data Documen tului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori i/ buruieni	Denu-mirea Ppp folosit	Doza Omo-logata /doza folo-sita	Su-pra - fat a (ha)	Cantit . Utili-zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
CROITORU Dorin Catalin




INTOCMIT
UNGUREANU C-tina

