

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr.15 din 25. 03.2026**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la specia: **PRUN**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **HOPLOCAMPA MINUTA** (viespea neagră a prunelor); **EURYTOMA SCHREINERII** (viespea smburilor de prun).

***HOPLOCAMPA MINUTA** (viespea neagră a prunelor), ierneaza in stadiul de larva ajunsa la completa dezvoltare, in solul de sub scoarta pomilor, la 2 -10 cm adancime, intr-un cocon matasos. Prin luna martie, cand temperatura solului depaseste 5-6 C, larvele se transforma in pupe. Aparitia adultilor are loc in prima decada a luni aprilie. In perioada zborului viespile se hranesc cu nectarul si polenul de la pomii cu inflorire timpurie. La 3- 4 zile de la aparitie are loc copulatia si dupa 2- 3 zile depunerea oualor. Primele oua sunt depuse la inceputul infloririi pomilor. Larvele aparute rod corionul oului si epiderma uscata a sealei in care a fost facuta incizia la depunerea oului. Locul preferat de patrundere a larvelor este partea superioara a fructului.*

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: rezerva biologica >15% pentru daunatori si 10-15 % pentru boli.

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. LASER 240 SC – 0,6 l/ha. sau

2. KARATE ZEON /NINJA - 0,15 l/ ha. sau

3. DELTAGRI / FASTER DELTA – 0,3 l/ha sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **MONILINIA FR. (MONILIOZA); CORYNEUM BEIJERINCKII (CIURIREA FRUNZELOR); POLISTIGMA RUBRUM (PATAREA ROSIE A FRUNZELOR).**

***MONILINIA FR.** (monilioza), atacul se manifesta pe ramuri ,frunze, flori, fructe in diferite faze de dezvoltare. Primavara, in timpul infloritului, unele ramuri tinere incep sa se vestejeasca. Frunzele si florile se brunifica si se usuca. Atat pe scoarta ramurilor atacate, cat si pe flori, apare un mucegai cenușiu – galbui alcatuit din miceliul cipericii.*

***CORYNEUM BEIJERINCKII** (ciurirea frunzelor), sunt atacate frunzele si in masura mai mica lastarii si fructele. Pe frunze apar pete mici, circulare, brune-cenusii, delimitate de o aureola mai inchisa la culoare. Tesutul din dreptul lor se necrozeaza, se usuca. Cand numarul petelor este mare frunza apare ciuruita. Cand punctele de infectie sunt apropiate apar pete confluyente, ramanand goluri de dimensiuni diferite. Pe lastari apar pete brune- cenușii, scoarta se necrozeaza, miceliul patrunde in profunzime, tesuturile se degradeaza si se produc ulcere care sunt evidente. Pe fructe, atacul se intalneste numai la soiurile de prun foarte sensibile. Se manifesta sub forma unor pete mici, cenușii, cu o zona marginala mai inchisa la culoare.*

1. CAPTAN 80 WDG /CAPTADIN - 1,5 kg./ha. sau

2. SIGNUM / SYREX STAR - 0,5 kg./ ha. sau

3. ALCUPRAL 50 PU - 1,5 - 2,0 kg./ha sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **FENOFAZA “ BUTON ALB”**

Alte recomandari:

Perioada de tratament se prelungește cu numărul de zile nefavorabile din cauza precipitațiilor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,
Maria BOGDAN