

Oficiul Fitosanitar Olt  
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165  
Slatina

T +40787603972  
F +40(249)436234  
e-mail: ufjolt@yahoo.com  
ofolt@anf.ro

Nr. 584/O/03.04.2026

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 2 din 03.04.2026

**Rapita** (*Brassica napus*) este o planta erbacee anuala ce ocupa un loc deosebit in economia mondiala. Semintele sale reprezinta o sursa bogata in uleiuri vegetale, utilizate in alimentatie sau in industrie (biocombustibil). Cultura de rapita are urmatoarele avantaje: are reactie favorabila la fertilizare, se poate cultiva mecanizat, se seamana si se recolteaza in afara perioadelor aglomerate, este o buna planta premergatoare si melifera.

### Principalele boli ale culturii de rapita:

**Putregaiul alb** (*Sclerotinia sclerotiorum*)-Plantele bolnave se ingalbenesc si se oflesc. In partea inferioara se observa pete de culoare deschisa, de culoare alba sau galben-deschis. Cu timpul petele se maresc, se brunifica si se acopera cu o pasla alba ce reprezinta fructificatiile ciupercii. Ciuperca ierneaza in sol sub forma de scleroti. In primavara, un sclerot poate produce una sau mai multe apotecii. Apoteciiile au forma de cupa, palnie sau disc. Culoarea lor este variata, de la crem la brun.

**Putregaiul cenusiu** (*Botrytis cinerea*)-Putregaiul cenusiu este o boala provocata de ciuperca *Botrytis cinerea*. Aceasta se transmite de la un an la altul prin miceliul prezent in resturile vegetale. In culturile de rapita din camp, pe organele atacate se vor forma conidioforii cu conidii, care sunt purtati de vant si picaturile de ploaie, favorizand aparitia infectiilor pe alte plante. Astfel, putregaiul cenusiu poate afecta frunzele, tulpinile, inflorescentele si silicvele plantei de rapita.

**Alternarioza** (*Alternaria brassicae*)-Pe silicve se dezvolta pete mici, punctiforme sau liniare, negricioase. Petele se extind si acopera portiuni mari. Silicvele puternic atacate nu se mai dezvolta si se deschid usor, lasand sa se scuture semintele. La suprafata petelor se dezvolta o pulbere brun-negricioasa, formata din conidioforii si conidiile ciupercii.

**Fainarea** (*Erysiphe communis*)-Fainarea la rapita este o boala provocata de ciuperca *Erysiphe communis*, care apare cu precadere toamna, uneori si primavara. Infectia provocata de fainare poate afecta intreaga suprafata foliară a plantei din cauza fructificatiilor ciupercii.

#### Factori favorizanti

Aparitia fainarii la rapita este favorizata de urmatoorii factori:

- Umiditate crescută, de peste 80%;
- Toamne lungi și călduroase.

Obtinerea unor productii ridicate si de calitate superioara se realizeaza prin combaterea agentilor fitopatogeni.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la (cultura): RAPITA, pentru urmatoarele boli:

-Putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*)

-Putregaiul cenusiu (*Botrytis cinerea*)

-Alternarioza (*Alternaria brassicae*)

-Fainarea (*Erysiphe communis*)

cu urmatoarele produse:-**CARAMBA TURBO-1,0 L/Ha**

-**FEZAN-1 L/Ha**

-**ZIZAN 500 SC / AMBROSSIO 500 SC-0,5L/Ha**

-**TEBUSTAR EW/MYSTIC TOP-1L/Ha**

-**ORIOUS 25 EW/ SALVATOR 25 EW-1L/Ha**

-**MATIZ/ ERASMUS-1L/Ha**

-**PROTECTOR SUPER 250 EC/ VIP 250 EC- 1,0L/Ha**

-**FOLICUR SOLO 250 EW/VALOR 250 EW-1L/Ha**

-**PICTOR ACTIVE/ CAPARTIS -0,6-1,0 L/Ha** (certificatul de omologare expira la

15/09/2026);

iar pentru -Putregaiul alb

-Putregaiul cenusiu

-Alternarioza,

**AMISTAR / MIRADOR 250SC-0,75-1,0 L/Ha**

Alte recomandari:

**Verificati cu mare atentie recomandarile, cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!**

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!**

**In afara produselor de protectie a plantelor mentionate ma sus se pot utiliza si altele ( consultati PESTEXPERT).**

Tratamentele efectuate se vor mentiona in **REGISTRUL DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU P.P.P.**

Nume și prenume persoana juridical:

Domiciliu fermier/sediul social al societatii:

(Comuna, Judetul:

Ferma (nume/număr, adresa):

**REGISTRU\***  
**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor(PPP)**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / Fenofaza cultura	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a dat consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată / doza folosită (kg,l)	Suprafața , ha			

**Producatorul agricol are obligatia de a numerota paginile registrului. La spatele registrului se va mentiona numarul de pagini. Va pune semnatura producatorului sau a administratorului (stampila dupa caz). Registrul de tratamente fitosanitare cu ppp se va pastra 3 ani.**

**Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse oentru protectia plantelor);**

**Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.**

**Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.**

Responsabil Prognoza si Avertizare,

**Băloi Monalisa**