


NR.389/03.04.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 7/ 03.04.2026

Bășicarea frunzelor la piersic (*Taphrina deformans*) produce pagube semnificative, mai ales la nectarin și piersica cu pulpa galbena. Condiții meteo favorabile sunt: umiditate relativă mai mare de 95% și temperaturi de 10-20 grade Celsius, însă infecția se poate produce și la temperaturi mai mici de 5 grade Celsius. Frunzele infectate sunt bășicate, se încrețesc, cresc inegal și pot prezenta pete roșii și pete albăgintii, formate din asce cu ascopori. Atacul poate trece și prin fructe, care nu se pot dezvolta normal.



Ciuruirea frunzelor (*Stigmata carpophila*) produce pagube importante în livezile de sămburoase. Pe frunze după dezmgurire, se formează pete mici circulare, solitare, de culoare roșietică violetă sau brună gălbuie. Pe fructe apar pete de timpuriu, la început sunt mici, punctiforme, treptat devin circulare, de 1-2 mm în diametru, brune sau brun-roșii.

Monilioza (*Monillinia spp.*) se manifesta pe ramuri, frunze, flori și fructe. Lăstarii și florile atacate nu produc fructe. Organele atacate se ofilesc brusc, ducând la pierderi de recoltă de până la 60-90%. Organele atacate, ofilite și uscate rămân pe pomi până toamna sau chiar în timpul iernii.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la sămburoase cu:

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala) - 0,15-0,2 l/ha sau,

ALCUPRAL 50 PU - 1,5-2kg/ha sau,

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala) - 0,35% (3,5 l/ha în 1000 l apa) sau,

BOUILLIE BORDELAISE WDG/(BORDOMIX - a doua denumire comerciala)- 0,5% (5,0 kg/ha sau,

SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)- 0,5kg/ha.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST-EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola **guest**) pentru testele avertizate.

Alte recomandari:

La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România.

Atentie!

Sa se utilizeze numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor care se regăsesc în baza de date PEST- EXPERT.

Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatare, precum și;

REGISTRUL
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării / faza fenofazei culturii | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumirea ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața | Cantități utilizate (kg, l) | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI

Coordonator O.F.Z. Braila- Tulcea
Prodan Tudorița

Întocmit,
Filciu Minodora