

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 24 din 17.04.2026

CULTURA DE CARTOF se va erbicida pentru combaterea :


➤ **Buruienilor monocotiledonate.**

- **Pir târâtor** (*Agropyron repens*), buruiana graminee perena, cu rizomi albi, subterani, taratori. Crește pe aproape toate tipurile de sol dar în special pe soluri mai fertile, compacte, bogate în substanțe nutritive.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Agropyron-repens>

- **Pirul gros** (*Cynodon dactylon*), buruiana graminee perena, care prin stolonii pe care-i dezvoltă, formează un covor foarte rapace. Se poate dezvoltă pe orice tip de sol, dar preferă regiunile secetoase și calde din zonele subtropicale.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Cynodon-dactylon>

- **Coadă vulpii** (*Alopecurus myosuroides*), buruiana graminee anuală sau anuală hibernantă cu creștere sub formă de tufă. Preferă soluri mijlocii până la grele, bogate în calciu, freatice sau moderat umede.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Alopecurus-myosuroides>

- **Iarba vantului** (*Apera spica-venti*), buruiană monocotiledonată anuală cu înmulțire prin semințe și o capacitate de înfrățire puternică, ce preferă solurile ușoare și răcoroase, indicatoare a unei posibile lipse de calciu.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Apera-spica-venti>

- **Odos** (*Avena fatu*), graminee paniculata foarte asemanatoare cu ovazul cultivat. Prefera soluri grele, bogate in calciu, racoroase pana la umede, argiloase si lutoase



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Avena-fatua>

- **Mohor** (*Setaria glauca*), graminee anuala iubitoare de caldura, din subfamilia

Paniceae cu puternica inmultire prin seminte. Prefera soluri bogate in elemente nutritive, luto-nisipoase pana la nisipo-lutoase usoare.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Setaria-glauca>

- **Costrei** (*Sorghum halepense*), buruiana graminee perena, care formeaza rizomi si prefera zonele calduroase. Se inmulteste prin seminte si rizomi.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Sorghum-halepense>

➤ **Buruienilor dicotiledonate.**

- **Stir salbatic** (*Amaranthus retroflexus*), buruiana anuala cu inmultire prin seminte foarte raspandita indeosebi pe soluri permeabile, bogate in humus si in substante nutritive, in special in azot.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Amaranthus-retroflexus>

- **Loboda** (*Atriplex patula*), buruiana anuala dioica, se inmulteste prin seminte, cu forme multiple, avand o radacina pivotanta ramificata; foarte asemenatoare cu spanacul salbatic. Prefera solurile fertile, humifere si profunde. Mai putin raspandita decat spanacul salbatic.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Atriplex-patula>

- **Palamida** (*Cirsium arvense*), buruiana perena cu radacina pivotanta profunda, la inceput verticala, apoi ramificata pe orizontala in adancime prin indoire sub forma de genunchi, fara latex, iubitoare de azot.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Cirsium-arvense>

- **Trosot** (*Polygonum aviculare*), buruiana anuala cu inmultire prin seminte,

cu radacina fusiforma, foarte diferita ca habitus si forma a frunzelor de la un an la altul. Nepretentioasa, creste aproape pe toate tipurile de sol.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Polygonum-aviculare>

- **Susai** (*Sonchus arvensis*), buruiana perena cu stoloni care se dezvoltă rapid în

sol și posedă ramificații foarte dense, purtătoare de muguri vegetativi, produce un latex vegetal. Preferă soluri umede, lutoase, cu un strat superficial impermeabil.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Sonchus-arvensis>

- **Rocoina** (*Stellaria media*), buruiana anuala sau anual-hibernanta cu inmultire

prin seminte, care acoperă solul în primăvară cu o rețea deasă, fără flori, confundabilă cu *Anagallis arvensis*. Iubeste solurile bune, friabile, humifere, bogate în azot, bine aprovizionate cu apă.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Stellaria-media>

Pentru erbicidare se vor folosi următoarele produse astfel:**• Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale :**

- GARDO SUN - 1,9 l/ha - aplicat preemergent, de la semănat până când cotiledoanele se apropie de suprafața solului dar înainte de răsărire.
- BOXER 800 EC (PIROSEO - a doua denumire comerciala) - 3,0-5,0 l/ha - aplicat preemergent.

• Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate:

- STOMP AQUA (PROWL AQUA - a doua denumire comerciala) - 2,0-4,0 l/ha - aplicat preemergent.
- TITUS 25 DF (TAROT - a doua denumire comerciala) - 40-60 g/ha + VIVOLT 0,1% surfactant - aplicat postemergent.

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;
- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.
- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt. Nu aplicați tratamentul daca viteza vântului este mai mare de 4-5 m /s.
- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;
- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către „COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito-sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenții următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. [1.107/2009](#) privind **introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor autorizate;**
- **nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează:**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU**DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fe-nofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.**Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.****Buletinul de avertizare îl puteți consulta accesând linkul: <https://www.anfdf.ro/>, secțiunea Structuri teritoriale – Buletine de avertizare**

INSPECTOR COORDONATOR,

ing. Magdea Emilian Traian

ÎNTOCMIT,

dr. ing. Buciumaș Georgeta