

**BULETIN DE AVERTIZARE****Nr. 22 din 14. 04. 2026**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de: **CAIS, PIERSIC, NECTARIN.**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **ANARSIA LINEATELLA** (molia vargată a piersicului) – **GEN I** și alți daunatori (afide, omizi defoliatoare) .

**ANARSIA LINEATELLA** (molia vargată), *prezintă trei generații pe an. iernezează în stadiul de larvă, de vârsta a treia și a patra, sub scoarța ramurilor. În luna aprilie, când temperatura aerului este de 8-9 C, la umflarea mugurilor, larvele hibernante părăsesc adaposturile de iernare, se hrănesc cu muguri, apoi migrează la varful lăstarilor în care rod orificii de pătrundere; aici ele rod câte o galerie orientată spre locul de inserție a lăstarilor. În evoluția sa, larva atacă până la 6 lăstari. Prima generație, de primăvară, se dezvoltă în lunile mai și iunie. Zborul fluturilor durează 20 -22 zile, perioadă în care femelele depun pontele. Incubația durează 5 –11 zile. După eclozare larvele patrund în fructe. Apariția și zborul fluturilor din prima generație se esalonează pe o perioadă de 3 – 4 săptămâni.*

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr. 1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE ( peste 15% lăstari atacați).**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- 1. CORAGEN / VOLIAM – 175 ml./ha. sau**
- 2. AFIRM OPTI - 2,5 kg./ha sau**
- 3. KARATE ZEON / NINJA – 0.150 l/ha sau**

**alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.**

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **TAPHRINA DEFORMANS** (basicarea); **STIGMINA CARPOPHILA** (ciuruirea) ; **MONILINIA SP.** ( monilioze) .

**TAPHRINA DEFORMANS** ( basicarea frunzelor de piersic ), ciuperca se transmite, de la un an la altul, sub forma de miceliu, care trăiește pe scoarta ramurilor sau între solzii mugurilor. Frunzele, în special din treimea superioară a lăstarilor, sunt deformate și basicate. Porțiunile atacate au la început o colorație roșiatică, apoi se îngălbenesc, se brunifică și cad. Pe partea inferioară a acestor umflături se formează o pulbere albicioasă. Ramurile sunt golase, sunt mai scurte și uneori curbate.

**STIGMINA CARPOPHILA** ( ciuruirea frunzelor ), ciuperca se transmite de la un an la altul prin miceliul din scoarta ramurilor bolnave și prin conidiile aflate în gomele de pe ramuri. Pe lăstari și ramuri de constata pete adâncite de culoare purpurie. Cu timpul zonele atacate se necrozează, scoarta crăpă și apar scurgeri de clei. La atacuri intense lăstarii se usucă.

Pe frunze atacul se manifestă sub forma unor pete circulare de 2-3 mm, la început violacee, iar mai târziu cafenii-roscate, limitate de o margine roscată. Cu timpul petele confluează și se usucă și cad.

Pe cais din momentul când fructele au 2 cm și până la maturitate, se formează pete mici, circulare, de 1-3 mm de culoare roșie-închis. Cu timpul țesutul din dreptul petelor se necrozează și capătă un aspect zgrunțuros.

**MONILINIA SP.** ( monilioze), ciuperca se transmite de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarta ramurilor și în fructele mumificate.

În anii cu primăveri ploioase și racoroase monilioza poate provoca uscarea florilor, lăstarilor și ulcerării pe ramuri. Pe buchetele florale și flori boala se manifestă prin ofilire bruscă.

Florile atacate se usuca, capata nuante brun – roscate si raman pe ramuri. Lastarii atacati se usuca de la varf spre baza cu tot cu frunze.

1. **SIGNUM /SYREX STAR - 0,5 kg./ ha sau**
2. **SCORE 250 EC / MAVITA 250 EC - 0,15 l/ha. sau**
3. **SYLLIT 400SC -2.0 l/ha sau**
4. **LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,5 l/ ha sau**

**alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.**

Perioada optimă de tratament: **FORMAREA FRUCTELOR.**

**Alte recomandari:**

În cazul apariției precipitațiilor, perioada de tratament se prelungeste cu numărul de zile nefavorabile!

La prepararea solutiei se vor respecta toate instructiunile de folosire, de pe eticheta produsului!

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!**

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine în conformitate cu :Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,  
Maria BOGDAN