

**BULETIN DE AVERTIZARE****Nr. 25 din 14. 04. 2026**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de : **VARZĂ**  
Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **DELIA BRASSICAE (MUSCA VERZEI);**  
**TRIALEURODES VAPORARIORUM** (musculita alba de sera); **APHIS SPP.**(afide).

**DELIA BRASSICAE** (musca verzei), *ierneaza in stadiul de pupa in sol. In primavara are loc transformarea pupelor in insecte adulte. Aparitia insectelor are loc, cand se realizeaza pragul inferior de dezvoltare de 9 C. La cateva zile de la aparitie are loc copulatia insectelor, iar dupa 8 -10 zile depunerea oualor. Femelele depun ouale izolat sau in grupuri mici, pe sol, la baza plantelor si in apropierea coletului. Larvele aparute se hranesc cu radacinile tinere sau patrund in radacini, sapand galerii. In galerii pot fi intalnite mai multe larve. Ajunse la completa dezvoltare, prin luna iunie, larvele parasesc radacinile plantelor atacate, si in apropierea acestora, se transforma in pupe. Adultii din noua generatie apar in luna iulie si, dupa copulatie, depun ouale, infestand culturile de varza de toamna si conopida.*

**TRIALEURODES VAPORARIORUM** (musculita alba de sera), adultul are culoarea galbuie, de 1,2- 1,6 mm lungime, corpul impreuna cu aripile, picioarele si antenele sunt acoperite de o secretie pulverulenta de un alb imaculat, ochi rubinii. Atacul poate fi intalnit in culturile de tomate, vinete si ardei, castraveti in sere si solarii. Atacul musculitei albe are loc pe partea inferioara a frunzelor, de unde adultii si larvele absorb continutul celular prin intepare. Pe partea superioara a aparatului foliar apar secretii zaharate.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE.**

**Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de mai jos:**

- 1. BENEVIA - 0,75 l/ha sau**
- 2. DELMUR/JOLPOLT - 500 mL/ha sau**
- 3. DECIS EXPERT 100 EC – 75 mL/ha sau**

**alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.**

Perioada optimă de tratament: **LA PRIMELE ECLOZARI SI APARITIA PE PLANTE A LARVELOR.**

**Alte recomandari:**

Cititi cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor); Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor;

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,  
Maria BOGDAN