AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL BUZĂU – IALOMIȚA

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU , Str. Frasinet nr 3 , Buzău , județul Buzău ,
Tel : 0238.437.884 , Email : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 19 / 29 .04. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenți de daunare la culturile de cereale paioase .

Ploșnița cerealelor (Eurygaster integriceps)

Ploșnița cerealelor are un corp cu formă ovală cu o lungime cuprinsă între 11 și 13 mm. Coloritul acesteia poate varia considerabil, de la nuanțe deschise de galben-maroniu până la negru intens. Un element distinctiv important este capul triunghiular, care are în partea anterioară o extremitate trilobată, trăsătură esențială pentru identificarea speciei.
Atunci când atacul are loc în faza de burduf, spicul poate rămâne blocat și nu reușește să iasă complet. Dacă insectele se hrănesc în stadii mai avansate de dezvoltare a plantei, aristelor li se modifică forma, florile sunt afectate, iar spicul capătă o tentă albicioasă. Boabele tinere supuse atacului rămân subdezvoltate, iar cele ajunse în faza de coacere își pierd din greutate și calitățile tehnologice necesare panificației.

COMBATERE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire come

Grau	Dăunători	Eurygaster integriceps (Plosnita cerealelor)	0,2 L/ha	30 zile	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,100 kg/ha	-	-

DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)

Cereale de toamna si de primavara	Dăunători	Afide ale spicului, plosnita cerealelor, gandacul balos, viermele rosu al paiului	0,3 L/ha	30 zile	-

Făinarea grâului (Erysiphe graminis)

Făinarea - *Erysiphe graminis* - se numără printre cel mai des întâlnite boli foliare ale cerealelor păioase. Nivelul de agresivitate şi evoluţia bolii sunt influenţate de condiţiile geografice şi climatice. Boala poate compromite până la 25% din producţia de cereale, când infecţia este puternică, iar efectele ei diferă în funcţie de anotimpul în care se manifestă.

Rugina brună (*Puccinia recondita*)

Rugina brună (*Puccinia recondita*), cea mai răspândită boală foliară a grâului, se manifestă prin pustule mici, de culoare brună-ruginie, pe partea superioară a frunzelor, scăzând drastic producţia şi calitatea recoltei. Atacul este favorizat de primăveri calde/umede,

COMBATERE

VIATOR XPRO 225 EC (ZANTARA XPRO - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii de grau, alternarioza, septorioza, fainarea, rugina bruna, sfasierea frunzelor	0,8-1,0 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal		-
orz	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii, fainarea, rugina galbena, arsura funzelor, sfasierea frunzelor	0,6-0,8 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal		-
Secara	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii de grau, alternarioza, septorioza, fainarea, rugina bruna, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor	0,8-1,0 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal		-
triticale	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii de grau, alternarioza, septorioza, fainarea, rugina bruna, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor	0,8-1,0 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal		-

FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-

NATIVO PRO 325 SC / (DELARO 325 SC - a doua denumire comerciala)

Grau de toamna si primavara	Boli	Septorioza, fainarea, rugina galbena si rugina bruna	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau de toamna si primavara	Boli	Fusarioza	0,7 L/ha	35 zile	-
Orz de toamna si primavara	Boli	Fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor	0,6 l/ha	35 zile	-
triticale	Boli	Septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fusarioza	1,0 l/ha	35 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectu-ării tratam. (ziua luna, anul)	**Cultura şi locul unde este situat terenul**	**Tim-pul apli-cării**	**Tratamentul efectuat**					**Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura**	**Data începe-rii recol-tării produsului agricol**	**Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei**
			Agentul de dău-nare: boli/ dă-unători/ buruieni	**Denu-mire ppp folosit**	**Doza omolo-gată /doza folosită**	**Supra-faţa, ha**	**Canti-tăţi utili-zate (kg, l)**			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).