

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 25 din 17.04.2026

CULTURA DE PORUMB BOABE se va erbicida pentru combaterea :


➤ **Buruienilor monocotiledonate.**

- **Pir târâtor** (*Agropyron repens*), buruiana graminee perena, cu rizomi albi, subterani, taratori. Crește pe aproape toate tipurile de sol dar în special pe soluri mai fertile, compacte, bogate în substanțe nutritive.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Agropyron-repens>

- **Pirul gros** (*Cynodon dactylon*), buruiana graminee perena, care prin stolonii pe care-i dezvoltă, formează un covor foarte rapace. Se poate dezvoltă pe orice tip de sol, dar preferă regiunile secetoase și calde din zonele subtropicale.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Cynodon-dactylon>

- **Coadă vulpii** (*Alopecurus myosuroides*), buruiana graminee anuală sau anuală hibernantă cu creștere sub formă de tufă. Preferă soluri mijlocii până la grele, bogate în calciu, freatică sau moderat umede.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Alopecurus-myosuroides>

- **Iarba vantului** (*Apera spica-venti*), buruiană monocotiledonată anuală cu înmulțire prin semințe și o capacitate de înfrățire puternică, ce preferă solurile ușoare și răcoroase, indicatoare a unei posibile lipse de calciu.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Apera-spica-venti>

- **Odos** (*Avena fatua*), graminee paniculata foarte asemanatoare cu ovazul cultivat. Prefera soluri grele, bogate in calciu, racoroase pana la umede, argiloase si lutoase



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Avena-fatua>

- **Mohor** (*Setaria glauca*), graminee anuala iubitoare de caldura, din subfamilia

Paniceae cu puternica inmultire prin seminte. Prefera soluri bogate in elemente nutritive, luto-nisipoase pana la nisipo-lutoase usoare.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Setaria-glauca>

- **Costrei** (*Sorghum halepense*), buruiana graminee perena, care formeaza ri zomi si prefera zonele calduroase. Se inmulteste prin seminte si rizomi.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-monocotiledonate/Sorghum-halepense>

➤ **Buruienilor dicotiledonate.**

- **Stir salbatic** (*Amaranthus retroflexus*), buruiana anuala cu inmultire prin seminte foarte raspandita indeosebi pe soluri permeabile, bogate in humus si in substante nutritive, in special in azot.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Amaranthus-retroflexus>

- **Loboda** (*Atriplex patula*), buruiana anuala dioica, se inmulteste prin seminte, cu forme multiple, avand o radacina pivotanta ramificata; foarte asemenatoare cu spanacul salbatic. Prefera solurile fertile, humifere si profunde. Mai putin raspandita decat spanacul salbatic.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Atriplex-patula>

- **Palamida** (*Cirsium arvense*), buruiana perena cu radacina pivotanta profunda, la inceput verticala, apoi ramificata pe orizontala in adancime prin indoire sub forma de genunchi, fara latex, iubitoare de azot.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Cirsium-arvense>

- **Troscot** (*Polygonum aviculare*), buruiana anuala cu inmultire prin seminte, cu radacina

fusiforma, foarte diferita ca habitus si forma a frunzelor de la un an la altul. Nepretentioasa, creste aproape pe toate tipurile de sol.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Polygonum-aviculare>

- **Susai** (*Sonchus arvensis*), buruiana perena cu stoloni care se dezvoltă rapid în

sol și posedă ramificații foarte dense, purtătoare de muguri vegetativi, produce un latex vegetal. Preferă soluri umede, lutoase, cu un strat superficial impermeabil.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Sonchus-arvensis>

- **Rocoina** (*Stellaria media*), buruiana anuala sau anual-hibernanta cu inmultire

prin seminte, care acopera solul in primavara cu o retea deasa, fara flori, confundabila cu *Anagallis arvensis*. Iubeste solurile bune, friabile, humifere, bogate in azot, bine aprovizionate cu apa.



<https://www.cropscience.bayer.ro/e-Tools/Ghidul-buruienilor/Ghid-de-buruieni-dicotiledonate/Stel-laria-media>

Pentru erbicidare se vor folosi următoarele produse astfel:

❖ Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale :

- TITUS 25 DF (TAROT - a doua denumire comerciala)+ 40-60 g/ha + VIVOLT 0,1% surfactant. Se aplica postemergent, în stadiul de 1 – 7 frunze a porumbului;
- ADENGO 465 SC (KOLOSS 465 SC - a doua denumire comerciala), combate buruieni anuale - 2,0-4,0 l/ha, aplicat preemergent;
- STOMP AQUA (PROWL AQUA - a doua denumire comerciala) – 2,0-4,0 l/ha, aplicat preemergent;

❖ Buruieni dicotiledonate anuale și perene :

- MUSTANG (VECTOR - a doua denumire comerciala) - 0,4 – 0,6 l/ha, aplicat postemergent (porumb 4 – 6 frunze).

Alte Recomandări importante :

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

- produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează ;
- resturile de soluții sau apă rezultată în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie să ajungă în apropierea apelor de suprafață, șanțuri etc.
- executarea tratamentului, pe timp liniștit fără vânt. Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m /s.
- citiți cu atenție eticheta produsului pe care îl folosiți ;
- la realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică și chimică.

- Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către „COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito-sanitare și îndeplinirea condițiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 și specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/128/CE și, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 și în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejării sănătății oamenilor și a animalelor, protecției albinelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de uz

fitosanitar din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenții următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. [1.107/2009](#) privind **introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor autorizate;**
- **nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează:**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fezofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Buletinul de avertizare îl puteți consulta accesând linkul: <https://www.anfdf.ro/>, secțiunea Structuri teritoriale – Buletine de avertizare

INSPECTOR COORDONATOT,

ing. Magdea Emilian Traian

ÎNTOCMIT,

dr. ing. Buciumaș Georgeta