

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 17 din 20.04.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva agenților de dăunare: RAPĂN (*Venturia i.*), FĂINARE (*Podosphaera l.*). Tratamentul este preventiv și curativ pentru boli.


RAPĂNUL (*Venturia inaequalis*)

Pe frunzele afectate de patogen apar pete de culoare cafenie-negricioasă, catifelate. La evoluția bolii acestea se unesc și acoperă frunza. În urma atacului, frunzele se usucă și cad. Fructele pot fi atacate în toate stadiile de dezvoltare. Pe acestea apar pete cenușii, catifelate. Ulterior, fructele se deformează, crapă și, în cazul unui atac timpuriu, cad din coroană. Pulpa acestora capătă în ultimă instanță un gust fad. Boala se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu de rezistență. Ciuperca iernează pe frunzele infectate căzute pe sol, sau ca miceliu de rezistență pe ramuri.

**FĂINAREA (*Podosphaera leucotricha*)**

Este destul de ușor să observi făinarea la măr, deoarece organele vor fi acoperite de o pulbere cu aspect făinos, care la început are culoarea albă, iar apoi devine verde-cenușie.

Frunzele atacate de această boală își vor îndoi vârfurile, iar apoi se vor usca și vor cădea. Lăstarii afectați vor căpăta o culoare maro, iar vârfurile se vor îndoi. Florile atacate se deformează și se vor usca. Fructele atacate nu vor mai crește și vor cădea din măr.



Pentru prevenirea agenților de dăunare menționați, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a Țplantelor (omologat) de mai jos.

FOLICUR SOLO 250 EW/ (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Măr	Boli	Rapăn și făinare	0,6 l/ha, pauza tratament 14 zile
-----	------	------------------	-----------------------------------

ORIOUS 25 EW- 0,05% / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)

Măr	Boli	Rapăn și făinare	0,05 % (0,75 l/ha în 1500 l apă), pauză tratament 14 zile
-----	------	------------------	--

CRICKET 500 WG

Măr	Boli	Rapăn	0,45-0,75 kg/ha, se aplică din faza de urechiușe de șoarece, pauză tratament 21 zile. Se aplică maxim 3 tratamente.
-----	------	-------	---

CONSUS 250 EC

Măr	Boli	Rapăn și făinare	0,2 l/ha (0,027%), maxim 3 tratamente, de la începutul înfloririi până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare. Pauză tratament 28 de zile.
-----	------	------------------	--

DIFENOCARE

Măr	Boli	Rapăn și făinare	0,2 l/ha (0,027%), maxim 3 tratamente, de la începutul înfloririi până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare.
-----	------	------------------	--

Recomandări: - dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Micuț – Istrate Daniela



www.anfdf.ro