

NR. DATA 15.04.2026

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 16. din 15. 04. 2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca ”


Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

### SAMBUROASE (PIERSIC, CAIS, CIRES ,VISIN)


**Boli :** Monilioza (*Monilinia* spp), Ciuruirea (*Coryneum beijerinckii*, Pătarea rosie (*Coryneum beijerinckii*) deformans), Băsicarea frunzelor de piersic (*Taphrina deformans*)  
**Dăunători :** Viespea neagră a prunelor (*Hoplocampa* spp.), Cotarul brun (*Erannis defoliaria*), Cotarul verde (*Operophtera brumata*)



Viespea neagră a prunelor



atacul de viespe



cotarul verde larva

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului I la *Hoplocampa* spp. după criteriul biologic în perioada preovipozitară (depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-boli infecție secundară și prezența dăunătorilor

Se recomandă folosirea unuia din amestecurile de mai jos :

-SIGNUM (SYREX STAR) =0,5 KG/HA + DECIS 25 WG= 0,003KG/HA sau

- MERPAN 80 WDG (FLO-CAPTAN a doua den .com + MAVRIK 2F =0,05%(0,5 l/ha în 1000 l apa) sau

-SCORE 250 EC = 0,2L-0,3 L/ha (Mavita a doua den com) + DELTAGRI(FASTER DELTA) =0, 25-0.3l/ha sau

-KANTAREL = 0,3-0,4 l/ha + KARATE ZEON =0.015%(0,15 l/ha în 1000 l apa

Perioada optimă de tratament: după criteriul fenologic atunci când 15 % din petale s-au scuturat iar tratamentul al II-lea la 8-10 zile de la primul tratament. Având în vedere faptul că până la completă dezvoltare larva migrează în 2-3 fructe și de aceea e necesar tratamentul al II-lea.

Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare . Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, manși, manși ) la manipularea produselor de protecția plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1000 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploaie.Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati [www.aiprom .ro.](http://www.aiprom.ro) Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate

in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,ORDINUL297 MADR/2007,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER(S.C.;I.I.;A.F.) -----

Sediul(adresa)

Ferma-----

**REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CUN PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitate Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) )

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR  
Cons.sup.CROITORU DORIN




INTOCMIT  
Cons. Sup. UNGUREANU C-TINA

