



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA

Str. Celulozei nr.3 bis

Tel.0787605492

ANEXA 6

Către

Primarii/ Societati

Nr. 665 / 27.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 12

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare : Aphis ssp. (afide), Eurygaster spp. vârsta a 3 a

APHIS ssp.

Afidele sunt recunoscute printre speciile ce pot cauza probleme importante cerealelor paioase, **cu precadere in sezonul de toamna, care, lung si calduros, favorizeaza raspandirea insectelor si odata cu ele, a virurilor transmise de acestea**, fiind cunoscut faptul ca virozele transmise din toamna produc pagube semnificative comparativ cu cele din vara.

Printre cele mai importante specii se regasesc: paduchele verde al cerealelor (Schizaphis graminum), paduchele ovazului (Macrosiphum avenae), paduchele cerealelor si rozaceelor (Metopolophium dirhodum), paduchele cenusiu al gramineelor (Rhopalosiphum padi) sau paduchele dungat al porumbului (Rhopalosiphum maidis).

Impact economic – Aceste afide se hranesc aproape exclusiv cu o serie de plante din familia Poaceae.

Conditiiile cele mai favorabile pentru insecte sunt temperaturi de 20-21°C cu o umiditate relativa de 65-70% pentru femelele aptere si 25,8°C si 70% pentru femelele alate.

Simptome si mod de atac

Specii cunoscute ca daunatori pentru, orz, grau, culturi de secara, porumb sau buruieni din flora spontana (Avena fatua, Agropyrum repens, Dactylis glomerata, Bromus mallis sau Setaria glauca). Coloniile de afide pot fi gasite frunze, tulpini sau spice tinere. Cand se hranesc, afidele inteapa si absorb sucul celular si, din cauza metodei lor de hranire, plantele isi inceteaza cresterea, zonele atacate prezentand pete galbene sau rosii, ca reactie a toxinelor produse de afide. acestea ulterior ofilindu-se (fig. 2). La soiurile sensibile, dimensiunea plantei si implicit randamentul sunt afectate. Deoarece afidele nu transmit virusul descendentilor lor, ele dobandeasc BYDV (ingalbenirea si piticirea cerealelor) prin hranirea pe plante infectate. Timpul de la preluarea virusului pana la transmiterea acestuia plantei gazda este de 12-48 de ore. Initial, doar un mic

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele pentru protecția plantelor :

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele pentru protecția plantelor :

1. DECIS 25 WG	30 g/ha	sau
2. MAVRIK 2F	0,2 l/ ha	sau

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

ANUNTATI APICULTORII TELEFONIC SI IN SCRIS !

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din Romania ,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor;

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Având în vedere implementarea cerintelor legale în materie de gestionare referitor la „ Introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor (SMR 10) , agricultorii, care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza și utilizeaza produse de protecția plantelor au urmatoarele obligatii:

1. Sa utilizeze numai ppp (produse de protecția plantelor) omologate de Comisia Naționala de Omologare A Produselor de Protecția Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, existența pe site-ul MADR [http:// www.madr.ro](http://www.madr.ro) sau fitosanitar : [html-https://aloe.anfd.ro](http://aloe.anfd.ro) . ;
2. Sa intocmeasca Registrul cu evidenta tratamentelor fitosanitare;
3. Sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa, ale produselor de protecția plantelor achizitionate;
4. Sa utilizeze ppp în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instructiunile de utilizare, inscrise pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultura, agentul de daunare și respectare momentului aplicarii;
5. Produsele de prot. Plantelor clasificate cxa „ Foarte toxice (T+) și Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean din raza teritoriala în care aceștia își desfășoară activitatea ;
6. Sa nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protecția a resurselor de apa, în zonele de protecția sanitară și ecologica, precum și în alte zone protejate stabilite în conditiile legii (parcelele din zona de protecție au o fasie inierbata de 1-3 m, în funcție de inclinatia terenului)
7. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare și utilizare a PPP în exploatatiile agricole, conform Ghidului de bune practici de ut. si depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Naționala Fitosanitara;

8. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clatirii, în rezervorul mașinii de tratat ; Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP.


9. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „ Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro ;

10. Sa pastreze o perioada de cel puțin 3 ani, documentele de evidență a PPP utilizate în exploatare, precum și Registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare.

**UTILIZATI INTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR
DOAR IN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE SI NUMAI IN
CONFORMITATE CU INSTRUCIUNILE LOR DE UTILIZARE.**

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE PROGNOZA SI AVERTIZARE LA
LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**Intocmit,
Ing. Pavel Monica**



**Coordonator
Birsu Onoriu**

