

AVERTIZAREA NR. 30 / 27 .05. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de viță de vie .

Molia vitei de vie (Lobesia botrana)



Molia vitei de vie are 2-3 generații pe an și iernează ca pupa pe sub scoarta exfoliată a butucilor, într-un cocon alb matasos. Adultii apar când temperatura depășește 15°C și au zborul crepuscular. De regulă, aceștia apar în mai-iunie, se hrănesc timp de 10-12 zile după care urmează copularea și depunerea pontei. Femela depune timp de o lună aproximativ 50-80 de ouă, izolat sau în grupuri mici, de regulă pe bobocii florali, mai rar pe frunze sau lastari. Generațiile 2 și 3 depun pona pe boabele verzi sau în pargă.

COMBATERE

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comercială)

Vita de vie (struguri de vin și de masă)	Dăunători	Molia vitei de vie	0,075% Se aplică de la începutul infestării (bbch 53-77)	14 zile	-
--	-----------	--------------------	--	---------	---

AFFIRM

Vita de vie	Dăunători	Lobesia botrana (Molia vitei de vie), Sparganothis spp. (Pirala vitei de vie), Eupoecilia ambiguella (Molia brună a strugurilor)	1,5 kg/ha Se aplică de la apariția inflorescențelor până	7 zile	-
-------------	-----------	--	--	--------	---

DECIS 25 WG

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	30 g/ha	7 zile pentru struguri de masă și 30 zile pentru struguri de vin	-
-------------	-----------	--------------------------------	---------	--	---

DECIS EXPERT 100 EC

Vita de vie (struguri de vin)	Dăunători	Lobesia motrana (Molia vitei de vie)	75 mL/ha	30 zile	-
Vita de vie (struguri de masă)	Dăunători	Lobesia motrana (Molia vitei de vie)	75 mL/ha	7 zile	-

NISSORUN 10 WP

Vita de vie	Dăunători	Acarianul roșu comun	0,5 kg/ha	21 zile	-
-------------	-----------	----------------------	-----------	---------	---

Mana vitei de vie (*Plasmopara viticola*)



Aparitia bolii este favorizata de: precipitatii abundente, cer acoperit, umiditate crescuta in aer , prezenta apei pe organele-afectate (pelicula de apa), lipsa circulatiei aerului, vite de vie in care nu s-au efectuat la timp lucrarile in verde (copilit, palisat, etc.) si temperaturi atmosferice intre 10-30 °C. In lipsa tratamentelor corespunzatoare, mana poate conduce la: pierderea totala a recoltei, debilitarea plantelor de vita de vie nobila si chiar uscarea vitei de vie (daca nu se fac tratamente mai multi ani), odata plantele puternic defoliate pot sa apara si probleme cu diferentierea mugurilor de rod (fertili) pentru anul urmator.

Făinarea vitei de vie (*Uncinula necator*)



Făinarea vitei de vie (*Uncinula necator*) este o boală fungică periculoasă care afectează toate organele verzi (frunze, lăstari, ciorchini, boabe). Se manifestă printr-o pâslă fină, alb-cenușie, pulverulentă. Combaterea implică măsuri agrotehnice (aerisirea butucului) și tratamente chimice preventive și curative cu fungicide specifice.

COMBATERE

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	Plasmopara viticola (Mana), Erysiphe necator (Fainare), Botrytis Bolicinerea (Putregaiul cenușiu), Guignardia bidwellii (Putregaiul negru), Phomopsis viticola (Excorioza vitei de vie)	2,0 L/ha Se aplică de la stadiul de lăstari cu trei frunze desfă	28 zile	-
-------------	------	---	--	---------	---

PROFILER 71,1 WG

Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie	2,25 - 2,50 kg/ha	28 zile	-
-------------	------	-------------------	-------------------	---------	---

VIVANDO/ (ATTENZO STAR 50 SC - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,2 l/ha (aplicat in tratamente preventive si curative)	28 zile	-
-------------	------	----------	---	---------	---

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

Tratamentul se va executa inainte de inflorit si dupa scuturarea petalelor , **este un tratament de siguranta**, se va termina in 4-5 zile si se va repeta la 8-10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).