


BULETIN DE AVERTIZARE NR. 24 din 14.05.2026


Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **SÂMBUROASE** împotriva **BĂȘICĂRII FRUNZELOR** (*Taphrina deformans*), **CIURUIRII FRUNZELOR** (*Stigmata carpophila*), **MONILIOZĂ** (*Monilinia spp.*).

BĂȘICAREA FRUNZELOR (Taphrina d.)

Boala se manifestă pe frunze, flori, fructe și ramuri. Frunzele atacate, pe anumite porțiuni sau pe toată suprafața, hipertrofii ale parenchimului foliar, au un aspectul bășicat, cu umflături pe suprafața superioară și adâncituri pe cea inferioară, unde apare o pulbere albă. În cazul unui atac puternic, pomii rămân fără frunze de timpuriu.

**CIURUIREA FRUNZELOR (Stigmata carpophila.)**

Pe frunze, după dezmugurire, se formează pete mici circulare, solitare, de culoare roșietică violetă sau brună gălbuie. În câteva zile petele se măresc până la 2-3 mm, în dreptul acestor pete după 1-2 săptămâni țesuturile se necrozează, se desprind și cad, determinând ciuruirea frunzelor. Petele pot fi izolate sau confluențe, caz în care perforațiile au o formă neregulată. Pe fructe apar pete de timpuriu, la început sunt mici, punctiforme, treptat se extind, devin circulare, de 1-2 mm în diametru, brune sau brun-roșietice, confluează și prezintă denivelări proeminente pe toată suprafața fructului, adesea se produc leziuni din care se scurg gome. Când atacul este timpuriu, fructele se deformează, rămânând mici.


**MONILIOZA (Monilinia spp.)**

Atacul se manifestă pe ramuri, frunze, flori și fructe. Prima dată boala apare pe lăstari și flori în primăvară, la toate speciile de sâmburoase. Organele atacate se ofilesc brusc, ducând la pierderi de recoltă de până la 60-90%.

Lăstarii și florile atacate nu produc fructe. Lăstarii atacați, cu frunze și flori brunificate, reprezintă o sursă puternică de infecție ce se poate manifesta în perioada de pârgă-recolat pe fructele mature.

Infecțiile secundare ce provin de la organele atacate se răspândesc cu ușurință prin vânt, ploaie și insecte. Organele atacate, ofilite și uscate rămân prinse pe pomi până toamna sau chiar în timpul iernii.

Pe fructele în pârgă sau cele mature, alături de *Monilinia laxa* se găsește și *Monilinia fructigena*.



Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

1. ALCUPRAL 50 PU

Prun	Boli	Polistigma rubrum (Pătarea roșie a frunzelor de prun); Monilinia sp. (Monilioza)	2,0 kg/ha (0,2%)
Prun	Boli	Stigmata carpophila (Ciuruirea frunzelor)	1,5-2,0 kg/ha

2. BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX)

Cires	Boli	Blumeriella jaapi (pătarea roșie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	5,0 kg/ha. Pauză 3 zile
-------	------	---	----------------------------

Piersi c	Boli	Taphrina deformans (bășicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (moniliza)	5,0 kg/ha. Pauză 3 zile.
-------------	------	---	-----------------------------

Pru n	Boli	Polystima rubrum (pătarea roșie a frunzelor de prun), Stigmia carpophyla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	5,0 kg/ha. Pauză 3 zile.
----------	------	--	-----------------------------

Visin	Boli	Blumeriella jaapi (pătarea roșie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	5,0 kg/ha. Pauză 3 zile.
-------	------	---	--------------------------

3. AIRONE SC

cais	Boli	Bășicarea frunzelor, hurlupii, ciuruirea frunzelor, monilioza	4 l/ha. Pauză 21 zile.
------	------	---	------------------------

4. SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC)

Cais	Boli	Monilioza	0,15 l/ha. Pauză 7 zile.
Cires	Boli	Monilioza, pătarea roșie a frunzelor (antracnoza)	0,2 l/ha. Pauză 14 zile
Piersic	Boli	Bășicarea frunzelor, monilioza, făinarea, ciuruirea frunzelor	0,2 l/ha. Pauză 7 zile.
Piersic	Boli	Monilioza	0,15 l/ha. Pauză 7 zile.
Visin	Boli	Monilioza	0,15 l/ha. Pauză 7 zile.

5. SIGNUM (SYREX STAR)

Prun	Boli	Monilioza fructelor, pătarea roșie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha. Pauză 7 zile.
Cais, Vișin, Piersic	Boli	Monilioza fructelor	0,5 kg/ha. Pauză 7 zile

6. CRICKET 500 WG

Piersic Prun	Boli	Monilioza	0,45-0,75 kg/ha. Pauză 7 zile. Maxim 3 tratamente.
Nectarin	Boli	Monilioza	0,45-0,75 kg/ha. Se aplică de la stadiul de buton alb. Maxim 3 tratamente.
Cais	Boli	Monilioza	0,45-0,75 kg/ha. Se aplică de la stadiul de buton alb. Maxim 3 tratamente.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

