

BULETIN DE AVERTIZARE*Eurygaster integriceps*

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva agenților de dăunare:

Complex boli foliare ale spicului T2 (*Erysiphae spp.*, *Septoria t.*, *Fusarium spp.*, *Puccinia spp.*), **Ploșnitele cerealelor** (*Eurygaster spp.*) - larve, **Gândacul bălos** (*Lema m.*), **Afide** (*Schizaphis g.*), **Trips** (*Haplothrips t.*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

Cereale păioase

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **T2 (combate bolile ultimelor două frunze și ale spicului).**

_numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele **condiții**: PED = ploșnița cerealelor - 3 larve/mp la loturile semincere și 5 larve/mp la loturile de consum; PED = gândac bălos – 3 - 5 adulți/mp sau 2 larve pe o tulpină; PED = trips – 8-10 insecte adulte/spic

Folosiiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Nativo Pro 325 SC (Delaro 325 SC) = 0,6 – 0,7 l/ha + Karate Zeon (Ninja) = 0,15 l/ha sau**
2. **Falcon Pro (Impulse Pro 425 EC) = 0,8 l/ha + Deltagri (Faster Delta) = 0,3/ha.**

Perioada optimă de tratament pentru boli: fenofaza de „începutul pînă la sfârșitul înspicării”.

Momentul optim pentru ploșniță – apariția în masă a larvelor de vîrsta a –III-a.

Alte recomandări:

- **Atenție!** În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de toxicitate acută (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin pictograma GHS06 și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o autorizație specială pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor"** - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate și depozitate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**, conform modelului:

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra -fața (ha)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare
Dr. Ing. Carmen Miroiu

