

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 11 din 06.05.2026

Condițiile climatice din ultima vreme au creat condiții favorabile apariției făinării (*Podosphaera leuhotrica*) și a rapănului (*Venturia inaequalis*) la **măr și păr**.

**Făinarea** (*Podosphaera leuhotrica*). Ciuperca ierneză în solzii mugurilor și pe lăstarii tineri atacați în anul anterior și se raspândește cu ajutorul vântului o dată cu creșterea temperaturilor (18-23 °C). Pe frunzele și lăstarii tineri abia formați, ciuperca se manifestă sub forma unei pulberi albicioase care cu timpul își schimbă culoarea și devine verde cenușie. Odată instalată pe frunze și ramuri, va determina încetinirea creșterii lăstarilor, scăderea producției și slăbirea pomilor.

**Rapănul** (*Venturia inaequalis*). Ciuperca germinează și se dezvoltă la temperaturi cuprinse între 6-26 °C alternate cu perioade de precipitații care duc la umiditate relativă a aerului de peste 60%. Atacul se manifestă pe frunze sub forma unor pete cenușii, care cu timpul vor ajunge la culoare brună cu aspect catifelat, atacurile puternice putând duce până la defolierea completă a pomilor. Pe fructe atacul se manifestă la început sub forma unor pete mici rotunde care cu timpul se măresc ducând la deformarea și crăparea fructelor.

Odată cu efectuarea acestui tratament se mai combat : defoliatoare, afide, psilide.



**Efectuați tratamentul folosind unul dintre amestecurile:**

1. SERCADIS - 0,3 l/ha + LOS OVADOS 200 SE – 0,125 l/ha sau
2. REVYONA – 1,3 l/ha + DECIS EXPERT 100 EC – 75 ml/ha sau
3. MERPAN 80 WDG - 2 kg/ha + TOPAS 100 EC – 0,3 l/ha + KARATE ZEON - 0,15 l/ha

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor cu efect similar, omologate în România.

Dintre măsurile mecanice pentru prevenirea acestor boli se recomandă: eliminarea lăstarilor infectați, a frunzelor căzute toamna, efectuarea unei fertilizări corespunzătoare fără exces de azot, precum și utilizarea de soiuri rezistente.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: **06.05 – 10.05.2026**.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor cu efect similar, omologate în România.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului. De asemenea se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

#### ALTE RECOMANDĂRI :

- Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.
- Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 127/1991 al ACA Romania, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației.
- Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al ministrului Mediului, Apelor, și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor de sprijin și măsurilor de sprijin pentru fermieri în Romania cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare  
ing. Virgil Itu

