

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 25 din 14.05.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de **MĂR, PĂR și GUTUI** împotriva bolii - FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR (*Erwinia amylovora*).

FOCUL BACTERIAN(*Erwinia amylovora*)

Arsura inflorescențelor apare primăvara devreme, florile infectate se ofilesc, se brunifică și se înnegresc. Infecția progresează spre peduncul care în final se înnegrește. Pe timp călduros și umed, din peduncul exudează picături de lichid. Frunzele se ofilesc și întregul lăstar se brunifică (măr și gutui) sau se înnegresc (păr). Frunzele rămân atașate pe pom iar lăstarii se încovoie în formă de cârjă. Pe lăstarii bolnavi apar picături de exudat alb-pai până la roșu închis. Uneori din țesuturile bolnave exudează filamente cu aspect de rețea vătoasă. Ulcerațiile – se manifestă pe ramuri mai bătrâne, șarpante și trunchi, provocând leziuni; prin îndepărtarea scoarței, țesuturile de dedesupt apar pete maro roșietice.



Pragul economic de dăunare este de 2-10 % pomi atacați.

Se vor trata pomii care au manifestat simptome de atac în anul/anii anteriori, precum și pomii din vecinătatea acestora, utilizându-se un produs de protecție a plantelor (omologat) de mai jos:

• **ALCUPRAL 50 PU-0,2-0,3 %.**

Gutui	Boli	<i>Erwinia amylovora</i> (Focul bacterian)	4,5 kg/ha (0,3%) Se aplică prefloral	-	-
Gutui	Boli	<i>Erwinia amylovora</i> (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplică postfloral în 1500 l apă	-	-

Măr	Boli	<i>Erwinia amylovora</i> (Focul bacterian)	2,0 kg/ha (0,2%) Se aplică prefloral;	-	-
Măr	Boli	<i>Erwinia amylovora</i> (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplică postfloral în 1500 l apă	-	-
Păr	Boli	<i>Venturia inaequalis</i> (Rapanul marului); <i>Erwinia amylovora</i> (Focul bacterian)	3,0 kg/ha (0,3%) în 1000 L apă.		

• **KOCIDE 2000-0,25%**

Măr, păr	Boli	Rapăn, focul bacterian	2,5 kg/ha (0,25%)	-	-
----------	------	------------------------	-------------------	---	---

• **TRIUMF 40 WG**

gutui	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapăn, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	-	-
Măr	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapăn, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	-	-
Moșmon	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapăn, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	-	-
Păr	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapăn, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha		

Perioada optimă de tratament: După scuturarea petalelor.

· **BADGE WG COPRANTOL DUO)**

Se aplică în livezi de măr, păr, gutui: 2,5 kg/ha toamna de la căderea frunzelor și primăvara de la deschiderea mugurilor până la sfârșitul înfloritului.

· **AIRONE SC**

Se aplică în livezi de măr, păr, gutui: 3 l/ha toamna de la căderea frunzelor și primăvara de la deschiderea mugurilor până la sfârșitul înfloritului.

Alte recomandări :

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Micuț – Istrate Daniela

